



Polynômes

Corrections de Léa Blanc-Centi.

1 Opérations sur les polynômes

Exercice 1

Trouver le polynôme P de degré inférieur ou égal à 3 tel que :

$$P(0) = 1 \quad \text{et} \quad P(1) = 0 \quad \text{et} \quad P(-1) = -2 \quad \text{et} \quad P(2) = 4.$$

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000427]

2 Division, pgcd

Exercice 2

1. Effectuer la division euclidienne de A par B :

- (a) $A = 3X^5 + 4X^2 + 1$, $B = X^2 + 2X + 3$
- (b) $A = 3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1$, $B = X^3 + X + 2$
- (c) $A = X^4 - X^3 + X - 2$, $B = X^2 - 2X + 4$
- (d) $A = X^5 - 7X^4 - X^2 - 9X + 9$, $B = X^2 - 5X + 4$

2. Effectuer la division selon les puissances croissantes de A par B à l'ordre k (c'est-à-dire tel que le reste soit divisible par X^{k+1}) :

- (a) $A = 1 - 2X + X^3 + X^4$, $B = 1 + 2X + X^2$, $k = 2$
- (b) $A = 1 + X^3 - 2X^4 + X^6$, $B = 1 + X^2 + X^3$, $k = 4$

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[006955]

Exercice 3

À quelle condition sur $a, b, c \in \mathbb{R}$ le polynôme $X^4 + aX^2 + bX + c$ est-il divisible par $X^2 + X + 1$?

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[006956]

Exercice 4

1. Déterminer les pgcd des polynômes suivants:

- (a) $X^3 - X^2 - X - 2$ et $X^5 - 2X^4 + X^2 - X - 2$
- (b) $X^4 + X^3 - 2X + 1$ et $X^3 + X + 1$
- (c) $X^5 + 3X^4 + X^3 + X^2 + 3X + 1$ et $X^4 + 2X^3 + X + 2$
- (d) $nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ et $X^n - nX + n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

2. Calculer le pgcd D des polynômes A et B ci-dessous. Trouver des polynômes U et V tels que $AU + BV = D$.

- (a) $A = X^5 + 3X^4 + 2X^3 - X^2 - 3X - 2$
 et $B = X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6$
- (b) $A = X^6 - 2X^5 + 2X^4 - 3X^3 + 3X^2 - 2X$
 et $B = X^4 - 2X^3 + X^2 - X + 1$

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[006957]

Exercice 5

- Montrer que si A et B sont deux polynômes à coefficients dans \mathbb{Q} , alors le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B , ainsi que $\text{pgcd}(A, B)$, sont aussi à coefficients dans \mathbb{Q} .
- Soit $a, b, c \in \mathbb{C}^*$ distincts, et $0 < p < q < r$ des entiers. Montrer que si $P(X) = (X - a)^p(X - b)^q(X - c)^r$ est à coefficients dans \mathbb{Q} , alors $a, b, c \in \mathbb{Q}$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[006958]

3 Racines et factorisation

Exercice 6

- Factoriser dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ les polynômes suivants :

$$a) X^3 - 3 \quad b) X^{12} - 1 \quad c) X^6 + 1 \quad d) X^9 + X^6 + X^3 + 1$$

- Factoriser les polynômes suivants :

$$a) X^2 + (3i - 1)X - 2 - i \quad b) X^3 + (4 + i)X^2 + (5 - 2i)X + 2 - 3i$$

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[006959]

Exercice 7

Pour quelles valeurs de a le polynôme $(X + 1)^7 - X^7 - a$ admet-il une racine multiple réelle?

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000410]

Exercice 8

Chercher tous les polynômes P tels que $P + 1$ soit divisible par $(X - 1)^4$ et $P - 1$ par $(X + 1)^4$.

Indications. Commencer par trouver une solution particulière P_0 avec l'une des méthodes suivantes :

- à partir de la relation de Bézout entre $(X - 1)^4$ et $(X + 1)^4$;
- en considérant le polynôme dérivé P'_0 et en cherchant un polynôme de degré minimal.

Montrer que P convient si et seulement si le polynôme $P - P_0$ est divisible par $(X - 1)^4(X + 1)^4$, et en déduire toutes les solutions du problème.

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000370]

Exercice 9

Quels sont les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que P' divise P ?

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[000378]

Exercice 10

Trouver tous les polynômes P qui vérifient la relation

$$P(X^2) = P(X)P(X+1)$$

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[006960]

Exercice 11

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que

$$\forall z \in \mathbb{C}^* \quad P\left(z + \frac{1}{z}\right) = z^n + \frac{1}{z^n}$$

Montrer alors que toutes les racines de P sont réelles, simples, et appartiennent à l'intervalle $[-2, 2]$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[006961]

Exercice 12

1. Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$ un polynôme de degré $n \geq 1$ à coefficients dans \mathbb{Z} . Démontrer que si P admet une racine dans \mathbb{Z} , alors celle-ci divise a_0 .
2. Les polynômes $X^3 - X^2 - 109X - 11$ et $X^{10} + X^5 + 1$ ont-ils des racines dans \mathbb{Z} ?

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[006962]

Exercice 13

Soient a_0, \dots, a_n des réels deux à deux distincts. Pour tout $i = 0, \dots, n$, on pose

$$L_i(X) = \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$$

(les L_i sont appelés *polynômes interpolateurs de Lagrange*). Calculer $L_i(a_j)$.

Soient b_0, \dots, b_n des réels fixés. Montrer que $P(X) = \sum_{i=0}^n b_i L_i(X)$ est l'unique polynôme de degré inférieur ou égal à n qui vérifie:

$$P(a_j) = b_j \quad \text{pour tout } j = 0, \dots, n.$$

Application. Trouver le polynôme P de degré inférieur ou égal à 3 tel que

$$P(0) = 1 \quad \text{et} \quad P(1) = 0 \quad \text{et} \quad P(-1) = -2 \quad \text{et} \quad P(2) = 4.$$

[Correction ▼](#) [Vidéo ■](#)

[006963]

Indication pour l'exercice 4 ▲

Le calcul du pgcd se fait par l'algorithme d'Euclide, et la "remontée" de l'algorithme permet d'obtenir U et V .

Indication pour l'exercice 5 ▲

Calculer $\text{pgcd}(P, P')$.

Indication pour l'exercice 9 ▲

Si $P = P'Q$ avec $P \neq 0$, regarder le degré de Q .

Indication pour l'exercice 10 ▲

Montrer que si P est un polynôme non constant vérifiant la relation, alors ses seules racines possibles sont 0 et 1.

Indication pour l'exercice 11 ▲

Pour l'existence, preuve par récurrence sur n . Pour les racines, montrer que $P(x) = 2 \cos(n \arccos(x/2))$.

Correction de l'exercice 1 ▲

On cherche P sous la forme $P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d$, ce qui donne le système linéaire suivant à résoudre:

$$\begin{cases} & & & & d = 1 \\ a + b + c + d = 0 \\ -a + b - c + d = -2 \\ 8a + 4b + 2c + d = 4 \end{cases}$$

Après calculs, on trouve une unique solution : $a = \frac{3}{2}$, $b = -2$, $c = -\frac{1}{2}$, $d = 1$ c'est-à-dire

$$P(X) = \frac{3}{2}X^3 - 2X^2 - \frac{1}{2}X + 1.$$

Correction de l'exercice 2 ▲

- (a) $3X^5 + 4X^2 + 1 = (X^2 + 2X + 3)(3X^3 - 6X^2 + 3X + 16) - 41X - 47$
(b) $3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1 = (X^3 + X + 2)(3X^2 + 2X - 3) - 9X^2 - X + 7$
(c) $X^4 - X^3 + X - 2 = (X^2 - 2X + 4)(X^2 + X - 2) - 7X + 6$
(d) $X^5 - 7X^4 - X^2 - 9X + 9$
 $= (X^2 - 5X + 4)(X^3 - 2X^2 - 14X - 63) - 268X + 261$
- (a) $1 - 2X + X^3 + X^4 = (1 + 2X + X^2)(1 - 4X + 7X^2) + X^3(-9 - 6X)$
(b) $1 + X^3 - 2X^4 + X^6 = (1 + X^2 + X^3)(1 - X^2 - X^4) + X^5(1 + 2X + X^2)$

Correction de l'exercice 3 ▲

La division euclidienne de $A = X^4 + aX^2 + bX + c$ par $B = X^2 + X + 1$ donne

$$X^4 + aX^2 + bX + c = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + a) + (b - a + 1)X + c - a$$

Or A est divisible par B si et seulement si le reste $R = (b - a + 1)X + c - a$ est le polynôme nul, c'est-à-dire si et seulement si $b - a + 1 = 0$ et $c - a = 0$.

Correction de l'exercice 4 ▲

- L'algorithme d'Euclide permet de calculer le pgcd par une suite de divisions euclidiennes.

(a) $X^5 - 2X^4 + X^2 - X - 2 = (X^3 - X^2 - X - 2)(X^2 - X) + 2X^2 - 3X - 2$
puis $X^3 - X^2 - X - 2 = (2X^2 - 3X - 2)(\frac{1}{2}X + \frac{1}{4}) + \frac{3}{4}X - \frac{3}{2}$
puis $2X^2 - 3X - 2 = (\frac{3}{4}X - \frac{3}{2})(\frac{8}{3}X + \frac{4}{3})$

Le pgcd est le dernier reste non nul, divisé par son coefficient dominant:

$$\text{pgcd}(X^3 - X^2 - X - 2, X^5 - 2X^4 + X^2 - X - 2) = X - 2$$

(b) $X^4 + X^3 - 2X + 1 = (X^3 + X + 1)(X + 1) - X^2 - 4X$
puis $X^3 + X + 1 = (-X^2 - 4X)(-X + 4) + 17X + 1$

$$\text{donc pgcd } (X^4 + X^3 - 2X + 1, X^3 + X + 1) \\ = \text{pgcd}(-X^2 - 4X, 17X + 1) = 1$$

car $-X^2 - 4X$ et $17X + 1$ n'ont pas de racine (même complexe) commune.

(c) $X^5 + 3X^4 + X^3 + X^2 + 3X + 1 = (X^4 + 2X^3 + X + 2)(X + 1) - X^3 - 1$
 puis $X^4 + 2X^3 + X + 2 = (-X^3 - 1)(-X - 2) + 2X^3 + 2$

$$\text{pgcd}(X^5 + 3X^4 + X^3 + X^2 + 3X + 1, X^4 + 2X^3 + X + 2) = X^3 + 1$$

(d) $nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$
 $= (X^n - nX + n - 1)(nX - (n+1)) + n^2(X - 1)^2$

Si $n = 1$ alors $X^n - nX + n - 1 = 0$ et le pgcd vaut $(X - 1)^2$. On constate que 1 est racine de $X^n - nX + n - 1$, et on trouve $X^n - nX + n - 1 = (X - 1)(X^{n-1} + X^{n-2} + \dots + X^2 + X - (n - 1))$.

Si $n \geq 2$: 1 est racine de $X^{n-1} + X^{n-2} + \dots + X^2 + X - (n - 1)$ et on trouve $X^{n-1} + X^{n-2} + \dots + X^2 + X - (n - 1)$

$= (X - 1)(X^{n-2} + 2X^{n-3} + \dots + (n - 1)X^2 + nX + (n + 1))$, donc finalement $(X - 1)^2$ divise $X^n - nX + n - 1$ (on pourrait aussi remarquer que 1 est racine de multiplicité au moins deux de $X^n - nX + n - 1$, puisqu'il est racine de ce polynôme et de sa dérivée). Ainsi

$$\text{si } n \geq 2, \text{ pgcd}(nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1, X^n - nX + n - 1) = (X - 1)^2$$

2. (a) $A = X^5 + 3X^4 + 2X^3 - X^2 - 3X - 2$ et $B = X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6$
 donc $A = BQ_1 + R_1$ avec $Q_1 = X + 1, R_1 = -2X^3 - 10X^2 - 16X - 8$
 puis $B = R_1Q_2 + R_2$ avec $Q_2 = -\frac{1}{2}X + \frac{3}{2}$ et $R_2 = 9X^2 + 27X + 18$
 et enfin $R_1 = R_2Q_3$ avec $Q_3 = -\frac{2}{9}X - \frac{4}{9}$
 Donc $D = X^2 + 3X + 2$, et on obtient

$$9D = B - R_1Q_2 = B - (A - BQ_1)Q_2 = -AQ_2 + B(1 + Q_1Q_2)$$

soit

$$\begin{cases} U = \frac{1}{9}(-Q_2) = \frac{1}{18}X - \frac{1}{6} \\ V = \frac{1}{9}(1 + Q_1Q_2) = -\frac{1}{18}X^2 + \frac{1}{9}X + \frac{5}{18} \end{cases}$$

- (b) On a $A = BQ_1 + R_1$ avec $Q_1 = X^2 + 1, R_1 = X^2 - X - 1$
 puis $B = R_1Q_2 + R_2$ avec $Q_2 = X^2 - X + 1$ et $R_2 = -X + 2$
 et enfin $R_1 = R_2Q_3 + R_3$ avec $Q_3 = -X - 1$ et $R_3 = 1$
 Donc $D = 1$, et on obtient

$$\begin{aligned} 1 &= R_1 - R_2Q_3 = R_1 - (B - R_1Q_2)Q_3 = R_1(1 + Q_2Q_3) - BQ_3 \\ &= (A - BQ_1)(1 + Q_2Q_3) - BQ_3 \\ &= A(1 + Q_2Q_3) - B(Q_1(1 + Q_2Q_3) + Q_3) \end{aligned}$$

soit

$$\begin{cases} U = 1 + Q_2Q_3 = -X^3 \\ V = -Q_1(1 + Q_2Q_3) - Q_3 = 1 + X + X^3 + X^5 \end{cases}$$

Correction de l'exercice 5 ▲

1. Lorsqu'on effectue la division euclidienne $A = BQ + R$, les coefficients de Q sont obtenus par des opérations élémentaires (multiplication, division, addition) à partir des coefficients de A et B : ils restent donc dans \mathbb{Q} . De plus, $R = A - BQ$ est alors encore à coefficients rationnels.

Alors $\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(B, R)$ et pour l'obtenir, on fait la division euclidienne de B par R (dont le quotient et le reste sont encore à coefficients dans \mathbb{Q}), puis on recommence... Le pgcd est le dernier reste non nul, c'est donc encore un polynôme à coefficients rationnels.

2. Notons $P_1 = \text{pgcd}(P, P')$: comme P est à coefficients rationnels, P' aussi et donc P_1 aussi. Or $P_1(X) = (X - a)^{p-1}(X - b)^{q-1}(X - c)^{r-1}$. En itérant le processus, on obtient que $P_{r-1}(X) = (X - c)$ est à coefficients rationnels, donc $c \in \mathbb{Q}$.

On remonte alors les étapes: $P_{q-1}(X) = (X - b)(X - c)^{r-q+1}$ est à coefficients rationnels, et $X - b$ aussi en tant que quotient de P_{q-1} par le polynôme à coefficients rationnels $(X - c)^{r-q+1}$, donc $b \in \mathbb{Q}$. De même, en considérant P_{p-1} , on obtient $a \in \mathbb{Q}$.

Correction de l'exercice 6 ▲

1. (a) $X^3 - 3 = (X - 3^{1/3})(X^2 + 3^{1/3}X + 3^{2/3})$ où $X^2 + 3^{1/3}X + 3^{2/3}$ est irréductible sur \mathbb{R} . On cherche ses racines complexes pour obtenir la factorisation sur \mathbb{C} :

$$X^3 - 3 = (X - 3^{1/3})(X + \frac{1}{2}3^{1/3} - \frac{i}{2}3^{5/6})(X + \frac{1}{2}3^{1/3} + \frac{i}{2}3^{5/6})$$

(b) Passons à $X^{12} - 1$. $z = re^{i\theta}$ vérifie $z^{12} = 1$ si et seulement si $r = 1$ et $12\theta \equiv 0[2\pi]$, on obtient donc comme racines complexes les $e^{ik\pi/6}$ ($k = 0, \dots, 11$), parmi lesquelles il y en a deux réelles (-1 et 1) et cinq couples de racines complexes conjuguées ($e^{i\pi/6}$ et $e^{11i\pi/6}$, $e^{2i\pi/6}$ et $e^{10i\pi/6}$, $e^{3i\pi/6}$ et $e^{9i\pi/6}$, $e^{4i\pi/6}$ et $e^{8i\pi/6}$, $e^{5i\pi/6}$ et $e^{7i\pi/6}$), d'où la factorisation sur $\mathbb{C}[X]$:

$$X^{12} - 1 = (X - 1)(X + 1)(X - e^{i\pi/6})(X - e^{11i\pi/6})(X - e^{2i\pi/6})(X - e^{10i\pi/6})(X - e^{3i\pi/6})(X - e^{9i\pi/6})(X - e^{4i\pi/6})(X - e^{8i\pi/6})(X - e^{5i\pi/6})(X - e^{7i\pi/6})$$

Comme $(X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = (X^2 - 2\cos(\theta)X + 1)$, on en déduit la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$:

$$\begin{aligned} X^{12} - 1 &= (X - 1)(X + 1)(X^2 - 2\cos(\pi/6)X + 1) \\ &\quad (X^2 - 2\cos(2\pi/6)X + 1)(X^2 - 2\cos(3\pi/6)X + 1) \\ &\quad (X^2 - 2\cos(4\pi/6)X + 1)(X^2 - 2\cos(5\pi/6)X + 1) \\ &= (X - 1)(X + 1)(X^2 - \sqrt{3}X + 1) \\ &\quad (X^2 - X + 1)(X^2 + 1)(X^2 + X + 1)(X^2 + \sqrt{3}X + 1) \end{aligned}$$

(c) Pour $X^6 + 1$, $z = re^{i\theta}$ vérifie $z^6 = -1$ si et seulement si $r = 1$ et $6\theta \equiv \pi[2\pi]$, on obtient donc comme racines complexes les $e^{i(\pi+2k\pi)/6}$ ($k = 0, \dots, 5$). D'où la factorisation dans $\mathbb{C}[X]$:

$$X^6 + 1 = (X - e^{i\pi/6})(X - e^{3i\pi/6})(X - e^{5i\pi/6})(X - e^{7i\pi/6})(X - e^{9i\pi/6})(X - e^{11i\pi/6})$$

Pour obtenir la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$, on regroupe les paires de racines complexes conjuguées :

$$X^6 + 1 = (X^2 + 1)(X^2 - \sqrt{3}X + 1)(X^2 + \sqrt{3}X + 1)$$

(d) $X^9 + X^6 + X^3 + 1 = P(X^3)$ où $P(X) = X^3 + X^2 + X + 1 = \frac{X^4 - 1}{X - 1}$: les racines de P sont donc les trois racines quatrièmes de l'unité différentes de 1 (i , $-i$, -1) et

$$\begin{aligned} X^9 + X^6 + X^3 + 1 &= P(X^3) \\ &= (X^3 + 1)(X^3 - i)(X^3 + i) \\ &= (X^3 + 1)(X^6 + 1) \end{aligned}$$

On sait déjà factoriser $X^6 + 1$, il reste donc à factoriser le polynôme $X^3 + 1 = (X + 1)(X^2 - X + 1)$, où $X^2 - X + 1$ n'a pas de racine réelle. Donc

$$X^9 + X^6 + X^3 + 1 = (X + 1)(X^2 - X + 1)(X^2 + 1)(X^2 - \sqrt{3}X + 1)(X^2 + \sqrt{3}X + 1)$$

Pour la factorisation sur \mathbb{C} : les racines de $X^2 - X + 1$ sont $e^{i\pi/3}$ et $e^{5i\pi/3}$, ce qui donne

$$\begin{aligned} X^9 + X^6 + X^3 + 1 &= (X + 1)(X - e^{i\pi/3})(X - e^{5i\pi/3}) \\ &\quad (X - e^{i\pi/6})(X - e^{3i\pi/6})(X - e^{5i\pi/6}) \\ &\quad (X - e^{7i\pi/6})(X - e^{9i\pi/6})(X - e^{11i\pi/6}) \end{aligned}$$

2. (a) Pour $X^2 + (3i - 1)X - 2 - i$, on calcule le discriminant

$$\Delta = (3i - 1)^2 - 4(-2 - i) = -2i$$

et on cherche les racines carrées (complexes!) de Δ : $w = a + ib$ vérifie $w^2 = \Delta$ si et seulement si $w = 1 - i$ ou $w = -1 + i$. Les racines du polynôme sont donc $\frac{1}{2}(-(3i - 1) \pm (1 - i))$ et $P(X) = (X + i)(X - 1 + 2i)$.

- (b) Pour $X^3 + (4 + i)X^2 + (5 - 2i)X + 2 - 3i$: -1 est racine évidente, et $P(X) = (X + 1)(X^2 + (3 + i)X + 2 - 3i)$. Le discriminant du polynôme $X^2 + (3 + i)X + 2 - 3i$ vaut $\Delta = 18i$, ses deux racines carrées complexes sont $\pm(3 + 3i)$ et finalement on obtient $P(X) = (X + 1)(X - i)(X + 3 + 2i)$.

Correction de l'exercice 7 ▲

Soit $x \in \mathbb{R}$; x est une racine multiple de P si et seulement si $P(x) = 0$ et $P'(x) = 0$:

$$\begin{aligned} P(x) = P'(x) = 0 &\iff \begin{cases} (x+1)^7 - x^7 - a = 0 \\ 7(x+1)^6 - 7x^6 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (x+1)x^6 - x^7 - a = 0 \\ (x+1)^6 = x^6 \end{cases} \quad \text{en utilisant la deuxième équation} \\ &\iff \begin{cases} x^6 = a \\ (x+1)^3 = \pm x^3 \end{cases} \quad \text{en prenant la racine carrée} \\ &\iff \begin{cases} x^6 = a \\ x+1 = \pm x \end{cases} \quad \text{en prenant la racine cubique} \end{aligned}$$

qui admet une solution ($x = -\frac{1}{2}$) si et seulement si $a = \frac{1}{64}$.

Correction de l'exercice 8 ▲

1. On remarque que si P est solution, alors $P + 1 = (X - 1)^4 A$ et par ailleurs $P - 1 = (X + 1)^4 B$, ce qui donne $1 = \frac{A}{2}(X - 1)^4 + \frac{-B}{2}(X + 1)^4$. Cherchons des polynômes A et B qui conviennent: pour cela, on écrit la relation de Bézout entre $(X - 1)^4$ et $(X + 1)^4$ qui sont premiers entre eux, et on obtient

$$\begin{aligned} \frac{A}{2} &= \frac{5}{32}X^3 + \frac{5}{8}X^2 + \frac{29}{32}X + \frac{1}{2} \\ \frac{-B}{2} &= -\frac{5}{32}X^3 + \frac{5}{8}X^2 - \frac{29}{32}X + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

On a alors par construction

$$(X - 1)^4 A - 1 = 2 \left(1 + (X + 1)^4 \frac{-B}{2} \right) = 1 + (X + 1)^4 B$$

et $P_0 = (X - 1)^4 A - 1$ convient. En remplaçant, on obtient après calculs :

$$P_0 = \frac{5}{16}X^7 - \frac{21}{16}X^5 + \frac{35}{16}X^3 - \frac{35}{16}X$$

2. Si $(X - 1)^4$ divise $P + 1$, alors 1 est racine de multiplicité au moins 4 de $P + 1$, et donc racine de multiplicité au moins 3 de P' : alors $(X - 1)^3$ divise P' . De même $(X + 1)^3$ divise P' . Comme $(X - 1)^3$ et $(X + 1)^3$ sont premiers entre eux, nécessairement $(X - 1)^3(X + 1)^3$ divise P' . Cherchons un polynôme de degré minimal: on remarque que les primitives de

$$\lambda(X - 1)^3(X + 1)^3 = \lambda(X^2 - 1)^3 = \lambda(X^6 - 3X^4 + 3X^2 - 1)$$

sont de la forme $P(X) = \lambda(\frac{1}{7}X^7 - \frac{3}{5}X^5 + X^3 - X + a)$. Si P convient, nécessairement 1 est racine de $P + 1$ et -1 est racine de $P - 1$, ce qui donne $\lambda(\frac{-16}{35} + a) = -1$ et $\lambda(\frac{16}{35} + a) = 1$. D'où $\lambda a = 0$ et comme on cherche P non nul, il faut $a = 0$ et $\lambda = \frac{35}{16}$. On vérifie que

$$P_0(X) = \frac{35}{16}(\frac{1}{7}X^7 - \frac{3}{5}X^5 + X^3 - X) = \frac{5}{16}X^7 - \frac{21}{16}X^5 + \frac{35}{16}X^3 - \frac{35}{16}X$$

est bien solution du problème: le polynôme $A = P_0 + 1$ admet 1 comme racine, i.e. $A(1) = 0$, et sa dérivée admet 1 comme racine triple donc $A'(1) = A''(1) = A'''(1) = 0$, ainsi 1 est racine de multiplicité au moins 4 de A et donc $(X - 1)^4$ divise $A = P + 1$. De même, $(X + 1)^4$ divise $P - 1$.

Supposons que P soit une solution du problème. On note toujours P_0 la solution particulière obtenue ci-dessus. Alors $P + 1$ et $P_0 + 1$ sont divisibles par $(X - 1)^4$, et $P - 1$ et $P_0 - 1$ sont divisibles par $(X + 1)^4$. Ainsi $P - P_0 = (P + 1) - (P_0 + 1) = (P - 1) - (P_0 - 1)$ est divisible par $(X - 1)^4$ et par $(X + 1)^4$. Comme $(X - 1)^4$ et $(X + 1)^4$ sont premiers entre eux, nécessairement $P - P_0$ est divisible par $(X - 1)^4(X + 1)^4$. Réciproquement, si $P = P_0 + (X - 1)^4(X + 1)^4A$, alors $P + 1$ est bien divisible par $(X - 1)^4$ et $P - 1$ est divisible par $(X + 1)^4$. Ainsi les solutions sont exactement les polynômes de la forme

$$P_0(X) + (X - 1)^4(X + 1)^4A(X)$$

où P_0 est la solution particulière trouvée précédemment, et A un polynôme quelconque.

Correction de l'exercice 9 ▲

Le polynôme nul convient. Dans la suite on suppose que P n'est pas le polynôme nul.

Notons $n = \deg P$ son degré. Comme P' divise P , alors P est non constant, donc $n \geq 1$. Soit $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = P'Q$. Puisque $\deg(P') = \deg(P) - 1 \geq 0$, alors Q est de degré 1. Ainsi $Q(X) = aX + b$ avec $a \neq 0$, et donc

$$P(X) = P'(X)(aX + b) = aP'(X)(X + \frac{b}{a})$$

Donc si $z \neq \frac{-b}{a}$ et si z est racine de P de multiplicité $k \geq 1$, alors z est aussi racine de P' avec la même multiplicité, ce qui est impossible. Ainsi la seule racine possible de P est $\frac{-b}{a}$.

Réciproquement, soit P un polynôme avec une seule racine $z_0 \in \mathbb{C}$: il existe $\lambda \neq 0$, $n \geq 1$ tels que $P = \lambda(X - z_0)^n$, qui est bien divisible par son polynôme dérivé.

Correction de l'exercice 10 ▲

Si P est constant égal à c , il convient si et seulement si $c = c^2$, et alors $c \in \{0; 1\}$.

Dans la suite on suppose P non constant. Notons Z l'ensemble des racines de P . On sait que Z est un ensemble non vide, fini.

Analyse

Si $z \in Z$, alors $P(z) = 0$ et la relation $P(X^2) = P(X)P(X + 1)$ implique $P(z^2) = 0$, donc $z^2 \in Z$. En itérant, on obtient $z^{2^k} \in Z$ (pour tout $k \in \mathbb{N}^*$). Si $|z| > 1$, la suite $(|z^{2^k}|)_k$ est strictement croissante donc Z contient une infinité d'éléments, ce qui est impossible. De même si $0 < |z| < 1$, la suite $(|z^{2^k}|)_k$ est strictement décroissante, ce qui est impossible pour la même raison. Donc les éléments de Z sont soit 0, soit des nombres complexes de module 1.

De plus, si $P(z) = 0$, alors toujours par la relation $P(X^2) = P(X)P(X + 1)$, on a que $P((z - 1)^2) = 0$ donc $(z - 1)^2 \in Z$. Par le même raisonnement que précédemment, alors ou bien $z - 1 = 0$ ou bien $|z - 1| = 1$.

En écrivant $z = a + ib$, on vérifie que $|z| = |z - 1| = 1$ équivaut à $z = e^{\pm i\pi/3}$. Finalement, $Z \subset \{0, 1, e^{i\pi/3}, e^{-i\pi/3}\}$.

Or si $e^{\pm i\pi/3}$ était racine de P , alors $(e^{\pm i\pi/3})^2$ devrait aussi être dans Z , mais ce n'est aucun des quatre nombres complexes listés ci-dessus. Donc ni $e^{i\pi/3}$, ni $e^{-i\pi/3}$ ne sont dans Z . Les deux seules racines (complexes) possibles sont donc 0 et 1. Conclusion : le polynôme P est nécessairement de la forme $\lambda X^k(X - 1)^\ell$.

Synthèse

La condition $P(X^2) = P(X)P(X + 1)$ devient

$$\lambda X^{2k}(X^2 - 1)^\ell = \lambda^2 X^k(X - 1)^\ell(X + 1)^k X^\ell$$

qui équivaut à $\begin{cases} \lambda^2 = \lambda \\ 2k = k + \ell \\ k = \ell \end{cases}$.

Autrement dit $k = \ell$ et $\lambda = 1$ (puisque l'on a supposé P non constant).

Conclusion Finalement, les solutions sont le polynôme nul et les polynômes $(X^2 - X)^k$, $k \in \mathbb{N}$ ($k = 0$ donne le polynôme 1).

Correction de l'exercice 11 ▲

1. Commençons par remarquer que si P et Q sont deux polynômes qui conviennent, alors pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, $P(z + \frac{1}{z}) - Q(z + \frac{1}{z}) = 0$. En appliquant cette égalité à $z = e^{i\theta}$, on obtient $(P - Q)(2 \cos \theta) = 0$. Le polynôme $P - Q$ a une infinité de racines, donc il est nul, ce qui montre $P = Q$.

2. Montrons l'existence de P par récurrence forte sur n :

- Pour $n = 0$, $P = 2$ convient et pour $n = 1$, $P = X$ convient.
- Passage des rangs $k \leq n$ au rang $n + 1$. Si on note P_k le polynôme construit pour $k \leq n$, on a

$$z^{n+1} + \frac{1}{z^{n+1}} = (z + \frac{1}{z})(z^n + \frac{1}{z^n}) - (z^{n-1} + \frac{1}{z^{n-1}}) = (z + \frac{1}{z})P_n(z + \frac{1}{z}) - P_{n-1}(z + \frac{1}{z})$$

donc $P_{n+1}(X) = XP_n(X) - P_{n-1}(X)$ convient.

- On a ainsi construit P_n pour tout n (avec $\deg P_n = n$).

3. Fixons n et notons P le polynôme obtenu. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $P(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = e^{in\theta} + e^{-in\theta}$ donc $P(2 \cos(\theta)) = 2 \cos(n\theta)$.

En posant $x = 2 \cos(\theta)$ et donc $\theta = \arccos(\frac{x}{2})$ on obtient la relation Ainsi,

$$P(x) = 2 \cos(n \arccos(\frac{x}{2})) \quad \forall x \in [-2, 2]$$

Le polynôme dérivée est $P'(x) = \frac{n}{\sqrt{1 - (\frac{x}{2})^2}} \sin(n \arccos(\frac{x}{2}))$, il s'annule en changeant de signe en chaque $\alpha_k = 2 \cos(\frac{k\pi}{n})$, ainsi $P'(\alpha_k) = 0$ pour $k = 0, \dots, n$.

On calcule aussi que $P(\alpha_k) = \pm 2$. Le tableau de signe montre que P est alternativement croissante (de -2 à $+2$) puis décroissante (de $+2$ à -2) sur chaque intervalle $[\alpha_{k+1}, \alpha_k]$, qui forment une partition de $[-2, 2]$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, P possède n racines simples (une dans chaque intervalle $[\alpha_{k+1}, \alpha_k]$) dans $[-2, 2]$. Puisque P est de degré n , on a ainsi obtenu toutes ses racines.

Correction de l'exercice 12 ▲

1. Si $k \in \mathbb{Z}$ est racine de P , alors $k^n + a_{n-1}k^{n-1} + \dots + a_1k = -a_0$ ce qui donne $k(k^{n-1} + \dots + a_1) = -a_0$, donc k divise a_0 .

2. Si $X^3 - X^2 - 109X - 11$ a une racine $k \in \mathbb{Z}$, nécessairement k divise 11, donc k vaut $-1, 1, -11$ ou 11 . En testant ces quatre valeurs, on trouve que seul 11 est racine.

De même, si $X^{10} + X^5 + 1$ admettait une racine entière k , celle-ci diviserait 1 donc vaut $k = \pm 1$, or on vérifie que ni $+1$, ni -1 ne sont racines. Ainsi $X^{10} + X^5 + 1$ n'a pas de racine entière.

Correction de l'exercice 13 ▲

On a

$$L_i(a_i) = \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{a_i - a_j}{a_i - a_j} = 1 \quad \text{et} \quad L_i(a_j) = 0 \text{ si } j \neq i$$

puisque le produit contient un facteur qui est nul: $(a_j - a_j)$. Puisque les L_i sont tous de degré n , le polynôme P est de degré inférieur ou égal à n , et $P(a_j) = \sum_{i=0}^n b_i L_i(a_j) = b_i$.

Il reste à montrer qu'un tel polynôme est unique. Supposons que Q convienne aussi, alors $P - Q$ est de degré inférieur ou égal à n et s'annule en $n + 1$ points (les a_i), donc il est identiquement nul, i.e. $P = Q$.

Pour l'application on utilise les polynômes interpolateurs de Lagrange avec $a_0 = 0, b_0 = 1 ; a_1 = 1, b_1 = 0 ; a_2 = -1, b_2 = -2 ; a_3 = 2, b_3 = 4$. On sait qu'un tel polynôme $P(X)$ est unique et s'écrit

$$P(X) = 1 \cdot L_0(X) + 0 \cdot L_1(X) - 2 \cdot L_2(X) + 4L_3(X)$$

où

$$L_0(X) = \frac{(X-1)(X+1)(X-2)}{(0-1)(0+1)(0-2)} = \frac{1}{2}(X^3 - 2X^2 - X + 2)$$

$$L_1(X) = \frac{(X-0)(X+1)(X-2)}{(1-0)(1+1)(1-2)} = \frac{-1}{2}(X^3 - X^2 - 2X)$$

$$L_2(X) = \frac{(X-0)(X-1)(X-2)}{(-1-0)(-1-1)(-1-2)} = \frac{-1}{6}(X^3 - 3X^2 + 2X)$$

$$L_3(X) = \frac{(X-0)(X-1)(X+1)}{(2-0)(2-1)(2+1)} = \frac{1}{6}(X^3 - X)$$

Ainsi :

$$P(X) = \frac{3}{2}X^3 - 2X^2 - \frac{1}{2}X + 1.$$
