



Continuité

Applications continues

Exercice 1

Soit X un espace topologique et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Montrer que f est continue si et seulement si pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, les ensembles $\{x ; f(x) < \lambda\}$ et $\{x ; f(x) > \lambda\}$ sont des ouverts de X .
2. Montrer que si f est continue, pour tout ω ouvert de \mathbb{R} , $f^{-1}(\omega)$ est un F_σ ouvert de X (F_σ = réunion dénombrable de fermés).

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002353]

Exercice 2

1. Soit C l'espace des fonctions continues réelles sur $[0, 1]$ muni de la métrique $d_1(f, g) = \int_0^1 |f - g| dx$, puis de la métrique $d_\infty(f, g) = \sup_x |f(x) - g(x)|$. Vérifier que l'application $f \rightarrow \int_0^1 |f| dx$ de C dans \mathbb{R} est 1-lipschitzienne dans les deux cas.
2. Soit c l'espace des suites réelles convergentes, muni de la métrique $d(x, y) = \sup_n |x(n) - y(n)|$. Si on désigne par $\ell(x)$ la limite de la suite x , montrer que ℓ est une application continue de c dans \mathbb{R} . En déduire que c_0 est fermé dans c .

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002354]

Exercice 3

Soit f, g deux applications continues de X dans Y , espaces topologiques, Y étant séparé. Montrer que $\{f = g\}$ est fermé dans X ; en déduire que si f et g coïncident sur une partie dense de X , alors $f = g$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002355]

Exercice 4

Une application de X dans Y est dite *ouverte* si l'image de tout ouvert de X est un ouvert de Y ; *fermée* si l'image de tout fermé de X est un fermé de Y .

1. Montrer qu'une fonction polynomiale de \mathbb{R} dans \mathbb{R} est une application fermée.
2. Montrer que l'application $(x, y) \in X \times Y \rightarrow x \in X$ est ouverte mais pas nécessairement fermée (considérer l'hyperbole équilatère de \mathbb{R}^2).
3. Montrer que la fonction indicatrice de l'intervalle $[0, \frac{1}{2}]$, comme application de \mathbb{R} dans $\{0, 1\}$, est surjective, ouverte, fermée, mais pas continue.
4. Montrer que toute application ouverte de \mathbb{R} dans \mathbb{R} et continue est monotone.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002356]

Exercice 5

1. Montrer que f est continue si et seulement si $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ pour tout A dans X . Que peut-on dire alors de l'image par f d'un ensemble dense dans X ?

2. Montrer que f est fermée si et seulement si $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$, et que f est ouverte si et seulement si $f(\overset{\circ}{A}) \subset f(\overset{\circ}{A})$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002357]

Applications uniformément continues

Exercice 6

1. Soit f une fonction réelle continue sur $[0, 1]$; montrer que f est “presque lipschitzienne” au sens :
 $\forall \varepsilon > 0 \exists C_\varepsilon ; \forall x, y \in [0, 1] \quad |f(x) - f(y)| \leq C_\varepsilon |x - y| + \varepsilon.$
2. Montrer qu’une fonction f uniformément continue de \mathbb{R} dans \mathbb{R} vérifie pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x)| \leq a|x| + b$ où a et b sont des constantes.

[002358]

Exercice 7

Soit f une fonction continue de $]0, 1[$ dans \mathbb{R} . Montrer que, si f est uniformément continue, elle est bornée. Réciproque?

[002359]

Exercice 8

Soit f une fonction uniformément continue sur \mathbb{R} telle que $\int_0^\infty f(t)dt$ converge. Montrer que f tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$. Retrouver ainsi le fait que la fonction $\sin(x^2)$ n’est pas uniformément continue.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002360]

Applications linéaires bornées

Exercice 9

Soient E_1, E_2 et F des espaces normés sur \mathbb{R} et soit $B : E_1 \times E_2 \rightarrow F$ une application bilinéaire. Montrer que B est continue si et seulement s’il existe $M > 0$ tel que

$$\|B(x)\| \leq M \|x_1\| \|x_2\| \quad \text{pour tout } x = (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2 .$$

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002361]

Exercice 10

Soient E et F deux espaces normés et $L : E \rightarrow F$ une application linéaire vérifiant : $(L(x_n))_n$ est bornée dans F pour toute suite $(x_n)_n$ de E tendant vers $0 \in E$. Montrer que L est continue.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002362]

Exercice 11

Soient E et F deux espaces normés réels et $f : E \rightarrow F$ une application bornée sur la boule unité de E et vérifiant

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{pour tout } x, y \in E .$$

Montrer que f est linéaire continue.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002363]

Exercice 12

Calculer la norme des opérateurs suivants :

- Le shift sur l^∞ défini par $S(x)_{n+1} = x_n, S(x)_0 = 0$.
- $X = \mathcal{C}([0, 1])$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et $Tf(x) = f(x)g(x)$ où $g \in X$.

Calculer la norme des formes linéaires suivantes :

- $X = \mathcal{C}([0, 1])$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et $u(f) = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ où $g \in X$ est une fonction qui ne s'annule qu'en $x = 1/2$.
- $X = l^2$ et $u(x) = \sum a_n x_n$ où (a_n) est dans X .
- $X = l^1$ et $u(x) = \sum a_n x_n$ où (a_n) est dans l^∞ .
- X l'espace des suites convergentes muni de la norme sup et $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ l'application $u(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} x_j$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002364]

Exercice 13

Soit $X = \mathbb{R}[x]$ l'ensemble des polynômes. Pour $P(x) = \sum_{k=0}^p a_k x^k$ on pose $\|P\| = \sup_k |a_k|, U(P)(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} a_k x^k$ et $V(P)(x) = \sum_{k=1}^n k a_k x^k$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ définit une norme et que U et V définissent des applications linéaires de X dans X .
2. Examiner si U et V sont continues ?

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002365]

Exercice 14

Soit l^∞ l'espace des suites réelles muni avec la norme uniforme, i.e. $\|x\|_\infty = \sup_n |x_n|$. On considère l'application $A : l^\infty \rightarrow l^\infty$ définie par

$$A(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) = (x_1, x_2/2, \dots, x_n/n, \dots).$$

Montrer que :

1. A est injective et continue avec $\|A\| = 1$. Par contre, A n'est pas surjective.
2. A admet un inverse à gauche mais qu'il n'est pas continu.

[Correction ▼](#)

[002366]

Exercice 15

Soit X un espace normé, $L : X \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire non nulle et $H = L^{-1}(\{0\})$ son noyau.

1. Montrer que, si L est continue, alors H est un sous-espace fermé dans X . Établir la relation

$$\text{dist}(a, H) = \frac{|L(a)|}{\|L\|} \quad \text{pour tout } a \in X.$$

2. Réciproquement, supposons que le noyau H est un fermé. Démontrer alors que $\text{dist}(a, H) > 0$ dès que $a \in X \setminus H$ et en déduire que L est continue de norme au plus $|L(a)|/\text{dist}(a, H)$.
3. Peut-on généraliser ceci à des applications linéaires entre espaces normés ?

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002367]

Exercice 16

Soit $X = \mathcal{C}([0, 1])$ avec la norme $\|f\| = \int_0^1 |f(t)| dt$. Montrer que la forme linéaire $f \in X \mapsto f(0) \in \mathbb{R}$ n'est pas continue. Que peut-on en déduire pour le sous-espace des fonctions de X nulles en 0 ?

[Correction ▼](#)

[002368]

Exercice 17

Soit $X = \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) ; (1+x^2)|f(x)| \text{ soit bornée}\}$. On pose $N(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}} (1+x^2)|f(x)|$. Vérifier que N est une norme, puis montrer que la forme linéaire suivante L est continue et calculer sa norme :

$$L : X \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{définie par} \quad L(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx.$$

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002369]

Indication pour l'exercice 1 ▲

1. Utiliser le fait que tout ouvert de \mathbb{R} est l'union dénombrable d'intervalles ouverts.
 2. Écrire un intervalle fermé comme union dénombrable d'intervalles ouverts, puis utiliser la même remarque que ci-dessus.
-

Indication pour l'exercice 2 ▲

1.
 2. Pour montrer que c_0 est fermé, l'écrire comme image réciproque de quelque chose.
-

Indication pour l'exercice 3 ▲

Montrer que le complémentaire est un ouvert. Si vous le souhaitez, placez-vous dans des espaces métriques.

Indication pour l'exercice 4 ▲

1. Pour un polynôme P , la limite de $P(x)$ ne vaut $\pm\infty$ que lorsque x tend vers $\pm\infty$.
-

Indication pour l'exercice 5 ▲

1. Pour le sens direct utiliser la caractérisation de l'adhérence par les suites. Pour le sens réciproque, montrer que l'image réciproque d'un fermé est un fermé.
-

Indication pour l'exercice 8 ▲

1. Par l'absurde, considérer $I(x) = \int_0^x f$. Trouver une suite (p_n) telle que $(I(p_n))$ ne soit pas une suite de Cauchy.
 2. Pour montrer que cette intégrale converge utiliser le changement de variable $u = t^2$ puis faire une intégration par partie.
-

Indication pour l'exercice 9 ▲

Si la relation est vérifiée montrer que B est continue en x en calculant $B(x+y) - B(x)$. Si B est continue alors en particulier B est continue en $(0,0)$, fixer le ε de cette continuité,...

Indication pour l'exercice 10 ▲

La continuité de L sur E équivaut la continuité en 0. Par l'absurde supposer que L n'est pas continue en 0 et construire une suite (x_n) qui tend vers 0 mais avec $(L(x_n))$ non bornée.

Indication pour l'exercice 11 ▲

Il faut montrer $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$. Le faire pour $\lambda \in \mathbb{N}$, puis $\lambda \in \mathbb{Z}$, puis $\lambda \in \mathbb{Q}$ et enfin $\lambda \in \mathbb{R}$.

Indication pour l'exercice 12 ▲

1. $\|S\| = 1$;
2. $\|T\| = \|g\|_\infty$;
3. $\|u\| = \int_0^1 |g|$, on distinguera les cas où g reste de signe constant et g change de signe;
4. $\|u\| = \|a_n\|_2$;

5. $\|u\| = \|a\|_\infty$;

6. $\|u\| = 1$.

Indication pour l'exercice 13 ▲

U est continue et $\|U\| = 1$, V n'est pas continue.

Indication pour l'exercice 15 ▲

1. Montrer d'abord que X se décompose sous la forme $H + \mathbb{R}.a$.
 2. ...
 3. Non ! Chercher un contre-exemple dans les exercices précédents.
-

Indication pour l'exercice 17 ▲

Montrer que $\|L\| = \pi$.

Correction de l'exercice 1 ▲

1. Sens direct. Si f est continue alors $\{x \mid f(x) < \lambda\} = f^{-1}(]-\infty, \lambda[)$ est un ouvert comme image réciproque par une application continue de l'intervalle ouvert $]-\infty, \lambda[$. De même avec $]\lambda, +\infty[$.
Réciproque. Tout d'abord, tout intervalle ouvert $]a, b[$, ($a < b$) peut s'écrire

$$]a, b[=]-\infty, b[\cap]a, +\infty[.$$

Donc

$$f^{-1}(]a, b[) = f^{-1}(]-\infty, b[) \cap f^{-1}(]a, +\infty[)$$

est une intersection de deux ouverts donc un ouvert de X . Soit O un ouvert de \mathbb{R} , alors O peut s'écrire comme l'union dénombrables d'intervalles ouverts :

$$O = \bigcup_{i \in I}]a_i, b_i[.$$

Donc

$$f^{-1}(O) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(]a_i, b_i[)$$

est une union d'ouverts donc un ouvert de X .

2. Nous le faisons d'abord pour un intervalle ouvert $]a, b[$.

$$]a, b[= \bigcup_{j \in \mathbb{N}^*} [a + \frac{1}{j}, b - \frac{1}{j}].$$

Donc

$$f^{-1}(]a, b[) = \bigcup_{j \in \mathbb{N}^*} f^{-1}([a + \frac{1}{j}, b - \frac{1}{j}]),$$

est une union dénombrable de fermés. Maintenant comme pour la première question, tout ouvert O de \mathbb{R} s'écrit $O = \bigcup_{i \in I}]a_i, b_i[$, avec I dénombrable. Donc on peut écrire

$$f^{-1}(O) = \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in \mathbb{N}^*} f^{-1}([a_i + \frac{1}{j}, b_i - \frac{1}{j}]),$$

qui est une union dénombrable de fermés (mais c'est un ouvert!).

Correction de l'exercice 2 ▲

1. Soit F l'application définie par $F(f) = \int_0^1 |f|$. Alors

$$|F(f) - F(g)| = \left| \int_0^1 |f| - |g| \right| \leq \int_0^1 |f - g| = d_1(f, g) \leq d_\infty(f, g).$$

Donc pour les deux distances d_1 et d_∞ , F est lipschitzienne de rapport 1.

2. Soit $\varepsilon > 0$ alors en posant $\eta = \varepsilon$ on obtient la continuité : si $d(x, y) < \varepsilon$ alors

$$|\ell(x) - \ell(y)| \leq \varepsilon.$$

Donc ℓ est continue, et $c_0 = \ell^{-1}(\{0\})$ est un fermé, car c'est l'image réciproque du fermé $\{0\}$ par l'application continue ℓ .

Correction de l'exercice 3 ▲

Soit $A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$. Alors soit $C = X \setminus A = \{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\}$. Soit $x \in C$ comme $f(x) \neq g(x)$ et que Y est séparé, il existe un voisinage ouvert V_1 de $f(x)$ et V_2 de $g(x)$ tel que $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Notons $U =$

$f^{-1}(V_1) \cap g^{-1}(V_2)$. Alors U est un ouvert de X contenant x . Maintenant pour $x' \in U$, alors $f(x') \in V_1, g(x') \in V_2$ donc $f(x') \neq g(x')$, donc $x' \in C$. Bilan U est inclus dans C . Donc C est ouvert.

Application : si A est dense dans X alors $\bar{A} = X$, mais comme A est fermé $A = \bar{A}$. Donc $A = X$, c'est-à-dire f et g sont égales partout.

Correction de l'exercice 4 ▲

1. Soit P un polynôme, et F un fermé de \mathbb{R} . Soit (y_n) une suite convergente d'éléments de $P(F)$, et $y \in \mathbb{R}$ sa limite. Il existe $x_n \in F$ tel que $y_n = P(x_n)$. Comme (y_n) est bornée (car convergente) alors (x_n) aussi est bornée, en effet un polynôme n'a une limite infini qu'en $\pm\infty$. Comme (x_n) est une suite bornée de \mathbb{R} on peut en extraire une sous-suite convergente $(x_{\phi(n)})$ de limite x . Comme F est fermé, $x \in F$. Comme P est continue (c'est un polynôme) alors $y_{\phi(n)} = P(x_{\phi(n)}) \rightarrow P(x)$, mais $(y_{\phi(n)})$ converge aussi vers y . Par unicité de la limite $y = P(x) \in P(F)$. Donc $P(F)$ est fermé.
2. Soit $X = Y = \mathbb{R}$ et $H = (xy = 1)$ est un fermé de $X \times Y$, mais si $\pi(x, y) = x$ alors $\pi(H) = \mathbb{R}^*$ n'est pas un fermé de $X = \mathbb{R}$.
3. A vérifier...

Correction de l'exercice 5 ▲

1. \Rightarrow . Soit f continue et $y \in f(\bar{A})$. Il existe $x \in \bar{A}$ tel que $y = f(x)$. Soit $x_n \in A$ tel que (x_n) converge vers x . Alors $y_n = f(x_n) \in A$. Comme f est continue alors (y_n) converge vers $f(x) = y$. Donc y est adhérent à $f(A)$. Conclusion $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$.
 \Leftarrow . Soit $f : X \rightarrow Y$ et soit F un fermé de Y . Notons $A = f^{-1}(F)$. Alors $f(A) \subset F$ donc l'équation $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$ devient $f(\bar{A}) \subset \bar{F} = F$ car F est fermé. Donc $\bar{A} \subset f^{-1}(F) = A$. Donc $\bar{A} \subset A$, d'où $\bar{A} = A$. Donc A est fermé. Bilan l'image réciproque de tout fermé F est un fermé, donc f est continue.
 Application : si A est dense, alors $\bar{A} = X$, et sous les hypothèses précédentes alors $f(A)$ est dense dans l'image de X par f : en effet $\overline{f(A)}$ contient $f(\bar{A}) = f(X)$
2. \Rightarrow . Soit f fermé et soit $A \subset X$. Alors $A \subset \bar{A}$ donc $f(A) \subset \overline{f(\bar{A})}$, donc comme \bar{A} est un fermé et f est fermée alors $\overline{f(\bar{A})}$ est un fermé contenant $f(A)$. Mais comme $\overline{f(A)}$ est le plus petit fermé contenant $f(A)$ alors $\overline{f(A)} \subset \overline{f(\bar{A})}$.
 \Leftarrow . La relation pour un fermé F donne $\overline{f(F)} \subset f(\bar{F}) = f(F)$. Donc $\overline{f(F)} = f(F)$. Donc $f(F)$ est fermé. Donc f est fermée.
 Même type de raisonnement avec f ouverte.

Correction de l'exercice 8 ▲

1. Supposons que f ne tende pas vers 0. Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Pour tout $n \geq 0$, il existe $x_n \geq n$ tel que $|f(x_n)| > \varepsilon$. Sans perte de généralité nous supposons $f(x_n) > \varepsilon$. Appliquons l'uniforme continuité : soit $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2}$, Il existe η tel que pour $|x_n - y| \leq \eta$ on ait $|f(x_n) - f(y)| < \varepsilon'$. Donc pour un tel y , $f(y) > \frac{\varepsilon}{2} > 0$. Donc f est strictement positive sur $[x_n - \eta, x_n + \eta]$. Notons alors (p_n) définie par $p_{2n} = x_n - \eta$, $p_{2n+1} = x_n + \eta$. Soit $I(x) = \int_0^x f$. Alors $I(p_{2n+1}) - I(p_{2n}) = \int_{x_n - \eta}^{x_n + \eta} f(t) dt \geq \frac{\varepsilon}{2} \cdot 2\eta = \varepsilon\eta$. Donc la suite $(I(p_n))$ n'est pas de une suite de Cauchy, donc ne converge pas, donc la fonction $x \mapsto I(x)$ ne converge pas non plus, et donc $\int_0^\infty f(t) dt$ diverge.
2. Par le changement de variable $u = t^2$ puis une intégration par partie, on montre que l'intégrale $\int_0^\infty \sin(t^2) dt$ converge, mais comme $f(x) = \sin(x^2)$ ne tend pas vers 0 alors f n'est pas uniformément continue sur \mathbb{R} .

Correction de l'exercice 9 ▲

Pour $x = (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$ on définit $\|x\| = \max(\|x_1\|, \|x_2\|)$.

1. Sens \Leftarrow . Soit $M > 0$ tel que $\|B(x)\| \leq M\|x_1\|\|x_2\|$. Montrons que B est continue au point $x = (x_1, x_2)$ fixé. Soit $y = (y_1, y_2)$ alors

$$B(x+y) - B(x) = B(x_1+y_1, x_2+y_2) - B(x_1, x_2) = B(x_1, y_2) + B(x_2, y_1) + B(y_1, y_2).$$

Donc

$$\|B(x+y) - B(x)\| \leq M\|x_1\|\|y_2\| + M\|x_2\|\|y_1\| + M\|y_1\|\|y_2\|.$$

Pour $\|y_1\| \leq \frac{\varepsilon}{M\|x_1\|}$ on a $M\|x_1\|\|y_2\| \leq \varepsilon$ (si $x_1 = 0$ il n'y a rien à choisir ici). Pour $\|y_2\| \leq \frac{\varepsilon}{M\|x_2\|}$ on a $M\|x_2\|\|y_1\| \leq \varepsilon$ (si $x_2 = 0$ il n'y a rien à choisir ici). Enfin pour $\|y_1\| \leq \sqrt{\frac{\varepsilon}{M}}$ et $\|y_2\| \leq \sqrt{\frac{\varepsilon}{M}}$ on a $M\|y_1\|\|y_2\| \leq \varepsilon$. Donc en prenant $\eta = \min(\frac{\varepsilon}{M\|x_1\|}, \frac{\varepsilon}{M\|x_2\|}, \sqrt{\frac{\varepsilon}{M}})$, on obtient que pour $\|y\| = \max(\|y_1\|, \|y_2\|) \leq \eta$ on a $\|B(x+y) - B(x)\| \leq 3\varepsilon$. Ce qui prouve la continuité. Donc B est continue sur $E_1 \times E_2$.

2. Sens \Rightarrow . Si B est continue partout, en particulier elle est continue en 0. Je choisis $\varepsilon = 1$, il existe $\eta > 0$ tel que $\|x\| \leq \eta$ alors $\|B(x)\| \leq 1$. Donc pour $\|x_1\| \leq \eta$ et $\|x_2\| \leq \eta$ on a $\|B(x_1, x_2)\| \leq 1$. Soit maintenant $y = (y_1, y_2) \in E_1 \times E_2$, ($y_1 \neq 0, y_2 \neq 0$) on a $(\eta \frac{y_1}{\|y_1\|}, \eta \frac{y_2}{\|y_2\|})$ de norme $\leq \eta$ donc $B(\eta \frac{y_1}{\|y_1\|}, \eta \frac{y_2}{\|y_2\|}) \leq 1$ et par bilinéarité cela fournit : $B(y_1, y_2) \leq \frac{1}{\eta^2} \|y_1\|\|y_2\|$, et ce pour tout (y_1, y_2) . La constante cherchée étant $\frac{1}{\eta^2}$.

Correction de l'exercice 10 ▲

Comme L est linéaire il suffit de montrer que L est continue en 0. Supposons que cela ne soit pas vrai, alors il faut nier la continuité de L en 0 qui s'écrit :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta > 0 \quad \forall x \in E \quad (\|x\| < \eta \Rightarrow \|L(x)\| < \varepsilon).$$

La négation s'écrit alors :

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall \eta > 0 \quad \exists x \in E \quad (\|x\| < \eta \text{ et } \|L(x)\| \geq \varepsilon).$$

Soit donc un tel $\varepsilon > 0$ de la négation, pour η de la forme $\eta = \frac{1}{n}$, on obtient y_n tel que $\|y_n\| < \frac{1}{n}$ et $\|L(y_n)\| \geq \varepsilon$. On pose $x_n = \sqrt{n}y_n$, alors $\|x_n\| = \sqrt{n}\|y_n\| < \frac{1}{\sqrt{n}}$ donc (x_n) est une suite de E qui tend vers 0. Par contre $\|L(x_n)\| = \sqrt{n}\|L(y_n)\| \geq \varepsilon\sqrt{n}$, donc la suite $(L(x_n))$ n'est pas bornée. Par contraposition nous avons obtenu le résultat souhaité.

Correction de l'exercice 11 ▲

- Si f est linéaire et bornée sur la boule unité alors elle est continue (voir le cours ou refaire la démonstration).
- Il reste à montrer que f est linéaire : on a déjà $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour tout x, y reste donc à prouver $f(\lambda x) = \lambda f(x)$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in E$.
 - Pour $\lambda \in \mathbb{Z}$, c'est une récurrence, $f(2x) = f(x+x) = f(x) + f(x) = 2f(x)$. Puis $f(3x) = f(2x+x) = f(2x) + f(x) = 2f(x) + f(x) = 3f(x)$ etc. Donc $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$. De plus $0 = f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x)$ donc $f(-x) = -f(x)$. Ensuite on a $f(-nx) = -nf(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$. Bilan : pour tout $\lambda \in \mathbb{Z}$ on a $f(\lambda x) = \lambda f(x)$.
 - Pour $\lambda \in \mathbb{Q}$, soit $\lambda = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{Z}$.

$$f\left(\frac{p}{q}x\right) = pf\left(\frac{1}{q}x\right) = \frac{p}{q}qf\left(\frac{x}{q}\right) = \frac{p}{q}f\left(q\frac{x}{q}\right) = \frac{p}{q}f(x).$$

Nous avons utilisé intensivement le premier point.

- Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ alors il existe une suite (λ_n) d'éléments de \mathbb{Q} qui converge vers λ . Fixons $x \in E$.

$$f(\lambda x) - \lambda f(x) = f(\lambda x) - f(\lambda_n x) + f(\lambda_n x) - \lambda f(x) = f((\lambda - \lambda_n)x) + (\lambda_n - \lambda)f(x).$$

Nous avons utilisé le second point. Soit $\varepsilon \in \mathbb{Q}_+^*$. Pour n assez grand on a $\|(\lambda - \lambda_n)x\| < \varepsilon$. Donc $\|\frac{1}{\varepsilon}(\lambda - \lambda_n)x\| \in B(0, 1)$ or f est bornée sur la boule unité donc il existe $M > 0$ tel que $f(\frac{1}{\varepsilon}(\lambda - \lambda_n)x) \leq M$.

$\lambda_n x) \leq M$ (quelque soit n). Donc $f(\lambda - \lambda_n)x \leq M\varepsilon$ (ε est rationnel donc on peut le "sortir"). De même pour n assez grand on a $(\lambda_n - \lambda)f(x) < \varepsilon$. Maintenant

$$\|f(\lambda x) - \lambda f(x)\| \leq \|f((\lambda - \lambda_n)x)\| + \|(\lambda_n - \lambda)f(x)\| < M\varepsilon + \varepsilon.$$

Donc pour x, λ fixés, $\|f(\lambda x) - \lambda f(x)\|$ est aussi petit que l'on veut, donc est nul ! D'où $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.

Correction de l'exercice 12 ▲

1. Pour tout x , $\|S(x)\| = \|x\|$ donc $\|S\| = 1$.
2. $\|T(f)\|_\infty = \|f \times g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$. Donc pour $f \neq 0$, $\frac{\|T(f)\|_\infty}{\|f\|_\infty} \leq \|g\|_\infty$. De plus en g , on obtient $\frac{\|T(g)\|_\infty}{\|g\|_\infty} = \frac{\|g^2\|_\infty}{\|g\|_\infty} = \|g\|_\infty$. Donc $\|T\| = \|g\|_\infty$.
3. On a $|u(f)| \leq \|f\|_\infty \int_0^1 |g(x)| dx$ donc $\|u\| \leq \int_0^1 |g(x)| dx$. Si g ne change pas de signe sur $[0, 1]$ alors pour f la fonction constant égale à 1, on obtient $|u(f)| = \|f\|_\infty \int_0^1 |g(x)| dx$ donc $\|u\| = \int_0^1 |g(x)| dx$. Si g change de signe alors il ne le fait qu'une fois et en $\frac{1}{2}$. Soit h_n la fonction définie par $h_n(x) = 1$ si $x \in [0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$, $h_n(x) = -1$ si $x \in [\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1]$ et h_n est affine sur $[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}]$ et continue sur $[0, 1]$. Cette fonction est construite de telle sorte que si g est positive puis négative alors $h_n \times g$ est une fonction continue qui converge uniformément vers $|g|$: $\|h_n g - |g|\|_\infty \rightarrow 0$. Donc $|u(h_n)| = \int_0^1 h_n \times g$ et par la convergence uniforme alors $|u(h_n)|$ converge vers $\int_0^1 |g|$. Donc $\|u\| = \int_0^1 |g|$.
4. $|u(x)| = |\sum a_n x_n| \leq \|a_n\|_2 \|x_n\|_2$ (c'est Cauchy-Schwartz) donc $\|u\| \leq \|a_n\|_2$. Pour la suite $x = a$ on a égalité d'où $\|u\| = \|a_n\|_2$.
5. $|u(x)| = |\sum a_n x_n| \leq \sum |a_n x_n| \leq \|a\|_\infty \sum |x_n| = \|a\|_\infty \|x_n\|_1$, donc $\|u\| \leq \|a\|_\infty$. Soit p fixé, soit $i(p)$ un indice tel que $|a_{i(p)}| = \max_{j=1, \dots, p} |a_j|$. On construit une suite x^p de la manière suivante : $x^p = (0, 0, \dots, 0, a_{i(p)}, 0, 0, 0, \dots)$ (des zéros partout sauf $a_{i(p)}$ à la place $i(p)$). Alors $\|x^p\|_1 = |a_{i(p)}|$ et $|u(x^p)| = a_{i(p)}^2$. Donc $\frac{|u(x^p)|}{\|x^p\|_1} = |a_{i(p)}|$. Lorsque p tend vers $+\infty$, $|a_{i(p)}| \rightarrow \|a\|_\infty$. Donc $\|u\| = \|a\|_\infty$.
6. $|u(x)| = |\lim x_n| \leq \|x\|_\infty$, donc $\|u\| \leq 1$. Pour $x = (1, 1, 1, \dots)$ on obtient l'égalité $\|u\| = 1$.

Correction de l'exercice 13 ▲

1. Il suffit de l'écrire...
2. Calculons la norme de U : $\|U(P)\| = \sup_k |\frac{1}{k} a_k| \leq \sup_k |a_k| \leq \|P\|$. Donc pour tout P , $\frac{\|U(P)\|}{\|P\|} \leq 1$. Et pour $P(x) = x$ on a égalité donc $\|U\| = 1$.
3. Pour V , prenons $P_k(x) = x^k$, alors $\|P_k\| = 1$, mais $\|V(P_k)\| = k$. Donc V n'est pas bornée sur la boule unité donc V n'est pas continue.

Correction de l'exercice 14 ▲

1. **A injective** : Si $A(x_1, x_2, \dots) = A(y_1, y_2, \dots)$ alors $(x_1, x_2/2, \dots, x_n/n, \dots) = (y_1, y_2/2, \dots, y_n/n, \dots)$ donc $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n, \dots$. Donc A est injective.
A continue : $\|A(x)\|_\infty = \sup_n \frac{x_n}{n} \leq \sup_n x_n \leq \|x\|_\infty$. Donc $\|A\| \leq 1$ donc A est continue.
Norme de A : Pour $x = (1, 0, 0, \dots)$. On a $\|x\|_\infty = 1$ et $\|A(x)\|_\infty = 1$ Donc la norme de A est exactement 1.
A n'est pas surjective : posons $y = (1, 1, 1, \dots) \in l^\infty$. Soit x une suite telle que $A(x) = y$ alors $x = (1, 2, 3, 4, \dots)$. Mais $\|x\|_\infty = +\infty$ donc $x \notin l^\infty$. En conséquence $A : l^\infty \rightarrow l^\infty$ n'est pas surjective.
2. L'inverse à gauche de A est B définie par

$$B(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) = (x_1, 2x_2, \dots, nx_n, \dots)$$

de sorte que pour $x \in l^\infty$ on ait $B \circ A(x) = x$. Posons la suite $x^p = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, 0, \dots) \in l^\infty$ (des zéros partout et le 1 à la p -ième place). Alors $\|x^p\|_\infty = 1$ et $\|B(x^p)\|_\infty = p$. Donc $\frac{\|B(x^p)\|_\infty}{\|x^p\|_\infty} = p$, donc la norme de B n'est pas finie et B n'est pas continue.

Correction de l'exercice 15 ▲

1. Si $L(a) = 0$ alors $a \in H$ donc $\text{dist}(a, H) = 0$ donc la relation est vraie. Supposons que $L(a) \neq 0$. Alors on a $X = H + \mathbb{R}.a$. En effet pour $x \in X$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $L(x) = \lambda L(a)$. Donc $L(x - \lambda a) = 0$. Posons $h = x - \lambda a$, alors $h \in H$ et $x = h + \lambda a$ est la décomposition suivant $H + \mathbb{R}.a$.

Si L est continue alors $\|L\|$ est finie.

$$\begin{aligned}\|L\| &= \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|L(x)\|}{\|x\|} \\ &= \sup_{h \in H, \lambda \in \mathbb{R}, h + \lambda a \neq 0} \frac{\|L(h + \lambda a)\|}{\|h + \lambda a\|} \\ &= |L(a)| \sup_{h \in H, \lambda \in \mathbb{R}, h + \lambda a \neq 0} \frac{|\lambda|}{\|h + \lambda a\|} \\ &= |L(a)| \sup_{h \in H} \frac{1}{\|h + a\|} \\ &= |L(a)| \frac{1}{\inf_{h \in H} \|h + a\|} \\ &= |L(a)| \frac{1}{\text{dist}(a, H)}\end{aligned}$$

Ce qui était l'égalité demandée.

2. Si H est fermé alors $\text{dist}(a, H) > 0$ si $a \notin H$ (voir les exercices sur les compacts), par l'égalité démontrée ci-dessus on a $\|L\|$ finie donc L est continue.
3. Soit $X = \mathbb{R}[x]$. Pour $P(x) = \sum_{k=0}^p a_k x^k$ on pose $\|P\| = \sup_k |a_k|$, et $V(P)(x) = \sum_{k=1}^n k a_k x^k$. Alors $\text{Ker } V = \{0\}$ est fermé mais V n'est pas continue (voir l'exercice 13).
-

Correction de l'exercice 16 ▲

Notons $L : X \rightarrow \mathbb{R}$ l'application linéaire définie par $L(f) = f(0)$. Prenons f_n définie par $f_n(t) = 2n(1 - nt)$ pour $t \in [0, \frac{1}{n}]$ et $f(t) = 0$ si $t > \frac{1}{n}$. Alors $\|f_n\| = 1$ alors que $L(f_n) = 2n$. Donc le rapport $\frac{|L(f_n)|}{\|f_n\|} = 2n$ n'est pas borné, donc L n'est pas continue. Si $H = \{f \mid f(0) = 0\}$ alors $H = \text{Ker } L = L^{-1}(0)$. Comme L n'est pas continue alors H n'est pas fermé (voir l'exercice 15).

Correction de l'exercice 17 ▲

N est bien une norme. Et on a pour tout x , $(1 + x^2)|f(x)| \leq N(f)$.

$$|L(f)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f| \leq \int_{\mathbb{R}} \frac{N(f)}{1 + x^2} dx \leq N(f) \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1 + x^2} = N(f) [\arctan x]_{-\infty}^{+\infty} = N(f)\pi.$$

Donc pour tout f on a

$$\frac{\int f}{N(f)} \leq \pi.$$

De plus pour $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ on obtient l'égalité. Donc la norme $\|L\|$ de l'application L est π .
