



Plans tangents à un graphe, différentiabilité

Exercice 1

Trouver l'équation du plan tangent pour chaque surface ci-dessous, au point (x_0, y_0, z_0) donné :

1. $z = \sqrt{19 - x^2 - y^2}$, $(x_0, y_0, z_0) = (1, 3, 3)$;
2. $z = \sin(\pi xy) \exp(2x^2 y - 1)$, $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1/2, 1)$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002628]

Exercice 2

On demande à un étudiant de trouver l'équation du plan tangent à la surface d'équation $z = x^4 - y^2$ au point $(x_0, y_0, z_0) = (2, 3, 7)$. Sa réponse est

$$z = 4x^3(x - 2) - 2y(y - 3).$$

1. Expliquer, sans calcul, pourquoi cela ne peut en aucun cas être la bonne réponse.
2. Quelle est l'erreur commise par l'étudiant ?
3. Donner la réponse correcte.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002629]

Exercice 3

Trouver les points sur le parabolôïde $z = 4x^2 + y^2$ où le plan tangent est parallèle au plan $x + 2y + z = 6$. Même question avec le plan $3x + 5y - 2z = 3$.

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002630]

Exercice 4

Soit C le cône d'équation $z^2 = x^2 + y^2$ et C^+ le demi-cône où $z \geq 0$. Pour un point quelconque M_0 de $C \setminus \{(0, 0, 0)\}$, de coordonnées $(x_0, y_0, \pm \sqrt{x_0^2 + y_0^2})$, on note \mathcal{P}_{M_0} le plan tangent au cône C en M_0 .

1. Déterminer un vecteur normal et l'équation du plan \mathcal{P}_{M_0} .
2. Montrer que l'intersection du cône C avec le plan vertical d'équation $y = ax$ où $a \in \mathbb{R}$ est constituée de deux droites \mathcal{D}_1 et \mathcal{D}_2 et que l'intersection du demi-cône C^+ avec ce plan vertical est constituée de deux demi-droites \mathcal{D}_1^+ et \mathcal{D}_2^+ .
3. Montrer que le plan tangent au cône C est le même en tout point de $\mathcal{D}_1 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ (respectivement en tout point de $\mathcal{D}_2 \setminus \{(0, 0, 0)\}$).

[Indication ▼](#) [Correction ▼](#)

[002631]

Exercice 5

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R}^2 par $f(x, y) = x^2 - 2y^3$.

1. Déterminer l'équation du plan tangent \mathcal{P}_{M_0} au graphe G_f de f en un point quelconque M_0 de G_f .
2. Pour le point M_0 de coordonnées $(2, 1, 2)$, déterminer tous les points M tels que le plan tangent en M soit parallèle à \mathcal{P}_{M_0} .


Exercice 6

Soit la fonction $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0)$$

et $f(0, 0) = 0$.

1. Montrer que f est continue et que, quel que soit $v \in \mathbb{R}^2$, la dérivée directionnelle $D_v f(x, y)$ existe en chaque $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mais que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.
2. La dérivée directionnelle $D_v f(0, 0)$ est-elle linéaire en v ? Les droites appartenant à la famille des droites passant par l'origine et de vecteurs directeurs $(v, D_v f(0, 0)) \in \mathbb{R}^3$, forment-elles un plan? Expliquer comment on peut observer la réponse sur la figure.
3. Le vecteur v étant fixé, qu'est-ce qu'on peut dire de la continuité de $D_v f(x, y)$ en (x, y) ?

**Exercice 7**

Utiliser une approximation affine bien choisie pour calculer une valeur approchée des nombres suivants :

$$\exp[\sin(3.16) \cos(0.02)], \quad \arctan[\sqrt{4.03} - 2 \exp(0.01)].$$

Indication pour l'exercice 1 ▲

Le plan tangent à la surface d'équation $f(x, y, z) = 0$ au point (x_0, y_0, z_0) est donné par l'équation

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0. \quad (1)$$

Dans le cas (1.), les calculs deviennent plus simples avec l'équation

$$z^2 = 19 - x^2 - y^2.$$

Indication pour l'exercice 2 ▲

Ne pas confondre les variables pour l'équation de la surface, les variables pour l'équation de la tangente en un point, et les coordonnées du point de contact.

Indication pour l'exercice 3 ▲

Le plan tangent à la surface d'équation $z = f(x, y)$ au point (x_0, y_0, z_0) est donné par l'équation

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (2)$$

Indication pour l'exercice 4 ▲

Le vecteur normal de la surface d'équation $f(x, y, z) = 0$ au point (x_0, y_0, z_0) est le vecteur

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0), \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \right). \quad (3)$$

Indication pour l'exercice 5 ▲

Utiliser la version (2) de l'équation d'un plan tangent à une surface en un point.

Indication pour l'exercice 6 ▲

Pour les majorations, utiliser les coordonnées polaires (r, φ) dans le plan. Distinguer tout de suite les parties triviales des parties non triviales de l'exercice.

Indication pour l'exercice 7 ▲

Prendre

$$f(x, y) = \exp[\sin(\pi + x) \cos y] = \exp[-\sin x \cos y],$$
$$h(x, y) = \arctan[\sqrt{4 + x} - 2 \exp(y)].$$

Correction de l'exercice 1 ▲

1. Le plan tangent à la surface d'équation $z^2 = 19 - x^2 - y^2$ au point (x_0, y_0, z_0) est donné par l'équation

$$2z_0(z - z_0) = -2x_0(x - x_0) - 2y_0(y - y_0)$$

d'où, au point $(1, 3, 3)$, cette équation s'écrit

$$6(z - 3) = -2(x - 1) - 6(y - 3)$$

ou

$$x + 3y + 3z = 19$$

2. Soit f la fonction définie par $f(x, y) = \sin(\pi xy) \exp(2x^2y - 1)$. Les dérivées partielles de f sont

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \pi y \cos(\pi xy) \exp(2x^2y - 1) + 4xy \sin(\pi xy) \exp(2x^2y - 1) \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \pi x \cos(\pi xy) \exp(2x^2y - 1) + 2x^2 \sin(\pi xy) \exp(2x^2y - 1)\end{aligned}$$

d'où

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1/2) = 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1/2) = 2.$$

Le plan tangent à la surface d'équation $z = \sin(\pi xy) \exp(2x^2y - 1)$ au point (x_0, y_0, z_0) est donné par l'équation

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

d'où, au point $(1, 1/2, 1)$, cette équation s'écrit

$$z - 1 = 2(x - 1) + 2(y - 1/2)$$

ou

$$2x + 2y - z = 2.$$

Correction de l'exercice 2 ▲

1. L'équation d'un plan tangent doit être une équation linéaire !
2. La confusion est exactement celle à éviter suivant les indications données.
3. D'après (1), le plan tangent à la surface d'équation $z = f(x, y) = x^4 - y^2$ au point $(x_0, y_0, z_0) = (2, 3, 7)$ est donné par l'équation

$$z - 7 = \frac{\partial f}{\partial x}(2, 3)(x - 2) + \frac{\partial f}{\partial y}(2, 3)(y - 3)$$

c.a.d.

$$z - 7 = 32(x - 2) - 6(y - 3).$$

Correction de l'exercice 3 ▲

Suivant l'indication, le plan tangent à la surface d'équation $z = 4x^2 + y^2$ au point (x_0, y_0, z_0) est donné par l'équation

$$\begin{aligned}z &= z_0 + 8x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) \\ &= 8x_0x + 2y_0y + z_0 - 8x_0^2 - 2y_0^2 = 8x_0x + 2y_0y - z_0\end{aligned}$$

d'où par

$$z - 8x_0x - 2y_0y = z_0. \quad (4)$$

Pour que ce plan soit parallèle au plan d'équation $x + 2y + z = 6$ il faut et il suffit que $(1, 2) = (-8x_0, -2y_0)$ d'où que $x_0 = -1/8$ et $y_0 = -1$. Par conséquent, le point cherché sur le parabolôïde $z = 4x^2 + y^2$ est le point $(-1/8, -1, 17/16)$. De même, pour que le plan (4) soit parallèle au plan d'équation $3x + 5y - 2z = 3$ il faut et il suffit que $(3/2, 5/2) = (8x_0, 2y_0)$ d'où que $x_0 = 3/16$ et $y_0 = 5/4$, et le point cherché sur le parabolôïde $z = 4x^2 + y^2$ est alors le point $(3/16, 5/4, 9/64 + 25/16) = (3/16, 5/4, 109/64)$.

Correction de l'exercice 4 ▲

1. Le vecteur normal du cône C au point (x_0, y_0, z_0) de C est le vecteur $(x_0, y_0, -z_0)$ et le plan tangent au cône C en ce point est donné par l'équation

$$x_0x + y_0y - z_0z = 0$$

car l'origine appartient à ce plan.

2. L'intersection du cône C avec le plan vertical d'équation $y = ax$ où $a \in \mathbb{R}$ est constituée des points $x(1, a, \pm\sqrt{1+a^2})$ où $x \in \mathbb{R}$, c.a.d. des deux droites

$$\mathcal{D}_1 = \{x(1, a, \sqrt{1+a^2}); x \in \mathbb{R}\}, \quad \mathcal{D}_2 = \{x(1, a, -\sqrt{1+a^2}); x \in \mathbb{R}\}.$$

L'intersection du demi-cône C^+ avec ce plan vertical est donc constituée des deux demi-droites

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_1^+ &= \{x(1, a, \sqrt{1+a^2}); x \in \mathbb{R}, x \geq 0\} \\ \mathcal{D}_2^+ &= \{x(-1, -a, \sqrt{1+a^2}); x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}. \end{aligned}$$

3. Le vecteur normal en un point quelconque $x(1, a, \sqrt{1+a^2})$ de \mathcal{D}_1 respectivement $x(1, a, -\sqrt{1+a^2})$ de \mathcal{D}_2 est le vecteur $x(1, a, -\sqrt{1+a^2})$ respectivement $x(1, a, \sqrt{1+a^2})$ d'où la direction et donc le plan tangent au cône C sont le même en tout point de $\mathcal{D}_1 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ respectivement $\mathcal{D}_2 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.

Correction de l'exercice 5 ▲

1. La forme (2) de l'équation du plan tangent au graphe $z = x^2 - 2y^3$ de la fonction f au point (x_0, y_0, z_0) nous donne l'équation

$$z - z_0 = 2x_0(x - x_0) - 6y_0^2(y - y_0) = 2x_0x - 6y_0^2y - 2x_0^2 + 6y_0^3$$

2. Au point $(2, 1, 2)$, ce plan tangent est ainsi donné par l'équation

$$4x - 6y - z = 0.$$

Pour que ce plan soit parallèle au plan tangent au point (x_1, y_1, z_1) distinct de (x_0, y_0, z_0) il faut et il suffit que $(4, 6, -1) = (2x_1, 6y_1^2, -1)$ et $y_1 \neq 1$, c.a.d. que $(x_1, y_1, z_1) = (2, -1, 6)$.

Correction de l'exercice 6 ▲

1. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \neq (0,0)}} \frac{xy^2}{x^2+y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos \varphi \sin^2 \varphi$ existe et vaut zéro puisque $\cos \varphi \sin^2 \varphi$ est borné. Par conséquent f est continue à l'origine et donc partout. Il est évident que la fonction f est différentiable en chaque point distinct de l'origine. Soit $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ non nul. Alors

$$D_v f(0, 0) = \frac{d}{dt} \left(t \frac{ab^2}{a^2 + b^2} \right) \Big|_{t=0} = \frac{ab^2}{a^2 + b^2}$$

existe d'où $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$; puisqu'il existe une dérivée directionnelle non nulle, la fonction f ne peut pas être différentiable en $(0, 0)$.

2. L'association $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, v \mapsto D_v f(0,0)$ n'est évidemment pas linéaire et les droites appartenant à la famille des droites passant par l'origine et de vecteurs directeurs $(v, D_v f(0,0)) \in \mathbb{R}^3$ ne forment pas un plan.
3. Dans $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y^2(x^2 + y^2) - 2x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^4 - x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \sin^4 \varphi - \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2xy(x^2 + y^2) - 2xy^3}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2} = 2 \sin \varphi \cos^3 \varphi$$

d'où, en coordonnées polaires,

$$D_v f(x,y) = D_v f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = a(\sin^4 \varphi - \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi) + 2b \sin \varphi \cos^3 \varphi$$

et, φ étant fixé,

$$\lim_{r \rightarrow 0} D_v f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = a(\sin^4 \varphi - \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi) + 2b \sin \varphi \cos^3 \varphi.$$

Par conséquent, $D_v f(x,y)$ n'est pas continu en (x,y) sauf peut-être si $a = 0$. Par exemple, avec $\sin \varphi = 1$, on trouve

$$\lim_{r \rightarrow 0} D_v f(0, r) = a$$

et $a \neq \frac{ab^2}{a^2 + b^2}$ sauf si $a = 0$. Si $a = 0$, la dérivée directionnelle D_v est la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial y}$ et, φ étant fixé,

$$\lim_{r \rightarrow 0} D_v f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = 2b \sin \varphi \cos^3 \varphi$$

ce qui n'est pas nul si $\sin \varphi \cos \varphi$ ne l'est pas. Puisque $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$, la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial y}$ n'est continue en $(0,0)$ non plus.

Correction de l'exercice 7 ▲

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\cos x \cos y \exp[-\sin x \cos y]$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \sin x \sin y \exp[-\sin x \cos y]$$

etc. d'où, avec $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = -1$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$,

$$f(x,y) = f(0,0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)y + \dots = 1 - x + \dots$$

Avec $x = 0,0184$ on trouve, pour $\exp[\sin(3.16) \cos(0.02)]$, la valeur approchée $1 - 0,0184 = 0,9816$.

N.B. On peut faire mieux si nécessaire : Avec

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = (\sin x \cos y + \cos^2 x \cos^2 y) \exp[-\sin x \cos y]$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (\cos x \sin y + \cos x \cos y \sin x \sin y) \exp[-\sin x \cos y]$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (\sin x \cos y + \sin^2 x \sin^2 y) \exp[-\sin x \cos y]$$

on trouve

$$f(x,y) = f(0,0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)y + \dots = 1 - x + \frac{1}{2}x^2 + \dots$$

etc.

De même,

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{1}{2(1 + (\sqrt{4+x} - 2\exp(y))^2)\sqrt{4+x}}$$
$$\frac{\partial h}{\partial y} = -\frac{2\exp(y)}{1 + (\sqrt{4+x} - 2\exp(y))^2}$$

etc. d'où, avec $\frac{\partial h}{\partial x}(0,0) = \frac{1}{4}$ et $\frac{\partial h}{\partial y}(0,0) = -2$,

$$h(x,y) = h(0,0) + \frac{\partial h}{\partial x}(0,0)x + \frac{\partial h}{\partial y}(0,0)y + \dots = \frac{1}{4}x - 2y + \dots$$

Avec $x = 0,03$ et $y = 0,01$ on trouve, pour $\arctan[\sqrt{4.03} - 2\exp(0.01)]$, la valeur approchée $0,0075 - 0,02 = -0,00125$.
