

Coniques

Exercices de Jean-Louis Rouget. Retrouver aussi cette fiche sur www.maths-france.fr

* très facile ** facile *** difficulté moyenne **** difficile ***** très difficile

I : Incontournable T : pour travailler et mémoriser le cours

Exercice 1 *IT

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $\mathcal{R} = (0, \vec{i}, \vec{j})$. Éléments caractéristiques de la conique dont une équation cartésienne dans \mathcal{R} est

- 1. $y^2 = x$,
- 2. $y^2 = -x$,
- 3. $y = x^2$,
- 4. $y = -x^2$.
- 1. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$,
- 2. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$,
- 3. $x^2 + 2y^2 = 1$.
- 1. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$,
- 2. $-\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$,
- 3. $x^2 - y^2 = 1$.

[Correction ▼](#)

[005540]

Exercice 2 *IT

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $\mathcal{R} = (0, \vec{i}, \vec{j})$. Éléments caractéristiques de la courbe dont une équation dans \mathcal{R} est

- 1. $y = x^2 + x + 1$,
- 2. $y^2 + y - 2x = 0$,
- 3. $y = \sqrt{2x+3}$.
- 1. $x^2 + x + 2y^2 + y = 0$,
- 2. $y = -2\sqrt{-x^2+x}$.
- $x^2 - y^2 + x + y + 1 = 0$.

[Correction ▼](#)

[005541]

Exercice 3 **IT

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $\mathcal{R} = (0, \vec{i}, \vec{j})$. Nature et éléments caractéristiques de la courbe dont une équation en repère orthonormé est

1. $y = \frac{1}{x}$,
2. $41x^2 - 24xy + 34y^2 - 106x + 92y + 74 = 0$,
3. $x^2 + 2xy + y^2 + 3x - 2y + 1 = 0$,
4. $(x - y + 1)^2 + (x + y - 1)^2 = 0$,
5. $x^2 + y^2 - 3x - y + 3 = 0$,
6. $x(x - 1) + (y - 2)(y - 3) = 0$,

7. $(x+y+1)(x-y+3) = 3,$
8. $(2x+y-1)^2 - 3(x+y) = 0.$

[Correction ▼](#)

[005542]

Exercice 4 *IT

Étudier les courbes dont une équation polaire (en repère orthonormé direct) est

1. $r = \frac{1}{1+2\cos\theta},$
2. $r = \frac{1}{1+\cos\theta},$
3. $r = \frac{1}{2+\cos\theta},$
4. $r = \frac{1}{1-\sin\theta},$
5. $r = \frac{1}{2-\cos\theta}.$

[Correction ▼](#)

[005543]

Exercice 5 ***

Déterminer l'image du cercle trigonométrique par la fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

$$z \mapsto \frac{1}{1+z+z^2}$$

[Correction ▼](#)

[005544]

Exercice 6 **

Déterminer l'orthoptique d'une parabole, c'est-à-dire l'ensemble des points du plan par lesquels il passe deux tangentes à la parabole, perpendiculaires l'une à l'autre.

[Correction ▼](#)

[005545]

Exercice 7 ***

1. **Droite de SIMSON.** Soit (A, B, C) un triangle et M un point du plan. Montrer que les projetés orthogonaux P, Q et R de M sur les cotés $(BC), (CA)$ et (AB) du triangle (ABC) sont alignés si et seulement si M est sur le cercle circonscrit à (ABC) . La droite passant par P, Q et R s'appelle la droite de SIMSON du point M relativement au triangle ABC (ou au cercle (ABC)).
2. **Parabole tangente aux trois côtés d'un triangle.** Lieu des foyers des paraboles tangentes à trois droites deux à deux non parallèles. En particulier, fournir la construction des points de contacts.

[Correction ▼](#)

[005546]

Exercice 8 **

(\mathcal{C}) est le cercle de diamètre $[A, B]$. (D) est la tangente en A à (\mathcal{C}) . P est un point variable sur (\mathcal{C}) et (T) la tangente en P à (\mathcal{C}) . (T) recoupe (D) en S . La perpendiculaire à (AB) passant par P coupe (BS) en M . Ensemble des points M ?

[Correction ▼](#)

[005547]

Exercice 9 ***

Soit, dans \mathbb{R}^3 rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, la courbe (Γ) d'équations $\begin{cases} y = x^2 + x + 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$.
Montrer que (Γ) est une parabole dont on déterminera le sommet, l'axe, le foyer et la directrice.

[Correction ▼](#)

[005548]

Exercice 10 *

Que vaut l'excentricité de l'hyperbole équilatère (une hyperbole est équilatère si et seulement si ses asymptotes sont perpendiculaires)?

Exercice 11 ***

Soit P un polynôme de degré 3 à coefficients réels. Montrer que la courbe d'équation $P(x) = P(y)$ dans un certain repère orthonormé, est en général la réunion d'une droite et d'une ellipse d'excentricité fixe.

[Correction ▼](#)

[005550]

Exercice 12 ***

Soit (\mathcal{H}) une hyperbole équilatère de centre O et P et Q deux points de (\mathcal{H}) symétriques par rapport à O . Montrer que le cercle de centre P et de rayon PQ recoupe (\mathcal{H}) en trois points formant un triangle équilatéral de centre P .

[Correction ▼](#)

[005551]

Exercice 13 ***

Equation cartésienne de la parabole tangente à (Ox) en $(1,0)$ et à (Oy) en $(0,2)$.


[Correction ▼](#)

[005552]

Correction de l'exercice 1 ▲

On note \mathcal{C} la courbe considérée.

1. (a) \mathcal{C} est la parabole de sommet O , d'axe focal (Ox) , de paramètre $p = \frac{1}{2}$ tournée vers les x positifs. Son foyer est le point $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ et sa directrice est $\mathcal{D} : x = -\frac{1}{4}$.
- (b) \mathcal{C} est la parabole de sommet O , d'axe focal (Ox) , de paramètre $p = \frac{1}{2}$ tournée vers les x négatifs. Son foyer est le point $F\left(-\frac{1}{4}, 0\right)$ et sa directrice est $\mathcal{D} : x = \frac{1}{4}$.
- (c) \mathcal{C} est la parabole de sommet O , d'axe focal (Oy) , de paramètre $p = \frac{1}{2}$ tournée vers les y positifs. Son foyer est le point $F\left(0, \frac{1}{4}\right)$ et sa directrice est $\mathcal{D} : y = -\frac{1}{4}$.
- (d) \mathcal{C} est la parabole de sommet O , d'axe focal (Oy) , de paramètre $p = \frac{1}{2}$ tournée vers les y négatifs. Son foyer est le point $F\left(0, -\frac{1}{4}\right)$ et sa directrice est $\mathcal{D} : y = \frac{1}{4}$.
2. (a) \mathcal{C} est une ellipse, de centre O avec $a = 5 > 3 = b$ et donc d'axe focal (Ox) . Ses sommets sont $A(5, 0)$, $A'(-5, 0)$, $B(0, 3)$ et $B'(0, -3)$.
 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 4$ et donc les foyers sont $F(4, 0)$ et $F'(-4, 0)$.
L'excentricité e vaut $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$.
Les directrices ont pour équations respectives $x = \frac{a}{e} = \frac{25}{4}$ et $x = -\frac{25}{4}$.
- (b) \mathcal{C} est une ellipse, de centre O avec $a = 3 < 5 = b$ et donc d'axe focal (Oy) . Ses sommets sont $A(3, 0)$, $A'(-3, 0)$, $B(0, 5)$ et $B'(0, -5)$.
 $c = \sqrt{b^2 - a^2} = 4$ et donc les foyers sont $F(0, 4)$ et $F'(0, -4)$.
L'excentricité e vaut $e = \frac{c}{b} = \frac{4}{5}$.
Les directrices ont pour équations respectives $y = \frac{b}{e} = \frac{25}{4}$ et $y = -\frac{25}{4}$.
- (c) $x^2 + 2y^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1$.
 \mathcal{C} est une ellipse, de centre O avec $a = 1 > \frac{1}{\sqrt{2}} = b$ et donc d'axe focal (Ox) .
Ses sommets sont $A(1, 0)$, $A'(-1, 0)$, $B\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ et $B'\left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.
 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et donc les foyers sont $F\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$ et $F'\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$.
L'excentricité e vaut $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
Les directrices ont pour équations respectives $x = \frac{a}{e} = \sqrt{2}$ et $x = -\sqrt{2}$.
3. (a) \mathcal{C} est une hyperbole de centre O et d'axe focal (Ox) avec $a = 4$ et $b = 3$ et donc $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$, puis $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$.
Les sommets sont $A(4, 0)$ et $A'(-4, 0)$ et les foyers sont $F(5, 0)$ et $F(-5, 0)$.
Les directrices sont les droites d'équations respectives $x = \frac{a}{e} = \frac{16}{5}$ et $x = -\frac{16}{5}$.
Les asymptotes sont les droites d'équations respectives $y = \frac{3}{4}x$ et $y = -\frac{3}{4}x$.
- (b) \mathcal{C} est une hyperbole de centre O et d'axe focal (Oy) avec $a = 4$ et $b = 3$ et donc $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$, puis $e = \frac{c}{b} = \frac{5}{3}$.
Les sommets sont $B(0, 3)$ et $B'(0, -3)$ et les foyers sont $F(0, 5)$ et $F(0, -5)$.
Les directrices sont les droites d'équations respectives $y = \frac{b}{e} = \frac{9}{5}$ et $y = -\frac{9}{5}$.
Les asymptotes sont les droites d'équations respectives $y = \frac{3}{4}x$ et $y = -\frac{3}{4}x$.



- (c) \mathcal{C} est une hyperbole de centre O et d'axe focal (Ox) avec $a = b = 1$ et donc $c = \sqrt{2}$, puis $e = \sqrt{2}$.
 Les sommets sont $A(1, 0)$ et $A'(-1, 0)$ et les foyers sont $F(\sqrt{2}, 0)$ et $F(-\sqrt{2}, 0)$.
 Les directrices sont les droites d'équations respectives $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.
 Les asymptotes sont les droites d'équations respectives $y = x$ et $y = -x$.

Correction de l'exercice 2 ▲

- (a) $y = x^2 + x + 1 \Leftrightarrow y = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \Leftrightarrow (y - \frac{3}{4}) = (x + \frac{1}{2})^2$. \mathcal{C} est la parabole de sommet $S(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$, d'axe focal la droite d'équation $x = -\frac{1}{2}$, de paramètre $p = \frac{1}{2}$ et donc de foyer $F(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4} + \frac{1}{4}) = (-\frac{1}{2}, 1)$ et de directrice d'équation $y = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.
 - (b) $y^2 + y - 2x = 0 \Leftrightarrow (y + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} - 2x = 0 \Leftrightarrow (y + \frac{1}{2})^2 = 2(x + \frac{1}{8})$. \mathcal{C} est la parabole de sommet $S(-\frac{1}{8}, -\frac{1}{2})$, d'axe focal la droite d'équation $y = -\frac{1}{2}$, de paramètre $p = 1$ et donc de foyer $F(-\frac{1}{8} + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = (\frac{3}{8}, -\frac{1}{2})$ et de directrice d'équation $x = -\frac{1}{8} - \frac{1}{2} = -\frac{5}{8}$.
 - (c) $y = \sqrt{2x+3} \Leftrightarrow y^2 = 2(x + \frac{3}{2})$ et $y \geq 0$. \mathcal{C} est une demi-parabole de sommet $S(-\frac{3}{2}, 0)$, d'axe focal (Ox) , de paramètre $p = 1$ et donc de foyer $F(-\frac{3}{2} + \frac{1}{2}, 0) = (-1, 0)$ et de directrice d'équation $x = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -2$.
- (a) $x^2 + x + 2y^2 + y = 0 \Leftrightarrow (x + \frac{1}{2})^2 + 2(y + \frac{1}{4})^2 = \frac{3}{8} \Leftrightarrow \frac{(x + \frac{1}{2})^2}{(\frac{\sqrt{3}}{8})^2} + \frac{(y + \frac{1}{4})^2}{(\frac{\sqrt{3}}{4})^2} = 1$. \mathcal{C} est une ellipse. Centre : $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$.
 $a = \sqrt{\frac{3}{8}} > \frac{\sqrt{3}}{4} = b$. Axe focal : $y = -\frac{1}{4}$. Sommets : $A(-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{8}}, -\frac{1}{4})$, $A'(-\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{3}{8}}, -\frac{1}{4})$, $B(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4})$ et $B'(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4})$. $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$. $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Foyers : $F(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{1}{4})$ et $F'(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{1}{4})$.
 Directrices : $x = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $x = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(b) $y = -2\sqrt{-x^2+x} \Leftrightarrow y^2 = 4(-x^2+x)$ et $y \leq 0 \Leftrightarrow \frac{(x-\frac{1}{2})^2}{(\frac{1}{2})^2} + y^2 = 1$ et $y \leq 0$. \mathcal{C} est une demi-ellipse.

Centre : $(\frac{1}{2}, 0)$. $a = \frac{1}{2} < 1 = b$. Axe focal : $x = 0$. Sommets : $A(1, 0)$, $A'(0, 0)$ et $B'(\frac{1}{2}, -1)$. $c = \sqrt{b^2 - a^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. $e = \frac{c}{b} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Foyers : $F(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ et $F'(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$. Directrices : $y = \frac{2}{\sqrt{3}}$ et $y = -\frac{2}{\sqrt{3}}$.

3. $x^2 - y^2 + x + y + 1 = 0 \Leftrightarrow (x + \frac{1}{2})^2 - (y - \frac{1}{2})^2 = -1$. \mathcal{C} est une hyperbole de centre $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ et d'axe focal la droite d'équation $x = -\frac{1}{2}$. $a = b = 1$. Sommets : $B(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ et $B'(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$. $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}$ puis $e = \frac{c}{b} = \sqrt{2}$. Foyers : $F(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \sqrt{2})$ et $F'(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \sqrt{2})$. Directrices : $y = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $y = \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}$. Asymptotes : $y = x + 1$ et $y = -x$.

Correction de l'exercice 3 ▲

1. On note \mathcal{H} l'hyperbole considérée. On tourne de $\frac{\pi}{4}$. Pour cela, on pose $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(X - Y) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Y) \end{cases}$. On a alors

$$y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow xy = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(X - Y)(X + Y) = 1 \Leftrightarrow \frac{X^2}{(\sqrt{2})^2} - \frac{Y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1.$$

Ainsi, si \mathcal{R} est le repère orthonormé initial (O, \vec{i}, \vec{j}) et \mathcal{R}' est le repère (O, \vec{I}, \vec{J}) où $\vec{I} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j})$ et $\vec{J} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\vec{i} + \vec{j})$, une équation de \mathcal{H} dans \mathcal{R} est $xy = 1$ et une équation de \mathcal{H} dans \mathcal{R}' est $\frac{X^2}{(\sqrt{2})^2} - \frac{Y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$. On obtient $a = b = \sqrt{2}$, $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$ et $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$. Les formules de changement

de repère s'écrivent $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(X - Y) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Y) \end{cases}$ et les formules inverses s'écrivent

$\begin{cases} X = \frac{1}{\sqrt{2}}(x + y) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(-x + y) \end{cases}$ (dans ce qui suit, les coordonnées d'un point dans \mathcal{R}' seront notées avec \mathcal{R}' en indice alors que les coordonnées dans \mathcal{R} seront notées sans écrire \mathcal{R} en indice).

Centre $O(0, 0)$

Asymptotes : bien sûr, les axes (Ox) et (Oy) .

Axe focal : l'axe (OX) ou encore la droite d'équation $y = x$ (dans \mathcal{R}).

Sommets : $A(\sqrt{2}, 0)_{\mathcal{R}'}$, $A'(-\sqrt{2}, 0)_{\mathcal{R}'}$ et donc **Sommets $A(1, 1)$ et $A'(-1, -1)$**

Foyers : $F(2, 0)_{\mathcal{R}'}$, $F'(-2, 0)_{\mathcal{R}'}$ et donc **Foyers $F(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ et $F'(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.**

Directrices : les droites d'équations $X = \pm \frac{a}{e} = \pm 1$ et donc dans \mathcal{R} , les droites d'équations respectives $x + y = \pm\sqrt{2}$.

2. Le discriminant de cette conique vaut $41 \times 34 - 12^2 = 1250 > 0$. Il s'agit donc d'une conique du genre ellipse. On pose $\begin{cases} x = \cos(\theta)X - \sin(\theta)Y \\ y = \sin(\theta)X + \cos(\theta)Y \end{cases}$ et on détermine θ (ou plutôt $\cos \theta$ et $\sin \theta$) de sorte que le terme en XY disparaisse. Mais, le coefficient de XY dans

$$41x^2 - 24xy + 34y^2 = 41(\cos(\theta)X - \sin(\theta)Y)^2 - 24(\cos(\theta)X - \sin(\theta)Y)(\sin(\theta)X + \cos(\theta)Y) + 34(\sin(\theta)X + \cos(\theta)Y)^2$$

vaut

$$-82\cos \theta \sin \theta - 24(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + 68\cos \theta \sin \theta = -24(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) - 14\cos \theta \sin \theta.$$

Ce coefficient est nul si et seulement si $-12\cos^2 \theta + 12\sin^2 \theta - 7\cos \theta \sin \theta = 0$ ou encore, après division par $\cos^2 \theta$, $12\tan^2 \theta - 7\tan \theta - 12 = 0$. On peut alors prendre $\tan \theta = \frac{4}{3}$, puis on peut prendre $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 \theta}} = \frac{3}{5}$ et $\sin \theta = \cos \theta \tan \theta = \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{5}$.

Posons donc $\begin{cases} x = \frac{3X-4Y}{5} \\ y = \frac{4X+3Y}{5} \end{cases}$ (*). On a alors

$$\begin{aligned} 41x^2 - 24xy + 34y^2 - 106x + 92y + 74 &= \frac{1}{25}(41(3X-4Y)^2 - 24(3X-4Y)(4X+3Y) + 34(4X+3Y)^2 \\ &\quad - 530(3X-4Y) + 460(4X+3Y) + 1850) \\ &= \frac{1}{25}(625X^2 + 1250Y^2 + 250X + 3500Y + 1850) \\ &= 25 \left(X^2 + 2Y^2 + \frac{2}{5}X + \frac{28}{5}Y + \frac{74}{25} \right) \end{aligned}$$

Une équation de la courbe dans le repère défini par (*) est donc $X^2 + 2Y^2 + \frac{2}{5}X + \frac{28}{5}Y + \frac{74}{25} = 0$. Ensuite,

$$X^2 + 2Y^2 + \frac{2}{5}X + \frac{28}{5}Y + \frac{74}{25} = 0 \Leftrightarrow \left(X + \frac{1}{5}\right)^2 + 2\left(Y + \frac{7}{5}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \left(X + \frac{1}{5}\right)^2 + \frac{\left(Y + \frac{7}{5}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1.$$

\mathcal{C} est une ellipse. On trouve $a = 1, b = \frac{\sqrt{2}}{2}, c = 1, e = \frac{1}{\sqrt{2}}$ puis Centre $\Omega(1, -1)$. Axe focal : $3x + 4y + 1 = 0$ et axe non focal : $-4x + 3y + 7 = 0$.

Sommets : $A\left(\frac{8}{5}, -\frac{1}{5}\right), A'\left(\frac{2}{5}, -\frac{9}{5}\right), B\left(1 - \frac{4\sqrt{2}}{5}, -1 + \frac{3\sqrt{2}}{5}\right)$ et $B'\left(1 + \frac{4\sqrt{2}}{5}, -1 - \frac{3\sqrt{2}}{5}\right)$.

Foyers : $F\left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}\right)$ et $F'\left(\frac{9}{5}, -\frac{8}{5}\right)$. Directrices : $4x - 3y + 3 = 0$ et $4x - 3y + 17 = 0$.

3. $x^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2$. On pose donc $\begin{cases} X = \frac{1}{\sqrt{2}}(x-y) \\ Y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x+y) \end{cases}$ ou encore $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(X+Y) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(-X+Y) \end{cases}$.

$$\begin{aligned} x^2 + 2xy + y^2 + 3x - 2y + 1 = 0 &\Leftrightarrow 2Y^2 + \frac{3}{\sqrt{2}}(X+Y) - \frac{2}{\sqrt{2}}(-X+Y) + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow 2\left(Y + \frac{1}{4\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{5}{\sqrt{2}}X + \frac{15}{16} = 0 \Leftrightarrow \left(Y + \frac{1}{4\sqrt{2}}\right)^2 = -\frac{5}{2\sqrt{2}}\left(X + \frac{3}{8\sqrt{2}}\right). \end{aligned}$$

\mathcal{C} est une parabole de paramètre $p = \frac{5}{4\sqrt{2}}$.

Sommet : $S\left(-\frac{5}{16}, \frac{1}{16}\right)$. Axe focal : $x + y + \frac{1}{4} = 0$.

Foyer : $F\left(-\frac{5}{8}, \frac{3}{8}\right)$. Directrice : $x - y - \frac{1}{4} = 0$.

4. \mathcal{C} est le point d'intersection des droites d'équation $x - y + 1 = 0$ et $x + y - 1 = 0$ c'est-à-dire le point de coordonnées $(0, 1)$.

5. $x^2 + y^2 - 3x - y + 3 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} > 0$ et donc \mathcal{C} est vide.

6. $x(x-1) + (y-2)(y-3) = 0$ est une équation du cercle de diamètre $[AB]$ où $A(0, 2)$ et $B(1, 3)$.

7. Si on pose $\begin{cases} X = x + y + 1 \\ Y = x - y + 3 \end{cases}$, on effectue un changement de repère non orthonormé. Dans le nouveau repère, \mathcal{C} admet pour équation cartésienne $XY = 3$ et donc \mathcal{C} est une hyperbole. Avec le changement de repère effectué, on obtient directement les éléments affines de cette hyperbole mais pas ses éléments métriques : hyperbole d'asymptotes les droites d'équations $x + y + 1 = 0$ et $x - y + 3 = 0$ et donc de centre $(-2, 1)$. Pour obtenir l'axe focal, l'excentricité, les foyers et les directrices il faut faire un changement de repère orthonormé.


8. Si on pose $\begin{cases} X = 2x + y + 1 \\ Y = 3x + 3y \end{cases}$, \mathcal{C} admet pour équation cartésienne dans le nouveau repère $Y = X^2$ et donc \mathcal{C} est une parabole. Pour obtenir ces éléments métriques, il faut un changement de repère orthonormé.

Correction de l'exercice 4 ▲

Etudier les courbes dont une équation polaire (en repère orthonormé direct) est


$$1) r = \frac{1}{1+2\cos\theta} \quad 2) r = \frac{1}{1+\cos\theta} \quad 3) r = \frac{1}{2+\cos\theta} \quad 4) r = \frac{1}{1-\sin\theta} \quad 5) r = \frac{1}{2-\cos\theta}.$$

1. \mathcal{C} est une conique d'excentricité 2 et donc une hyperbole.




L'axe focal est (Ox) . Les sommets sont les points d'intersection de \mathcal{C} et (Ox) c'est-à-dire les points $M(0)$ et $M(\pi)$ de coordonnées cartésiennes respectives $A'(\frac{1}{3}, 0)$ et $A(1, 0)$. Le centre Ω est le milieu de $[AA']$ c'est-à-dire $\Omega(\frac{2}{3}, 0)$. L'un des foyers est $F' = O$ et l'autre est le symétrique de F' par rapport à Ω : c'est le point $F(\frac{4}{3}, 0)$. Puisque $a = \frac{1}{3}$ et $e = 2$, les directrices sont les droites d'équation $x = x_\Omega - \frac{a}{e} = \frac{1}{2}$ et $x = \frac{5}{6}$. Les branches infinies sont obtenues pour $\theta = \pm \frac{2\pi}{3}$. Les asymptotes sont donc les droites passant par Ω d'angle polaire $\pm \frac{2\pi}{3}$. Ce sont les droites d'équations cartésiennes $y = \pm\sqrt{3}(x - \frac{2}{3})$.

2. \mathcal{C} est une conique d'excentricité 1 et donc une parabole.



L'axe focal est (Ox) . Le sommet est le point $M(0)$ de coordonnées cartésiennes $S(\frac{1}{2}, 0)$. Le foyer est $F = O$. Le point K est le symétrique de F par rapport à S et a pour coordonnées $(1, 0)$. La directrice a donc pour équation $x = 1$.


3. \mathcal{C} est une conique d'excentricité $e = \frac{1}{2}$ et donc une ellipse.




L'axe focal est (Ox) . Les sommets sur cet axe sont $A = M(0)$ de coordonnées $(\frac{1}{3}, 0)$ et $A' = M(\pi)$ de coordonnées $(-1, 0)$. Le centre Ω est le milieu de $[AA']$ et a pour coordonnées $(-\frac{1}{3}, 0)$. L'un des foyers est $F = O$. L'autre est le symétrique de F par rapport à Ω : c'est le point F' de coordonnées $(-\frac{2}{3}, 0)$.

Par suite, $c = \frac{1}{3}$, $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{(\frac{2}{3})^2 - (\frac{1}{3})^2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. D'où les sommets $B(-\frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ et $B'(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$. Les directrices sont les droites d'équations $x = x_\Omega + \frac{a}{e} = 1$ et $x = -\frac{5}{3}$.

4. $M(\theta - \frac{\pi}{2}) = [r(\theta - \frac{\pi}{2}), \theta - \frac{\pi}{2}] = [\frac{1}{1+\cos\theta}, \theta - \frac{\pi}{2}] = \text{rot}_{O, -\pi/2}([\frac{1}{1+\cos\theta}, \theta])$. Donc \mathcal{C} est l'image de la parabole d'équation polaire $r = \frac{1}{1+\cos\theta}$ par le quart de tour indirect de centre O .



5. $M(\theta + \pi) = [r(\theta + \pi), \theta + \pi] = [\frac{1}{2+\cos\theta}, \theta + \pi] = s_O([\frac{1}{2+\cos\theta}, \theta])$. Donc \mathcal{C} est l'image de l'ellipse d'équation polaire $r = \frac{1}{2+\cos\theta}$ par la symétrie centrale de centre O .



Correction de l'exercice 5 ▲

Un point du plan est sur le cercle de centre O et de rayon 1 si et seulement si son affixe z est de module 1 ou encore si et seulement si il existe un réel θ tel que $z = e^{i\theta}$. Or, pour θ réel,

$$f(e^{i\theta}) = \frac{1}{1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta}} = \frac{e^{-i\theta}}{e^{i\theta} + 1 + e^{-i\theta}} = \overline{\left(\frac{e^{i\theta}}{1 + 2\cos\theta} \right)}.$$

L'ensemble cherché est donc la symétrique par rapport à (Ox) de la courbe d'équation polaire $r = \frac{1}{1+2\cos\theta}$. Cette dernière est une ellipse, symétrique par rapport à (Ox) . Donc l'ensemble cherché est l'ellipse d'équation polaire $r = \frac{1}{1+2\cos\theta}$ (voir l'exercice 4, 1)).

Correction de l'exercice 6 ▲

Dans un certain repère orthonormé, la parabole \mathcal{P} admet une équation cartésienne de la forme $x^2 = 2py$. D'après la règle de dédoublement des termes, une équation de la tangente \mathcal{T}_{x_0} en un point $(x_0, y_0) = \left(x_0, \frac{x_0^2}{2p}\right)$ de \mathcal{P} est


$$xx_0 = p(y + y_0).$$

Les tangentes en $M_0(x_0, y_0)$ et $M_1(x_1, y_1)$ sont perpendiculaires si et seulement si $x_0x_1 + p^2 = 0$. L'orthoptique \mathcal{C} est donc l'ensemble des points d'intersection de \mathcal{T}_{x_0} et \mathcal{T}_{-p^2/x_0} où x_0 décrit \mathbb{R}^* .

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow \exists x_0 \in \mathbb{R}^* / \begin{cases} xx_0 = p\left(y + \frac{x_0^2}{2p}\right) \\ -x\frac{p^2}{x_0} = p\left(y + \frac{p^3}{2x_0^2}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}^* / \begin{cases} tx - py = \frac{t^2}{2} \\ px + ty = -\frac{p^3}{2t} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}^* / \begin{cases} x = \frac{1}{t^2+p^2} \left(\frac{t^3}{2} - \frac{p^4}{2t}\right) \\ y = \frac{1}{t^2+p^2} \left(-\frac{p^3}{2} - \frac{pt^2}{2}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}^* / \begin{cases} x = \frac{t^2-p^2}{2t} \\ y = -\frac{p}{2} \end{cases}. \end{aligned}$$

Maintenant, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2-p^2}{2t} = -\infty$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2-p^2}{2t} = +\infty$. Comme la fonction $t \mapsto \frac{t^2-p^2}{2t}$ est continue sur $]0, +\infty[$, quand t décrit $]0, +\infty[$, $x = \frac{t^2-p^2}{2t}$ décrit \mathbb{R} . Finalement, l'orthoptique \mathcal{C} est la droite d'équation $y = -\frac{p}{2}$ ou encore

l'orthoptique d'une parabole est sa directrice.



Correction de l'exercice 7 ▲

1. Soit M un point du plan. **1er cas.** Supposons que $M \notin (AB) \cup (AC) \cup (BC)$.


$$P, Q \text{ et } R \text{ alignés} \Leftrightarrow (\vec{PQ}, \vec{PR}) = 0 [\pi] \Leftrightarrow (\vec{PQ}, \vec{PM}) = (\vec{PR}, \vec{PM}) [\pi].$$

Maintenant, puisque les triangles MPC et MQC sont rectangles en P et Q respectivement, les points P et Q sont sur le cercle de diamètre $[MC]$. On en déduit que $(\vec{PQ}, \vec{PM}) = (\vec{CQ}, \vec{CM}) [\pi]$. De même, $(\vec{PR}, \vec{PM}) = (\vec{BR}, \vec{BM}) [\pi]$. Par suite,


$$\begin{aligned} P, Q \text{ et } R \text{ alignés} &\Leftrightarrow (\vec{CQ}, \vec{CM}) = (\vec{BR}, \vec{BM}) [\pi] \\ &\Leftrightarrow (\vec{CA}, \vec{CM}) = (\vec{BA}, \vec{BM}) [\pi] \\ &\Leftrightarrow M \text{ appartient au cercle circonscrit au triangle } ABC \text{ (privé des points } A, B \text{ et } C). \end{aligned}$$

2ème cas. Supposons par exemple que $M \in (AB)$. Dans ce cas, $M = R$. Si de plus M n'est ni A , ni B , alors $M \neq P$ et $M \neq Q$ puis les droites (MP) et (MQ) sont perpendiculaires aux droites (BC) et (AC) respectivement. Si par l'absurde, les points P, Q et R sont alignés, on a $(MP) = (MQ)$ et donc $(AB) \parallel (AC)$. Ceci est une contradiction. Donc, si les points P, Q et R sont alignés, M est l'un des trois points A, B ou C . La réciproque est immédiate. En résumant les deux cas,


P, Q et R sont alignés si et seulement si M est sur le cercle circonscrit au triangle ABC .



2. **Parabole tangente aux trois côtés d'un triangle.** Commençons par rappeler une construction usuelle de la tangente en un point d'une parabole : le triangle FMH est isocèle en M et la tangente en M à \mathcal{P} est la médiatrice du segment $[FH]$. Par suite, le projeté orthogonal P de F sur la tangente (T) est sur $5T_0$ la tangente au sommet de la parabole \mathcal{P} .



Soient A , B et C trois points non alignés. Si \mathcal{P} est une parabole tangente aux droites (BC) , (CA) et (AB) , les projetés orthogonaux P , Q et R de son foyer F sur les droites (BC) , (CA) et (AB) sont alignés sur la tangente au sommet de la parabole \mathcal{P} . D'après 1), le point F est nécessairement sur le cercle circonscrit au triangle ABC . Réciproquement, si F est l'un des trois points A , B ou C , F n'est pas solution car une tangente à une parabole ne passe jamais par son foyer. Soit donc F un point du cercle circonscrit au triangle ABC et distinct des points A , B et C . Montrons alors qu'il existe une parabole de foyer F , tangente aux droites (BC) , (CA) et (AB) . On construit les projetés orthogonaux P , Q et R de F sur les droites (BC) , (CA) et (AB) . Ils sont alignés sur la droite de SIMSON (T_0) de F relativement au triangle ABC . La parabole de foyer F et de tangente au sommet (T_0) est solution du problème posé. La construction des points de contact est fournie par le graphique de la page précédente : on construit les symétriques de F par rapport aux points P , Q et R (ces symétriques sont sur la directrice) puis on remonte perpendiculairement à (T_0) jusqu'à la parabole.



Correction de l'exercice 8 ▲

On choisit un repère orthonormé dans lequel A a pour coordonnées $(R, 0)$ et (\mathcal{C}) a pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$. Soit $P(R \cos t, R \sin t)$ un point de (\mathcal{C}) . La tangente (D) à (\mathcal{C}) en A est la droite d'équation $x = R$ et la tangente (T) à (\mathcal{C}) en P est la droite d'équation $x \cos t + y \sin t = R$. Quand $t \notin \pi\mathbb{Z}$, (T) recoupe (D) en le point S de coordonnées $(R, R \frac{1 - \cos t}{\sin t})$ ou encore $(R, R \tan(\frac{t}{2}))$. Une équation de la droite (BS) est $-\tan(\frac{t}{2})(x + R) + 2y = 0$. L'abscisse de M est $R \cos t$ et donc

$$y_M = \frac{1}{2} \tan\left(\frac{t}{2}\right) (x_M + R) = \frac{1}{2} R \tan\left(\frac{t}{2}\right) (\cos t + 1) = R \sin\left(\frac{t}{2}\right) \cos\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{1}{2} R \sin t.$$

L'ensemble des points M est donc le support de l'arc $\begin{cases} x = R \cos t \\ y = \frac{1}{2} R \sin t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$. C'est l'image du cercle \mathcal{C} dans l'affinité de base (AB) , de direction (D) et de rapport $\frac{1}{2}$ et donc une ellipse de grand axe $[AB]$.

$$\begin{cases} -X + \sqrt{3}Y = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ Z = 0 \end{cases} . \text{Eléments de } (\Gamma) \text{ dans } \mathcal{R} : \text{sommet } S\left(-\frac{3}{4}, \frac{13}{16}, \frac{15}{16}\right)_{\mathcal{R}}, \text{axe : } \begin{cases} 8x - 4y - 4z + 21 = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases} ,$$

$$\text{foyer } F\left(-\frac{7}{8}, \frac{7}{8}, 10\right)_{\mathcal{R}}, \text{directrice : } \begin{cases} 2y - 2z + 1 = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases} .$$

Correction de l'exercice 10 ▲

Soit \mathcal{H} une hyperbole. Il existe un repère orthonormé dans lequel \mathcal{H} admet une équation catésienne de la forme $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > 0$, $b > 0$). Dans ce repère, les asymptotes ont pour équations $y = \frac{b}{a}x$ et $y = -\frac{b}{a}x$. Elles sont perpendiculaires si et seulement si $\frac{b}{a}\left(-\frac{b}{a}\right)^2 = -1$ ou encore si et seulement si $a = b$. L'excentricité de \mathcal{H} est alors

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{2}.$$

L'excentricité de l'hyperbole équilatère vaut $\sqrt{2}$.

Correction de l'exercice 11 ▲

Notons \mathcal{C} l'ensemble des points considérés. Pour x réel, posons $P(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$.

$$\begin{aligned} P(x) = P(y) &\Leftrightarrow (x^3 - y^3) + A(x^2 - y^2) + B(x - y) = 0 \Leftrightarrow (x - y)((x^2 + xy + y^2) + A(x + y) + B) = 0 \\ &\Leftrightarrow y = x \text{ ou } x^2 + xy + y^2 + A(x + y) + B = 0. \end{aligned}$$

\mathcal{C} est donc la réunion de la droite d'équation $y = x$ et de la courbe \mathcal{E} d'équation $x^2 + xy + y^2 + A(x + y) + B = 0$. Pour déterminer la nature de \mathcal{E} , on fait un changement de repère orthonormé en posant

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(X - Y) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Y) \end{cases}$$

On obtient

$$\begin{aligned} x^2 + xy + y^2 + A(x + y) + B = 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{2}((X - Y)^2 + (X - Y)(X + Y) + (X + Y)^2) + \frac{A}{\sqrt{2}}X + B = 0 \\ &\Leftrightarrow 3X^2 + Y^2 + \sqrt{2}AX + 2B = 0 \Leftrightarrow 3\left(X + \frac{A\sqrt{2}}{6}\right)^2 + Y^2 = \frac{A^2 - 12B}{6} \quad (*) \end{aligned}$$

\mathcal{E} est une ellipse si et seulement si $A^2 - 12B > 0$ (sinon \mathcal{E} est un point ou est vide). Dans ce cas, puisque $a = \frac{1}{\sqrt{3}} < 1 = b$,

$$e = \frac{c}{b} = \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b} = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$


Correction de l'exercice 12 ▲

On choisit un repère orthonormé dans lequel P a pour coordonnées (a, b) , $a > 0$, $b > 0$ et l'hyperbole \mathcal{H} a pour équation $xy = ab$. Le cercle \mathcal{C} de centre P et de rayon PQ admet pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = a + 2\sqrt{a^2 + b^2} \cos t \\ y = b + 2\sqrt{a^2 + b^2} \sin t \end{cases}, t \in \mathbb{R}. \text{ Soit donc } M\left(a + 2\sqrt{a^2 + b^2} \cos t, b + 2\sqrt{a^2 + b^2} \sin t\right) \text{ un point de } \mathcal{C}.$$

$$\begin{aligned}
M \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow (a + 2\sqrt{a^2 + b^2} \cos t)(b + 2\sqrt{a^2 + b^2} \sin t) = ab \\
&\Leftrightarrow 2\sqrt{a^2 + b^2}(b \cos t + a \sin t) + 4(a^2 + b^2) \cos t \sin t = 0 \\
&\Leftrightarrow 2(a^2 + b^2) \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t + \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t + \sin(2t) \right) = 0 \\
&\Leftrightarrow \sin(2t) + \sin(t + t_0) = 0 \text{ où } \cos(t_0) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ et } \sin(t_0) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\
&\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} / 2t = -t - t_0 + 2k\pi \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z} / 2t = \pi + t + t_0 + 2k\pi \\
&\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} / t = -\frac{t_0}{3} + \frac{2k\pi}{3} \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z} / t = \pi + t_0 + 2k\pi.
\end{aligned}$$

$t = \pi + t_0 + 2k\pi$ fournit le point de coordonnées $(-a, -b)$ c'est-à-dire le point Q . Sinon, on obtient trois autres points les points $M(-\frac{t_0}{3})$, $M(-\frac{t_0}{3} + \frac{2\pi}{3})$ et $M(-\frac{t_0}{3} + \frac{4\pi}{3})$. On note A, B et C ces trois points. Puisque ces trois points sont sur un cercle de centre P et que $(\vec{PA}, \vec{PB}) = (\vec{PB}, \vec{PC}) = (\vec{PC}, \vec{PA}) = \frac{2\pi}{3}$, le triangle ABC est équilatéral.



Correction de l'exercice 13 ▲

On cherche l'équation d'une telle parabole \mathcal{P} sous la forme $(ax + by)^2 + 2cx + 2dy + e = 0$, $a^2 + b^2 = 1$, $a > 0$.

$$(1,0) \in \mathcal{P} \Leftrightarrow a^2 + 2c + e = 0 \text{ et } (0,2) \in \mathcal{P} \Leftrightarrow 4b^2 + 4d + e = 0.$$

D'après la règle de dédoublement des termes, une équation cartésienne de la tangente à \mathcal{P} en $(1,0)$ est $a^2x + aby + c(x+1) + dy + e = 0$ ou encore $(a^2 + c)x + (ab + d)y + c + e = 0$. Cette tangente est l'axe (Ox) si et

$$a^2 + c = c + e = 0 \text{ et } ab + d \neq 0.$$

seulement si $a^2 + c = c + e = 0$ et $ab + d \neq 0$. Une équation cartésienne de la tangente à \mathcal{P} en $(0,2)$ est $2abx + 2b^2y + cx + d(y+2) + e = 0$ ou encore $(2ab + c)x + (2b^2 + d)y + 2d + e = 0$. Cette tangente est l'axe

$$2b^2 + d = 2d + e = 0 \text{ et } 2ab + c \neq 0.$$

(Oy) si et seulement si $2b^2 + d = 2d + e = 0$ et $2ab + c \neq 0$. En résumé, \mathcal{P} est solution si et seulement si

$$\begin{cases} c = -a^2 \\ d = -2b^2 \\ e = a^2 = 4b^2 \\ a^2 + b^2 = 1 \\ ab + d \neq 0 \\ 2ab + c \neq 0 \\ a > 0 \end{cases}.$$

Maintenant, $(a^2 = 4b^2, a^2 + b^2 = 1 \text{ et } a > 0) \Leftrightarrow a = \frac{2}{\sqrt{5}}$ et $b = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}$. Le cas $b = \frac{1}{\sqrt{5}}$ fournit $d = -\frac{2}{5}$ puis $ab + d = 0$ ce qui est exclu. Donc, nécessairement $a = \frac{2}{\sqrt{5}}$ et $b = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ puis $c = -\frac{4}{5}$, $d = -\frac{2}{5}$ et $e = \frac{4}{5}$ qui sont effectivement solution du système. On obtient ainsi une et une seule courbe du second degré solution, à savoir la courbe d'équation cartésienne

$$(2x - y)^2 - 8x - 4y + 4 = 0.$$

Il reste à vérifier que cette courbe est effectivement une parabole. On pose $\begin{cases} X = \frac{1}{\sqrt{5}}(-x - 2y) \\ Y = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x - y) \end{cases}$ ou encore

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(-X + 2Y) \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2X - Y) \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} (2x - y)^2 - 8x - 4y + 4 = 0 &\Leftrightarrow 5Y^2 - \frac{8}{\sqrt{5}}(-X + 2Y) - \frac{4}{\sqrt{5}}(-2X - Y) + 4 = 0 \Leftrightarrow 5Y^2 - \frac{12}{\sqrt{5}}Y + \frac{16}{\sqrt{5}}X + 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow 5\left(Y - \frac{6}{5\sqrt{5}}\right)^2 = -\frac{16}{\sqrt{5}}\left(X + \frac{4}{5\sqrt{5}}\right). \end{aligned}$$

\mathcal{C} est donc effectivement une parabole.

