

## Réduction

---

Exercices de Jean-Louis Rouget. Retrouver aussi cette fiche sur [www.maths-france.fr](http://www.maths-france.fr)

\* très facile   \*\* facile   \*\*\* difficulté moyenne   \*\*\*\* difficile   \*\*\*\*\* très difficile

I : Incontournable

### Exercice 1 \*\*

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ . Pour  $n$  entier relatif donné, calculer  $A^n$  par trois méthodes différentes.

[Correction ▼](#)

[005651]

### Exercice 2 \*\*

Résoudre dans  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  l'équation  $X^2 = A$  où  $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 8 & 4 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

[Correction ▼](#)

[005652]

### Exercice 3 \*\*

Soit  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}$ .

1. Vérifier que  $A$  n'est pas diagonalisable.
2. Déterminer  $\text{Ker}(A - I)^2$ .

3. Montrer que  $A$  est semblable à une matrice de la forme  $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$

4. Calculer  $A^n$  pour  $n$  entier naturel donné.

[Correction ▼](#)

[005653]

### Exercice 4 \*\*\*

Soit  $f$  qui à  $P$  élément de  $\mathbb{R}_{2n}[X]$  associe  $f(P) = (X^2 - 1)P' - 2nXP$ .

Vérifier que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}_{2n}[X]$  puis déterminer les valeurs et vecteurs propres de  $f$ .  $f$  est-il diagonalisable ?

[Correction ▼](#)

[005654]

### Exercice 5 \*\*\*

Soit  $E = \mathbb{R}_3[X]$ . Pour  $P$  élément de  $E$ , soit  $f(P)$  le reste de la division euclidienne de  $AP$  par  $B$  où  $A = X^4 - 1$  et  $B = X^4 - X$ .

Vérifier que  $f$  est un endomorphisme de  $E$  puis déterminer  $\text{Ker} f$ ,  $\text{Im} f$  et les valeurs et vecteurs propres de  $f$ .

[Correction ▼](#)

[005655]

### Exercice 6 \*\*\*

Soit  $A$  une matrice rectangulaire de format  $(p, q)$  et  $B$  une matrice de format  $(q, p)$ . Comparer les polynômes caractéristiques de  $AB$  et  $BA$ .

[Correction ▼](#)

[005656]

---

### Exercice 7 \*\*\* I

Soient  $u$  et  $v$  deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. On suppose que  $u$  et  $v$  commutent et que  $v$  est nilpotent. Montrer que  $\det(u + v) = \det u$ .

[Correction ▼](#)

[005657]

---

### Exercice 8 \*\*\*\*

Soit  $A$  une matrice carrée de format  $n$ .

Montrer que  $A$  est nilpotente si et seulement si  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \operatorname{Tr}(A^k) = 0$ .

[Correction ▼](#)

[005658]

---

### Exercice 9 \*\*\* I

Soient  $f$  et  $g$  deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie vérifiant  $fg - gf = f$ . Montrer que  $f$  est nilpotent.

[Correction ▼](#)

[005659]

---

### Exercice 10 \*\*\*\*

Soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle.

Soient  $u$  et  $v$  deux endomorphismes de  $E$  tels que  $\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2 / uv - vu = \alpha u + \beta v$ . Montrer que  $u$  et  $v$  ont un vecteur propre en commun.

[Correction ▼](#)

[005660]

---

### Exercice 11 \*\*\*

Soit  $E = SL_2(\mathbb{Z}) = \{\text{matrices carrées de format } 2 \text{ à coefficients dans } \mathbb{Z} \text{ et de déterminant } 1\}$ .

1. Montrer que  $(E, \times)$  est un groupe
2. Soit  $A$  un élément de  $E$  tel que  $\exists p \in \mathbb{N}^* / A^p = I_2$ . Montrer que  $A^{12} = I_2$ .

[Correction ▼](#)

[005661]

---

### Exercice 12 \*\*\*\*

Montrer que toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.

[Correction ▼](#)

[005662]

---

### Exercice 13 \*\*\*\*

Soient  $A$  un élément de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  et  $M$  l'élément de  $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$  défini par blocs par  $M = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}$ .

Calculer  $\det M$ . Déterminer les éléments propres de  $M$  puis montrer que  $M$  est diagonalisable si et seulement si  $A$  est diagonalisable.

[Correction ▼](#)

[005663]

---

### Exercice 14 \*\*\*

Soient  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $|a| \neq |b|$ . Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & b & \dots & b \\ a & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ a & \dots & a & 0 \end{pmatrix}$ .

Montrer que les images dans le plan complexe des valeurs propres de  $A$  sont cocycliques. (Indication : pour

calculer  $\chi_A$ , considérer  $f(x) = \begin{vmatrix} -X+x & b+x & \dots & b+x \\ a+x & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b+x \\ a+x & \dots & a+x & -X+x \end{vmatrix}$ .)

[Correction ▼](#)

[005664]

**Exercice 15** \*\*\*I Matrices stochastiques

Soit  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $\forall (i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^2$ ,  $a_{i,j} \in [0,1]$  et  $\forall i \in \llbracket 1,n \rrbracket$ ,  $\sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1$ .

1. Montrer que 1 est valeur propre de  $A$ .
2. Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $A$ .
  - (a) Montrer que  $|\lambda| \leq 1$ .
  - (b) Montrer qu'il existe un réel  $\omega$  de  $[0,1]$  tel que  $|\lambda - \omega| \leq 1 - \omega$ . Conséquence géométrique ?

[Correction ▼](#)

[005665]

**Exercice 16** \*\*

Soit  $A$  une matrice antisymétrique réelle. Etudier la parité de son polynôme caractéristique.

[Correction ▼](#)

[005666]

**Exercice 17** \*\*

Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

Montrer que  $A$  est diagonalisable.

[Correction ▼](#)

[005667]

**Exercice 18** \*\*\*I Déterminant circulant

1. Soit  $J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & & & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$  (de format  $n \geq 3$ ). Diagonaliser  $J_n$ .

2. En déduire la valeur de  $\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & & a_{n-2} \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_2 & & \ddots & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix}$ .

[Correction ▼](#)

[005668]

**Exercice 19** \*\*\*I Matrices de permutations

Pour  $\sigma \in S_n$ ,  $n \geq 2$ , on définit la matrice  $P_\sigma$  par  $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leq i,j \leq n}$ .

1. Calculer  $\det(P_\sigma)$  pour tout  $\sigma \in S_n$ .
2. (a) Montrer que  $\forall (\sigma, \sigma') \in S_n^2$ ,  $P_\sigma \times P_{\sigma'} = P_{\sigma \circ \sigma'}$ .

- (b) On pose  $G = \{P_\sigma, \sigma \in S_n\}$ . Montrer que  $(G, \times)$  est un groupe isomorphe à  $S_n$ .
3. Soit  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Calculer  $AP_\sigma$ .
4. Trouver les valeurs propres d'une matrice de permutation (on pourra utiliser le résultat hors programme : toute permutation se décompose de manière unique à l'ordre près des facteurs en produit de cycles à supports disjoints).

[Correction ▼](#)

[005669]

**Exercice 20 \*\*\*** Décomposition de DUNFORD

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et  $f$  un endomorphisme de  $E$  dont le polynôme caractéristique est scindé sur  $\mathbb{K}$ .

Montrer qu'il existe un couple d'endomorphismes  $(d, n)$  et un seul tel que  $d$  est diagonalisable,  $n$  est nilpotent  $n$  et  $f = d + n$ .

[Correction ▼](#)

[005670]

**Exercice 21 \*\***

Trouver une matrice carrée  $A$  vérifiant  $A^4 - 3A^3 + A^2 - I = 0$ .

[Correction ▼](#)

[005671]

**Exercice 22 \*\*I**

Calculer  $\begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ b & \dots & b & a \end{vmatrix}$ .

[Correction ▼](#)

[005672]

**Exercice 23 \*\*\***

Soit  $A$  une matrice carrée de format 2 telle que  $A^2$  est diagonalisable et  $\text{Tr}A \neq 0$ . Montrer que  $A$  est diagonalisable dans  $\mathbb{C}$ .

[Correction ▼](#)

[005673]

**Exercice 24 \*\*\***

$E = C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Pour  $f$  élément de  $E$ ,  $\varphi(f)$  est l'application définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, (\varphi(f))(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \text{ si } x \neq 0 \text{ et } (\varphi(f))(0) = f(0).$$

1. Montrer que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $E$ .
2. Etudier l'injectivité et la surjectivité de  $\varphi$ .
3. Déterminer les éléments propres de  $\varphi$ .

[Correction ▼](#)

[005674]

**Exercice 25 \*\*\*I**

Sur  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. On donne trois endomorphismes  $f, u$  et  $v$  tels qu'il existe deux réels  $\lambda$  et  $\mu$  tels que pour  $k \in \{1, 2, 3\}$ ,  $f^k = \lambda^k u + \mu^k v$ . Montrer que  $f$  est diagonalisable.

[Correction ▼](#)

[005675]

**Exercice 26 \*\*I**

Résoudre dans  $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$  l'équation  $X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 27** \*\*\*

Soient  $f$  et  $g$  deux endomorphismes d'un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle qui commutent. Montrer que  $f$  et  $g$  sont simultanément trigonalisables.

Correction ▼

[005677]

**Exercice 28** \*\*

Soient  $A$  et  $B$  deux matrices carrées complexes de format  $n$ . Montrer que  $A$  et  $B$  n'ont pas de valeurs propres communes si et seulement si la matrice  $\chi_A(B)$  est inversible.

Correction ▼

[005678]

**Exercice 29** \*\*

Soit  $f$  un endomorphisme d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $P$  un polynôme. Montrer que  $P(f)$  est inversible si et seulement si  $P$  et  $\chi_f$  sont premiers entre eux.

Correction ▼

[005679]

**Exercice 30** \*\* (ESTP1994)

Soit  $M_{a,b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Peut-on trouver deux matrices distinctes semblables parmi les quatre matrices  $M_{0,0}$ ,  $M_{0,1}$ ,  $M_{1,0}$  et  $M_{1,1}$  ?

Correction ▼

[005680]

**Exercice 31** \*\*\*\*

Trouver  $A$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que la comatrice de  $A$  soit  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 2 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ .

Correction ▼

[005681]

**Exercice 32** \*\*

Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1} \\ a_1 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$  où  $a_1, \dots, a_n$  sont  $n$  nombres complexes ( $n \geq 2$ ).  $A$  est-elle diagonalisable ?

Correction ▼

[005682]

**Exercice 33** \*\*\*

Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  dont la matrice dans la base canonique est  $A$ . Trouver les sous espaces stables par  $f$  dans chacun des cas suivants :

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ -4 & -1 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$$

[Correction ▼](#)

[005683]

---

**Exercice 34 \*\*\***

Résoudre dans  $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$  l'équation  $X^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 2 & 6 & -14 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix}$ .

[Correction ▼](#)

[005684]

---

**Exercice 35**

Commutant de  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ .

[Correction ▼](#)

[005685]

---

**Exercice 36 \*\***

Soit  $f$  un endomorphisme d'un espace vectoriel  $E$  de dimension finie non nulle et  $F$  un sous-espace non nul de  $E$  stable par  $f$ . On suppose que  $f$  est diagonalisable. Montrer que la restriction de  $f$  à  $F$  est un endomorphisme diagonalisable de  $F$ .

[Correction ▼](#)

[005686]

---

**Exercice 37 \*\*I**

Soit  $A$  une matrice carrée réelle de format  $n \geq 2$  vérifiant  $A^3 + A^2 + A = 0$ . Montrer que le rang de  $A$  est un entier pair.

[Correction ▼](#)

[005687]

## Correction de l'exercice 1 ▲

**1ère solution.**  $A = 2J - I_3$  où  $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . On a  $J^2 = 3J$  et plus généralement  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $J^k = 3^{k-1}J$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Puisque les matrices  $2J$  et  $-I$  commutent, la formule du binôme de NEWTON permet d'écrire

$$\begin{aligned} A^n &= (2J - I)^n = (-I)^n + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (2J)^k (-I)^{n-k} = (-1)^n I + \left( \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k 3^{k-1} (-1)^{n-k} \right) J \\ &= (-1)^n I + \frac{1}{3} \left( \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 6^k (-1)^{n-k} \right) J = (-1)^n I + \frac{1}{3} ((6-1)^n - (-1)^n) J \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^n + 2(-1)^n & 5^n - (-1)^n & 5^n - (-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 5^n + 2(-1)^n & 5^n - (-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 5^n - (-1)^n & 5^n + 2(-1)^n \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

ce qui reste vrai quand  $n = 0$ .

Soit de nouveau  $n \in \mathbb{N}^*$ .

$$\begin{aligned} ((-1)^n I + \frac{1}{3}(5^n - (-1)^n)J) \times ((-1)^{-n} I + \frac{1}{3}(5^{-n} - (-1)^{-n})J) \\ = I + \frac{1}{3}((-5)^n - 1 + (-5)^{-n} - 1)J + \frac{1}{9}(1 - (-5)^n - (-5)^{-n} + 1)J^2 \\ = I + \frac{1}{3}((-5)^n - 1 + (-5)^{-n} - 1)J + \frac{3}{9}(1 - (-5)^n - (-5)^{-n} + 1)J = I, \end{aligned}$$

et donc

$$A^{-n} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^{-n} + 2(-1)^{-n} & 5^{-n} - (-1)^{-n} & 5^{-n} - (-1)^{-n} \\ 5^{-n} - (-1)^{-n} & 5^{-n} + 2(-1)^{-n} & 5^{-n} - (-1)^{-n} \\ 5^{-n} - (-1)^{-n} & 5^{-n} - (-1)^{-n} & 5^{-n} + 2(-1)^{-n} \end{pmatrix}.$$

Finalement

$$\forall n \in \mathbb{Z}, A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^n + 2(-1)^n & 5^n - (-1)^n & 5^n - (-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 5^n + 2(-1)^n & 5^n - (-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 5^n - (-1)^n & 5^n + 2(-1)^n \end{pmatrix}.$$

**2ème solution.** Puisque  $\text{rg}(A+I) = 1$ ,  $\dim(\text{Ker}(A+I)) = 2$  et  $-1$  est valeur propre de  $A$  d'ordre au moins 2. La troisième valeur propre  $\lambda$  est fournie par la trace :  $\lambda - 1 - 1 = 3$  et donc  $\lambda = 5$ . Par suite,  $\chi_A = -(X+1)^2(X-5)$ .

De plus,  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{-1} \Leftrightarrow x+y+z=0$  et donc  $E_{-1} = \text{Vect}(e_1, e_2)$  où  $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

De même,  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_5 \Leftrightarrow x=y=z$  et  $E_5 = \text{Vect}(e_3)$  où  $e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

On pose  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $D = \text{diag}(-1, -1, 5)$  et on a  $A = PDP^{-1}$ .

Calcul de  $P^{-1}$ . Soit  $(i, j, k)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ .

$$\begin{cases} e_1 = i - j \\ e_2 = i - k \\ e_3 = i + j + k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} j = i - e_1 \\ k = i - e_2 \\ e_3 = i + i - e_1 + i - e_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} i = \frac{1}{3}(e_1 + e_2 + e_3) \\ j = \frac{1}{3}(-2e_1 + e_2 + e_3) \\ k = \frac{1}{3}(e_1 - 2e_2 + e_3) \end{cases}$$

et donc  $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Soit alors  $n \in \mathbb{Z}$ .

$$\begin{aligned} A^n &= PD^nP^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 5^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-1)^n & (-1)^n & 5^n \\ -(-1)^n & 0 & 5^n \\ 0 & -(-1)^n & 5^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^n + 2(-1)^n & 5^n - (-1)^n & 5^n - (-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 5^n + 2(-1)^n & 5^n - (-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 5^n - (-1)^n & 5^n + 2(-1)^n \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

et on retrouve le résultat obtenu plus haut, le calcul ayant été mené directement avec  $n$  entier relatif.

**3ème solution.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . La division euclidienne de  $X^n$  par  $\chi_A$  fournit trois réels  $a_n, b_n$  et  $c_n$  et un polynôme  $Q$  tels que  $X^n = \chi_A Q + a_n X^2 + b_n X + c_n$ . En prenant les valeurs des membres en 5, puis la valeur des deux membres ainsi que de leurs dérivées en  $-1$ , on obtient

$$\begin{cases} 25a_n + 5b_n + c_n = 5^n \\ a_n - b_n + c_n = (-1)^n \\ -2a_n + b_n = n(-1)^{n-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_n = 2a_n - n(-1)^n \\ 35a_n + c_n = 5n(-1)^n + 5^n \\ -a_n + c_n = -(n-1)(-1)^n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_n = \frac{1}{36}(5^n + (6n-1)(-1)^n) \\ c_n = \frac{1}{36}(5^n + (-30n+35)(-1)^n) \\ b_n = \frac{1}{36}(2 \times 5^n + (-24n-2)(-1)^n) \end{cases}.$$

Le théorème de CAYLEY-HAMILTON fournit alors

$$\begin{aligned} A^n &= \frac{1}{36} ((5^n + (6n-1)(-1)^n)A^2 + 2(5^n - (12n+1)(-1)^n)A + (5^n + (-30n+35)(-1)^n)I) \\ &= \frac{1}{36} \left( (5^n + (6n-1)(-1)^n) \begin{pmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{pmatrix} + 2(5^n - (12n+1)(-1)^n) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right. \\ &\quad \left. + (5^n + (-30n+35)(-1)^n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{36} \begin{pmatrix} 12 \times 5^n + 24(-1)^n & 12 \times 5^n - 12(-1)^n & 12 \times 5^n - 12(-1)^n \\ 12 \times 5^n - 12(-1)^n & 12 \times 5^n + 24(-1)^n & 12 \times 5^n - 12(-1)^n \\ 12 \times 5^n - 12(-1)^n & 12 \times 5^n - 12(-1)^n & 12 \times 5^n + 24(-1)^n \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^n + 2(-1)^n & 5^n - (-1)^n & 5^n - (-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 5^n + 2(-1)^n & 5^n - (-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 5^n - (-1)^n & 5^n + 2(-1)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On retrouve encore une fois le même résultat mais pour  $n \in \mathbb{N}^*$  uniquement.

### Correction de l'exercice 2 ▲

Soit  $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ . Si  $X^2 = A$  alors  $AX = X^3 = XA$  et donc  $X$  et  $A$  commutent.

$A$  admet trois valeurs propres réelles et simples à savoir 1, 3 et 4. Donc  $A$  est diagonalisable dans  $\mathbb{R}$  et les sous espaces propres de  $A$  sont des droites.  $X$  commute avec  $A$  et donc laisse stable les trois droites propres de  $A$ .

Ainsi une base de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$  formée de vecteurs propres de  $A$  est également une base de vecteurs propres de  $X$  ou encore, si  $P$  est une matrice réelle inversible telle que  $P^{-1}AP$  soit une matrice diagonale  $D_0$  alors pour la même matrice  $P$ ,  $P^{-1}XP$  est une matrice diagonale  $D$ . De plus

$$X^2 = A \Leftrightarrow PD^2P^{-1} = PD_0P^{-1} \Leftrightarrow D^2 = D_0 \Leftrightarrow D = \text{diag}(\pm\sqrt{3}, \pm 2, \pm 1)$$

ce qui fournit huit solutions deux à opposées. On peut prendre  $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -16 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  puis  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ -5/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

D'où les solutions



$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -16 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3}\varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & 2\varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ -5/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3}\varepsilon_1 & 0 & 0 \\ -16\sqrt{3}\varepsilon_1 & 2\varepsilon_2 & 0 \\ 5\sqrt{3}\varepsilon_1 & 0 & \varepsilon_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ -5/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} \sqrt{3}\varepsilon_1 & 0 & 0 \\ -8\sqrt{3}\varepsilon_1 + 16\varepsilon_2 & 2\varepsilon_2 & 0 \\ 5(\sqrt{3}\varepsilon_1 - \varepsilon_3)/2 & 0 & \varepsilon_3 \end{pmatrix}.$$

où  $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \in \{-1, 1\}^3$ .

### Correction de l'exercice 3 ▲

1.  $\chi_A = -(2+X)((3-X)(-1-X)+4) = -(X+2)(X^2-2X+1) = -(X+2)(X-1)^2$ .

$A$  diagonalisable  $\Rightarrow \dim(\text{Ker}(A-I)) = 2 \Rightarrow \text{rg}(A-I) = 1$  ce qui n'est pas. Donc  $A$  n'est pas diagonalisable.

De plus,  $E_{-2} = \text{Vect}(e_1)$  où  $e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $E_1 = \text{Vect}(e_2)$  où  $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$ .

2.  $(A-I)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 4 & 8 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 4 & 8 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -36 & -36 & 9 \end{pmatrix}$  et donc  $\text{Ker}(A-I)^2$  est le plan d'équation  $4x + 4y - z = 0$ .

3. On note  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  dont la matrice dans la base canonique de  $\mathbb{R}^3$  est  $A$ . Le théorème de CAYLEY-HAMILTON et le théorème de décomposition des noyaux permettent d'affirmer

$$\mathcal{M}_3(\mathbb{R}) = \text{Ker}(A+2I) \oplus \text{Ker}(A-I)^2.$$

De plus, chacun des sous-espaces  $\text{Ker}(A+2I)$  et  $\text{Ker}(A-I)^2$  étant stables par  $f$ , la matrice de  $f$  dans toute base adaptée à cette décomposition est diagonale par blocs. Enfin,  $\text{Ker}(A-I)$  est une droite vectorielle contenue dans le plan  $\text{Ker}(A-I)^2$  et en choisissant une base de  $\text{Ker}(A-I)^2$  dont l'un des deux vecteurs est dans  $\text{Ker}(A-I)$ , la matrice de  $f$  aura la forme voulue.

On a déjà choisi  $e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$  puis on prend  $e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . On note  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ .

$P$  est inversible d'inverse  $P^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ . On peut déjà affirmer que  $P^{-1}AP$  est de la forme

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \times \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Plus précisément}$$

$$Ae_3 - e_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} = e_2$$

et donc  $Ae_3 = e_2 + e_3$  puis

$$A = PTP^{-1} \text{ où } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & -4 & 0 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Posons  $T = D + N$  où  $D = \text{diag}(-2, 1, 1)$  et  $N = E_{2,3}$ . On a  $ND = DN$  et  $N^2 = 0$ . Puisque les matrices  $D$  et  $N$  commutent, la formule du binôme de NEWTON permet d'écrire

$$\begin{aligned}
T^n &= D^n + nD^{n-1}N = \text{diag}((-2)^n, 1, 1) + n\text{diag}((-2)^{n-1}, 1, 1)E_{2,3} = \text{diag}((-2)^n, 1, 1) + nE_{2,3} \\
&= \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 & 0 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Puis

$$\begin{aligned}
A^n &= PT^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & -4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 & 0 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -4 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 & n+1 \\ 0 & -2 & -2n-1 \\ (-2)^n & -4 & -4n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -4 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2n+1 & n & 0 \\ -4n & -2n+1 & 0 \\ -4(-2)^n-8n+4 & -4(-2)^n-4n+4 & (-2)^n \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, A^n = \begin{pmatrix} 2n+1 & n & 0 \\ -4n & -2n+1 & 0 \\ -4(-2)^n-8n+4 & -4(-2)^n-4n+4 & (-2)^n \end{pmatrix}.$$

#### Correction de l'exercice 4 ▲

Soit  $P$  un élément de  $\mathbb{R}_{2n}[X]$ .  $f(P)$  est un polynôme de degré inférieur ou égal à  $2n+1$  et de plus, si  $a$  est le coefficient de  $X^{2n}$  dans  $P$ , le coefficient de  $X^{2n+1}$  dans  $f(P)$  est  $2na - 2na = 0$ . Donc  $f(P)$  est un élément de  $\mathbb{R}_{2n}[X]$ . La linéarité de  $f$  étant claire,  $f$  est bien un endomorphisme de  $\mathbb{R}_{2n}[X]$ .

Cherchons maintenant  $P$  polynôme non nul et  $\lambda$  réel tels que  $f(P) = \lambda P$  ce qui équivaut à

$$\frac{P'}{P} = \frac{2nX+\lambda}{X^2-1} = \frac{1}{2} \left( \frac{2n+\lambda}{X-1} - \frac{-2n+\lambda}{X+1} \right).$$

En identifiant à la décomposition en éléments simples classique de  $\frac{P'}{P}$  (à savoir si  $P = K(X-z_1)^{\alpha_1} \dots (X-z_k)^{\alpha_k}$  avec  $K \neq 0$  et les  $z_i$  deux à deux distincts, alors  $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^k \frac{\alpha_i}{X-z_i}$ ), on voit que nécessairement  $P$  ne peut admettre pour racines dans  $\mathbb{C}$  que  $-1$  et  $1$  et d'autre part que  $P$  est de degré  $\frac{1}{2}(2n+\lambda+2n-\lambda) = 2n$ .  $P$  est donc nécessairement de la forme

$$P = aP_k \text{ avec } a \in \mathbb{R}^* \text{ et } P_k = (X-1)^k(X+1)^{2n-k} \text{ avec } k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket.$$

Réciproquement, chaque  $P_k$  est non nul et vérifie

$$\frac{P'_k}{P_k} = \frac{k}{X-1} + \frac{2n-k}{X+1} = \frac{1}{2} \left( \frac{2n+(2k-2n)}{X-1} + \frac{2n-(2k-2n)}{X+1} \right).$$

Donc, pour chaque  $k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket$ ,  $P_k$  est vecteur propre de  $f$  associé à la valeur propre  $\lambda_k = 2(k-n)$ .

Ainsi,  $f$  admet  $2n+1$  valeurs propres, nécessairement simples car  $\dim(\mathbb{R}_{2n}[X]) = 2n+1$ .  $f$  est donc diagonalisable et les sous espaces propres de  $f$  sont les droites  $\text{Vect}(P_k)$ ,  $0 \leq k \leq 2n$ .

#### Correction de l'exercice 5 ▲

Soit  $P = aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbb{R}_3[X]$

$$\begin{aligned}
AP - (X^4 - X)P &= (X-1)P = aX^4 + (b-a)X^3 + (c-b)X^2 + (d-c)X - d = \\
&= a(X^4 - X) + (b-a)X^3 + (c-b)X^2 + (a+d-c)X - d.
\end{aligned}$$

et donc  $AP = (X^4 - X)(P+a) + (b-a)X^3 + (c-b)X^2 + (a+d-c)X - d$  et donc  $f(P) = (b-a)X^3 + (c-b)X^2 + (a+d-c)X - d$ . Par suite,  $f$  est un endomorphisme de  $E$  et la matrice de  $f$  dans la base canonique  $(1, X, X^2, X^3)$  de  $E$  est

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

puis

$$\begin{aligned} \chi_A &= \begin{vmatrix} -1-X & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1-X & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1-X & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1-X \end{vmatrix} = (-1-X) \begin{vmatrix} -1-X & 0 & 1 \\ 1 & -1-X & 0 \\ 0 & 1 & -1-X \end{vmatrix} \\ &= -(X+1)(-(X+1)^3+1) = X(X+1)(X^2+3X+3). \end{aligned}$$

$A$  admet quatre valeurs propres simples dans  $\mathbb{C}$ , deux réelles 0 et -1 et deux non réelles  $-1+j$  et  $-1+j^2$ .  $\chi_f$  n'est pas scindé sur  $\mathbb{R}$  et donc  $f$  n'est pas diagonalisable.

- Soit  $P \in E$ .  $P \in \text{Ker } f \Leftrightarrow b-a=c-b=a+d-c=-d=0 \Leftrightarrow a=b=c$  et  $d=0$ .  $\text{Ker } f = \text{Vect}(X^3+X^2+X)$ .
- Soit  $P \in E$ .  $P \in \text{Ker}(f+Id) \Leftrightarrow b=c=a+d=0 \Leftrightarrow b=c=0$  et  $d=-a$ .  $\text{Ker}(f+Id) = \text{Vect}(X^3-1)$ .
- $\text{rg}(f) = 3$  et immédiatement  $\text{Im } f = \text{Vect}(X-1, X^2-X, X^3-X^2)$ .

Si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , on peut continuer :

$$P \in \text{Ker}(f + (1-j)Id) \Leftrightarrow b - ja = c - jb = a + d - jc = -jd = 0 \Leftrightarrow b = ja, c = j^2a \text{ et } d = 0.$$

Donc  $\text{Ker}(f + (1-j)Id) = \text{Vect}(X^3 + jX^2 + j^2X)$  et en conjuguant  $\text{Ker}(f + (1-j^2)Id) = \text{Vect}(X^3 + j^2X^2 + jX)$ .

**Remarque.**  $B = X(X-1)(X-j)(X-j^2)$  et on a trouvé pour base de vecteurs propres les quatre polynômes de LAGRANGE  $X^3-1 = (X-1)(X-j)(X-j^2)$  puis  $X^3+X^2+X = X(X-j)(X-j^2)$  puis  $X^3+jX^2+j^2X = X(X-1)(X-j^2)$  et enfin  $X^3+j^2X^2+jX = X(X-1)(X-j)$ . C'est une généralité. On peut montrer que si  $E = \mathbb{C}_n[X]$  et si  $B$  a  $n+1$  racines deux à deux distinctes dans  $\mathbb{C}$  alors  $f$  est diagonalisable et une base de vecteurs propres est fournie par les polynômes de LAGRANGE associés aux racines de  $B$  et ceci pour un polynôme  $A$  quelconque.

### Correction de l'exercice 6 ▲

Si  $p = q$ , le résultat est connu :  $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ .

Supposons par exemple  $p < q$ . On se ramène au cas de matrices carrées en complétant. Soient  $A' = \begin{pmatrix} A & \\ & 0_{q-p,q} \end{pmatrix}$  et  $B' = \begin{pmatrix} B & \\ & 0_{q,q-p} \end{pmatrix}$ .  $A'$  et  $B'$  sont des matrices carrées de format  $q$  et  $A'B'$  et  $B'A'$  ont même polynôme caractéristique.

Un calcul par blocs donne  $B'A' = BA$  et  $A'B' = \begin{pmatrix} A & \\ & 0_{q-p,q} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & \\ & 0_{q,q-p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AB & 0_{p,q-p} \\ 0_{q-p,p} & 0_{q-p,q-p} \end{pmatrix}$ . Donc  $\chi_{BA} = (-X)^{q-p} \chi_{AB}$  ou encore, avec une écriture plus symétrique,  $(-X)^p \chi_{BA} = (-X)^q \chi_{AB}$  ce qui est vrai dans tous les cas.

$$\forall A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K}), (-X)^p \chi_{BA} = (-X)^q \chi_{AB}.$$

### Correction de l'exercice 7 ▲

Si  $u$  est inversible,

$$\det(u+v) = \det u \Leftrightarrow \det u \times \det(Id + u^{-1}v) = \det u \Leftrightarrow \det(Id + u^{-1}v) = 1.$$

$u$  et  $v$  commutent et donc  $u^{-1}$  et  $v$  également car  $uv = vu \Rightarrow u^{-1}uvu^{-1} = u^{-1}vu^{-1} \Rightarrow vu^{-1} = u^{-1}v$ . Mais alors, puisque  $v$  est nilpotent, l'endomorphisme  $w = u^{-1}v$  l'est également car  $(u^{-1}v)^p = u^{-p}v^p$ .

Il reste donc à calculer  $\det(Id + w)$  où  $w$  est un endomorphisme nilpotent. On remarque que  $\det(Id + w) = \chi_w(-1)$ . Il est connu que 0 est l'unique valeur propre d'un endomorphisme nilpotent et donc  $\chi_w = (-X)^n$  puis

$$\det(Id + w) = \chi_w(-1) = (-(-1))^n = 1.$$

Le résultat est donc démontré dans le cas où  $u$  est inversible. Si  $u$  n'est pas inversible,  $u + xId$  est inversible sauf pour un nombre fini de valeurs de  $x$  et commute toujours avec  $v$ . Donc, pour tout  $x$  sauf peut-être pour un nombre fini,  $\det(u + xId + v) = \det(u + xId)$ . Ces deux polynômes coïncident en une infinité de valeurs de  $x$  et sont donc égaux. Ils prennent en particulier la même valeur en 0 ce qui refournit  $\det(u + v) = \det u$ .

### Correction de l'exercice 8 ▲

• Si  $A$  est nilpotente, pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $A^k$  est nilpotente et donc 0 est l'unique valeur propre dans  $\mathbb{C}$  de  $A^k$ . Par suite,  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\text{Tr}(A^k) = 0$ .

• Réciproquement, supposons que  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\text{Tr}(A^k) = 0$  et montrons alors que toutes les valeurs propres de  $A$  dans  $\mathbb{C}$  sont nulles. Ceci montrera que le polynôme caractéristique de  $A$  est  $(-X)^n$  et donc que  $A$  est nilpotente d'après le théorème de CAYLEY-HAMILTON.

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  les  $n$  valeurs propres (distinctes ou confondues) de  $A$  dans  $\mathbb{C}$ . Pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on pose  $S_k = \lambda_1^k + \dots + \lambda_n^k$ . Il s'agit de montrer que :  $(\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, S_k = 0) \Rightarrow (\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_j = 0)$ .

**1ère solution.** Les  $S_k$ ,  $1 \leq k \leq n$ , sont tous nuls et par combinaisons linéaires de ces égalités, on en déduit que pour tout polynôme  $P$  de degré inférieur ou égal à  $n$  et s'annulant en 0, on a  $P(\lambda_k) = 0$  (1). Il s'agit alors de bien choisir le polynôme  $P$ .

Soit  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . Soient  $\mu_1, \dots, \mu_p$  les valeurs propres deux à deux distinctes de  $A$  ( $1 \leq p \leq n$ ). On prend  $P = X \prod_{j \neq i} (X - \mu_j)$  si  $p \geq 2$  et  $P = X$  si  $p = 1$ .  $P$  est bien un polynôme de degré inférieur ou égal à  $n$  et s'annule en 0. L'égalité  $P(\lambda_i) = 0$  fournit  $\lambda_i = 0$  ce qu'il fallait démontrer.

**2ème solution.** Pour ceux qui savent que les sommes de NEWTON  $S_k$  sont liées aux fonctions élémentaires en les  $\lambda_i$   $\sigma_1, \dots, \sigma_n$  par les formules de NEWTON :

$$\forall k \leq n, S_k - \sigma_1 S_{k-1} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} S_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0.$$

Par suite, si tous les  $S_k$ ,  $1 \leq k \leq n$ , sont nuls alors immédiatement tous les  $\sigma_k$ ,  $1 \leq k \leq n$ , sont nuls et donc les  $\lambda_i$  sont nuls car tous racines de l'équation  $x^n = 0$ .

### Correction de l'exercice 9 ▲

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ .

$$\begin{aligned} f^k g - g f^k &= f^k g - f^{k-1} g f + f^{k-1} g f - f^{k-2} g f^2 + f^{k-2} g f^2 - \dots - f g f^{k-1} + f g f^{k-1} - g f^k \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} (f^{k-i} g f^i - f^{k-i-1} g f^{i+1}) = \sum_{i=0}^{k-1} f^{k-i-1} (f g - g f) f^i = \sum_{i=0}^{k-1} f^{k-i-1} f f^i \\ &= k f^k. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\text{si } f g - g f = f, \text{ alors } \forall k \in \mathbb{N}, f^k g - g f^k = k f^k \quad (*).$$

**1ère solution.** Soit  $\varphi : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$ .  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathcal{L}(E)$  et  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\varphi(f^k) = k f^k$ .  

$$h \mapsto h g - g h$$

Si, pour  $k \in \mathbb{N}^*$  donné,  $f^k$  n'est pas nul,  $f^k$  est valeur propre de  $\varphi$  associée à la valeur propre  $k$ . Par suite, si aucun des  $f^k$  n'est nul,  $\varphi$  admet une infinité de valeurs propres deux à deux distinctes. Ceci est impossible car  $\dim(\mathcal{L}(E)) < +\infty$ . Donc,  $f$  est nilpotent.

**2ème solution.** Les égalités (\*) peuvent s'écrire  $P(f)g - gP(f) = fP'(f)$ , (\*\*), quand  $P$  est un polynôme de la forme  $X^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ . Par linéarité, les égalités (\*\*) sont vraies pour tout polynôme  $P$ .

En particulier, l'égalité (\*\*) est vraie quand  $P$  est  $Q_f$  le polynôme minimal de  $f$  et donc

$$f Q'_f(f) = Q_f(f)g - g Q_f(f) = 0.$$

Le polynôme  $XQ'_f$  est donc un polynôme annulateur de  $f$  et on en déduit que le polynôme  $Q_f$  divise le polynôme  $XQ'_f$ . Plus précisément, si  $p \in \mathbb{N}^*$  est le degré de  $Q_f$ , les polynômes  $pQ_f$  ayant mêmes degrés et mêmes coefficients dominants, on en déduit que  $pQ_f = XQ'_f$  ou encore que

$$\frac{Q'_f}{Q_f} = \frac{p}{X}.$$

Par identification à la décomposition en éléments simples usuelles de  $\frac{Q'_f}{Q_f}$ , on en déduit que  $Q_f = X^p$ . En particulier,  $f^p = 0$  et encore une fois  $f$  est nilpotent.

---

### Correction de l'exercice 10 ▲

**1er cas.** Supposons  $\alpha = \beta = 0$  et donc  $uv = vu$ . Puisque  $E$  est un  $\mathbb{C}$ -espace de dimension finie non nulle,  $u$  admet au moins une valeur propre que l'on note  $\lambda$ . Le sous-espace propre  $E_\lambda$  correspondant n'est pas réduit à  $\{0\}$ , est stable par  $u$  et d'autre part stable par  $v$  car  $u$  et  $v$  commutent. On note  $u'$  et  $v'$  les restrictions de  $u$  et  $v$  au sous-espace  $E_\lambda$ .  $u'$  et  $v'$  sont des endomorphismes de  $E_\lambda$ . De nouveau,  $E_\lambda$  est un  $\mathbb{C}$ -espace de dimension finie non nulle et donc  $v'$  admet au moins un vecteur propre  $x_0$ . Par construction,  $x_0$  est un vecteur propre commun à  $u$  et  $v$ .

**2ème cas.** Supposons par exemple  $\alpha \neq 0$ .

$$\begin{aligned} uv - vu = \alpha u + \mu v &\Leftrightarrow (\alpha u + \beta v) \circ \frac{1}{\alpha} v - \frac{1}{\alpha} v \circ (\alpha u + \beta v) = \alpha u + \beta v \\ &\Leftrightarrow fg - gf = f \text{ en posant } f = \alpha u + \beta v \text{ et } g = \frac{1}{\alpha} v. \end{aligned}$$

On va chercher un vecteur propre commun à  $u$  et  $v$  dans le noyau de  $f$ . Montrons tout d'abord que  $\text{Ker} f$  n'est pas nul (on sait montrer que  $f$  est en fait nilpotent (exercice 9) mais on peut montrer directement une propriété un peu moins forte).

Si  $f$  est inversible, l'égalité  $fg - gf = f$  fournit  $(g + Id) \circ f = f \circ g$  et donc  $g + Id = f \circ g \circ f^{-1}$ . Par suite,  $g$  et  $g + Id$  ont même polynôme caractéristique ou encore, si  $\lambda$  est valeur propre de  $g$  alors  $\lambda + 1$  est encore valeur propre de  $g$ . Mais alors  $\lambda + 2, \lambda + 3, \dots$  sont aussi valeurs propres de  $g$  et  $g$  a une infinité de valeurs propres deux à deux distinctes. Ceci est exclu et donc  $\text{Ker} f$  n'est pas réduit à  $\{0\}$ .

Maintenant, si  $x$  est un vecteur de  $\text{Ker} f$ , on a  $f(g(x)) = g(f(x)) + f(x) = 0$  et  $g(x)$  est dans  $\text{Ker} f$ . Donc  $g$  laisse  $\text{Ker} f$  stable et sa restriction à  $\text{Ker} f$  est un endomorphisme de  $\text{Ker} f$  qui admet au moins une valeur propre et donc au moins un vecteur propre. Ce vecteur est bien un vecteur propre commun à  $f$  et  $g$ .

Enfin si  $x$  est vecteur propre commun à  $f$  et  $g$  alors  $x$  est vecteur propre de  $v = \frac{1}{\alpha} g$  et de  $u = \frac{1}{\alpha} (f - \beta v)$ .  $x$  est un vecteur propre commun à  $u$  et  $v$ .

---

### Correction de l'exercice 11 ▲

- $E$  contient  $I_2$  et est inclus dans  $GL_2(\mathbb{R})$ .
  - Si  $A$  et  $B$  sont dans  $E$  alors  $AB$  est à coefficients entiers et  $\det(AB) = \det A \det B = 1$ . Donc  $AB$  est dans  $E$ .
  - Si  $A$  est dans  $E$ ,  $\det(A^{-1}) = 1$  et en particulier  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{com}(A)$  est à coefficients entiers. On en déduit que  $A^{-1}$  est dans  $E$ .

Finalement

$E$  est un sous-groupe de  $GL_2(\mathbb{R})$ .

- Soit  $A$  un élément de  $E$  tel qu'il existe un entier naturel non nul  $p$  tel que  $A^p = I_2$ .  
 $A$  est diagonalisable dans  $\mathbb{C}$  car annule le polynôme à racines simples  $X^p - 1$ .  
 $A$  admet deux valeurs propres distinctes ou confondues qui sont des racines  $p$ -èmes de 1 dans  $\mathbb{C}$  et puisque  $A$  est réelle, on obtient les cas suivants :
 

**1er cas.** Si  $\text{Sp} A = (1, 1)$ , puisque  $A$  est diagonalisable,  $A$  est semblable à  $I_2$  et par suite  $A = I_2$ . Dans ce cas,  $A^{12} = I_2$ .

**2ème cas.** Si  $\text{Sp}A = (-1, -1)$ ,  $A = -I_2$  et  $A^{12} = I_2$ .

**3ème cas.** Si  $\text{Sp}A = (1, -1)$  alors  $A$  est semblable à  $\text{diag}(1, -1)$  et donc  $A^2 = I_2$  puis encore une fois  $A^{12} = I_2$ .

**4ème cas.** Si  $\text{Sp}A = (e^{i\theta}, e^{-i\theta})$ . Dans ce cas  $\text{Tr}A = 2\cos\theta$  est un entier ce qui impose  $2\cos\theta \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ . Les cas  $\cos\theta = 1$  et  $\cos\theta = -1$  ont déjà été étudiés.

• Si  $\cos\theta = 0$ ,  $\text{Sp}A = (i, -i)$  et  $A$  est semblable à  $\text{diag}(i, -i)$ . Donc  $A^4 = I_2$  puis  $A^{12} = I_2$ .

• Si  $\cos\theta = \pm\frac{1}{2}$ ,  $\text{Sp}A = (j, j^2)$  ou  $\text{Sp}A = (-j, -j^2)$ . Dans le premier cas,  $A^3 = I_2$  et dans le deuxième  $A^6 = I_2$ .

Dans tous les cas  $A^{12} = I_2$ .

### Correction de l'exercice 12 ▲

On montre le résultat par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}^*$  le format de  $A$ .

• C'est clair pour  $n = 1$ .

• Soit  $n \geq 1$ . Supposons que toute matrice de format  $n$  et de trace nulle soit semblable à une matrice de diagonale nulle.

Soient  $A$  une matrice carrée de format  $n+1$  et de trace nulle puis  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{K}^{n+1}$  de matrice  $A$  dans la base canonique  $(e_1, \dots, e_{n+1})$  de  $\mathbb{K}^{n+1}$ .

Si  $f$  est une homothétie de rapport noté  $k$ , alors  $0 = \text{Tr}(f) = k(n+1)$  et donc  $k = 0$  puis  $f = 0$  puis  $A = 0$ . Dans ce cas,  $A$  est effectivement semblable à une matrice de diagonale nulle.

Sinon  $f$  n'est pas une homothétie et on sait qu'il existe un vecteur  $u$  de  $E$  tel que la famille  $(u, f(u))$  soit libre (voir exercice ??). On complète la famille libre  $(u, f(u))$  en une base de  $E$ . Le coefficient ligne 1, colonne 1, de la matrice de  $f$  dans cette base est nul. Plus précisément,  $A$  est semblable à une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & \times & \dots & \dots & \times \\ 1 & & & & \\ 0 & & & & \\ \vdots & & A' & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \end{pmatrix}.$$

Puis  $\text{Tr}A' = \text{Tr}A = 0$  et par hypothèse de récurrence,  $A'$  est semblable à une matrice  $A_1$  de diagonale nulle ou encore il existe  $A_1$  matrice carrée de format  $n$  et de diagonale nulle et  $Q \in GL_n(\mathbb{K})$  telle que  $Q^{-1}A'Q = A_1$ .

Mais alors, si on pose  $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & Q & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ ,  $P$  est inversible car  $\det(P) = 1 \times \det(Q) \neq 0$  et un calcul

par blocs montre que  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & Q^{-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$  puis que  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & \times & \dots & \dots & \times \\ \times & & & & \\ \vdots & & & & \\ & & A_1 & & \\ \vdots & & & & \\ \times & & & & \end{pmatrix}$  est de

diagonale nulle.

### Correction de l'exercice 13 ▲

$\det M = \det \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -3A & 4A \\ 0 & A \end{pmatrix}$  ( $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, L_k \leftarrow L_k - L_{n+k}$ ) et donc  $\det M = \det(A)\det(-3A) = (-3)^n(\det A)^2$ .

$$\det M = (-3)^n(\det A)^2.$$

L'idée de l'étude de  $M$  qui suit vient de l'étude de la matrice de format 2,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

Une diagonalisation rapide amène à  $B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \times \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ . Soit alors  $P$  la matrice de format  $2n$  définie par blocs par  $P = \begin{pmatrix} -2I_n & 2I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}$ . Un calcul par blocs montre que  $P$  est inversible et que

$$P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -I_n & 2I_n \\ I_n & 2I_n \end{pmatrix} \text{ puis que}$$

$$P^{-1}MP = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -I_n & 2I_n \\ I_n & 2I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2I_n & 2I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} A & -2A \\ 3A & 6A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2I_n & 2I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}.$$

On pose  $N = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}$ . Puisque les matrices  $M$  et  $N$  sont semblables,  $M$  et  $N$  ont même polynôme caractéristique et de plus  $M$  est diagonalisable si et seulement si  $N$  l'est.

Cherchons les vecteurs propres  $Z$  de  $N$  sous la forme  $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$  où  $X$  et  $Y$  sont des vecteurs colonnes de format  $n$ . Sois  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

$$NZ = \lambda Z \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \Leftrightarrow -AX = \lambda X \text{ et } 3AY = \lambda Y.$$

Par suite

$$Z \text{ est vecteur propre de } N \text{ associé à } \lambda \Leftrightarrow (X \neq 0 \text{ ou } Y \neq 0) \text{ et } (X \in \text{Ker}(A + \lambda I) \text{ et } Y \in \text{Ker}\left(A - \frac{\lambda}{3}I\right)).$$

Une discussion suivant  $\lambda$  s'en suit :

**1er cas.** Si  $-\lambda$  et  $\frac{\lambda}{3}$  ne sont pas valeurs propres de  $A$  alors  $\lambda$  n'est pas valeur propre de  $M$ .

**2ème cas.** Si  $-\lambda$  est dans  $\text{Sp}A$  et  $\frac{\lambda}{3}$  n'y est pas, alors  $\lambda$  est valeur propre de  $M$ . Le sous-espace propre associé est l'ensemble des  $P \begin{pmatrix} X \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2X \\ X \end{pmatrix}$  où  $X$  décrit  $\text{Ker}(A + \lambda I)$ . La dimension de  $E_\lambda$  est alors  $\dim(\text{Ker}(A + \lambda I))$ .

**3ème cas.** Si  $-\lambda$  n'est pas dans  $\text{Sp}A$  et  $\frac{\lambda}{3}$  y est, alors  $\lambda$  est valeur propre de  $M$ . Le sous-espace propre associé est l'ensemble des  $P \begin{pmatrix} 0 \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2Y \\ Y \end{pmatrix}$  où  $Y$  décrit  $\text{Ker}\left(A - \frac{\lambda}{3}I\right)$ . La dimension de  $E_\lambda$  est alors  $\dim\left(\text{Ker}\left(A - \frac{\lambda}{3}I\right)\right)$ .

**4ème cas.** Si  $-\lambda$  est dans  $\text{Sp}A$  et  $\frac{\lambda}{3}$  aussi, alors  $\lambda$  est valeur propre de  $M$ . Le sous-espace propre associé est l'ensemble des  $P \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2X + 2Y \\ X + Y \end{pmatrix}$  où  $X$  décrit  $\text{Ker}(A + \lambda I)$  et  $Y$  décrit  $\text{Ker}\left(A - \frac{\lambda}{3}I\right)$ . La dimension de  $E_\lambda$  est alors  $\dim(\text{Ker}(A + \lambda I)) + \dim\left(\text{Ker}\left(A - \frac{\lambda}{3}I\right)\right)$ .

Dans tous les cas,  $\dim(E_\lambda(M)) = \dim(E_{-\lambda}(A)) + \dim(E_{\lambda/3}(A))$  (et en particulier  $\dim(\text{Ker}M) = 2\dim(\text{Ker}A)$ ). Comme les applications  $\lambda \mapsto -\lambda$  et  $\lambda \mapsto \frac{\lambda}{3}$  sont des bijections de  $\mathbb{C}$  sur lui-même,

$$\begin{aligned} A \text{ est diagonalisable} &\Leftrightarrow \sum_{\lambda \in \mathbb{C}} \dim(E_\lambda(A)) = n \\ &\Leftrightarrow \sum_{\lambda \in \mathbb{C}} \dim(E_\lambda(A)) + \sum_{\lambda \in \mathbb{C}} \dim(E_\lambda(A)) = 2n \\ &\Leftrightarrow \sum_{\lambda \in \mathbb{C}} \dim(E_{-\lambda}(A)) + \sum_{\lambda \in \mathbb{C}} \dim(E_{\lambda/3}(A)) = 2n \\ &\Leftrightarrow M \text{ est diagonalisable.} \end{aligned}$$

---

### Correction de l'exercice 14 ▲

---

$$\chi_A = \begin{vmatrix} -X & b & \dots & b \\ a & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ a & \dots & a & -X \end{vmatrix}. \text{ Soit } f(x) = \begin{vmatrix} -X+x & b+x & \dots & b+x \\ a+x & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b+x \\ a+x & \dots & a+x & -X+x \end{vmatrix}.$$

$f$  est un polynôme en  $x$ . Par  $n$  linéarité du déterminant,  $f(x)$  est somme de  $2^n$  déterminants dont  $2^n - (n+1)$  sont nuls car contiennent deux colonnes de  $x$ . Les déterminants restant contiennent au plus une colonne de  $x$  et sont donc de degré inférieur ou égal à 1 en  $x$ .  $f$  est donc une fonction affine. Il existe donc deux nombres  $A$  et  $B$  tels que  $\forall x \in \mathbb{C}, f(x) = Ax + B$ . Les égalités  $f(-a) = (-X - a)^n$  et  $f(-b) = (-X - b)^n$  fournissent

$$\begin{cases} -aA + B = (-X - a)^n \\ -bA + B = (-X - b)^n \end{cases} \text{ et comme } a \neq b, \text{ les formules de CRAMER fournissent}$$

$$\chi_A = f(0) = B = \frac{1}{b-a}(b(-X - a)^n - a(-X - b)^n).$$

Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

$$\lambda \text{ valeur propre de } A \Rightarrow \text{ch}_A(\lambda) = 0 \Rightarrow \left(\frac{\lambda+a}{\lambda+b}\right)^n = \frac{a}{b} \Rightarrow \left|\frac{\lambda+a}{\lambda+b}\right| = \left|\frac{a}{b}\right|^{1/n}.$$

Soient  $M$  le point du plan d'affixe  $\lambda$ ,  $A$  le point du plan d'affixe  $-a$  et  $B$  le point du plan d'affixe  $-b$  puis  $k = \left|\frac{a}{b}\right|^{1/n}$ .  $k$  est un réel strictement positif et distinct de 1. On peut donc poser  $I = \text{bar}(A(1), B(-k))$  et  $J = \text{bar}(A(1), B(k))$ .

$$\begin{aligned} \lambda \text{ valeur propre de } A &\Rightarrow MA = kMB \Rightarrow MA^2 - k^2MB^2 = 0 \Rightarrow (\overrightarrow{MA} - k\overrightarrow{MB})(\overrightarrow{MA} + k\overrightarrow{MB}) = 0 \\ &\Rightarrow (1-k)\overrightarrow{MI} \cdot (1+k)\overrightarrow{MJ} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MJ} = 0 \\ &\Rightarrow M \text{ est sur le cercle de diamètre } [I, J] \text{ (cercles d'APOLLONIUS (de Perga)).} \end{aligned}$$


---

### Correction de l'exercice 15 ▲

---

1. Les hypothèses fournissent  $AU = U$  où  $U = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  et donc 1 est valeur propre de  $A$ .

2. (a) Soient  $\lambda$  une valeur propre de  $A$  et  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{C})$  un vecteur propre associé.

$$\begin{aligned} AX = \lambda X &\Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_{i,j}x_j = \lambda x_i \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |\lambda x_i| \leq \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| |x_j| \\ &\Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |\lambda x_i| \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_{i,j}|\right) \text{Max}\{|x_j|, 1 \leq j \leq n\} \\ &\Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |\lambda| |x_i| \leq \text{Max}\{|x_j|, 1 \leq j \leq n\}. \end{aligned}$$

On choisit alors pour  $i$  un indice  $i_0$  tel que  $|x_{i_0}| = \text{Max}\{|x_j|, 1 \leq j \leq n\}$ . Puisque  $X$  est non nul, on a  $|x_{i_0}| > 0$ . On obtient


$$|\lambda| |x_{i_0}| \leq |x_{i_0}| \text{ et donc } |\lambda| \leq 1 \text{ puisque } |x_{i_0}| > 0.$$

(b) Plus précisément,



$$|\lambda - a_{i_0, i_0}| |x_{i_0}| = \left| \sum_{j \neq i_0} a_{i_0, j} x_j \right| \leq \sum_{j \neq i_0} a_{i_0, j} |x_j| \leq \left( \sum_{j \neq i_0} a_{i_0, j} \right) |x_{i_0}| = (1 - a_{i_0, i_0}) |x_{i_0}|$$

et donc  $\forall \lambda \in \text{Sp}A$ ,  $|\lambda - a_{i_0, i_0}| \leq 1 - a_{i_0, i_0}$  ce qui signifie que les valeurs propres de  $A$  appartiennent au disque de centre  $a_{i_0, i_0}$  et de rayon  $1 - a_{i_0, i_0}$ . Ce disque est tangent intérieurement au cercle de centre  $(1, 0)$  et de rayon 1 en le point  $(1, 0)$ .



### Correction de l'exercice 16 ▲

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .  $A$  est antisymétrique si et seulement si  ${}^t A = -A$ . Dans ce cas

$$\chi_A = \det(A - XI) = \det({}^t(A - XI)) = \det(-A - XI) = (-1)^n \det(A + XI) = (-1)^n \chi_A(-X)$$

Ainsi,  $\chi_A$  a la parité de  $n$ .

### Correction de l'exercice 17 ▲

Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^n$  de matrice  $A$  dans la base canonique  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $\mathbb{R}^n$ .  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $f(e_i) = e_{n+1-i}$  et donc  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $f^2(e_i) = e_i$ . Donc  $f$  est une symétrie distincte de l'identité et en particulier  $\text{Sp}A = \{-1, 1\}$  et  $f$  est diagonalisable. On en déduit que  $A$  est diagonalisable dans  $\mathbb{R}$ .

### Correction de l'exercice 18 ▲

1.  $J^n = I$ .  $J$  annule le polynôme  $X^n - 1$  qui est à racines simples dans  $\mathbb{C}$  et donc  $J$  est diagonalisable dans  $\mathbb{C}$ .

Les valeurs propres de  $J$  sont à choisir parmi les racines  $n$ -èmes de 1 dans  $\mathbb{C}$ . On pose  $\omega = e^{2i\pi/n}$ . Vérifions que  $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ ,  $\omega^k$  est valeur propre de  $J$ .

Soient  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$  et  $X = (x_j)_{1 \leq j \leq n}$  un élément de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ .

$$JX = \omega^k X \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = \omega^k x_1 \\ x_3 = \omega^k x_2 \\ \vdots \\ x_n = \omega^k x_{n-1} \\ x_1 = \omega^k x_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = \omega^k x_1 \\ x_3 = (\omega^k)^2 x_1 \\ \vdots \\ x_n = (\omega^k)^{n-1} x_1 \\ x_1 = (\omega^k)^n x_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = \omega^k x_1 \\ x_3 = (\omega^k)^2 x_1 \\ \vdots \\ x_n = (\omega^k)^{n-1} x_1 \end{cases}$$

et donc

$$JX = \omega^k X \Leftrightarrow X \in \text{Vect}(U_k) \text{ où } U_k = \begin{pmatrix} 1 \\ \omega^k \\ (\omega^k)^2 \\ \vdots \\ (\omega^k)^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Donc  $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ ,  $\omega^k$  est valeur propre de  $J$ . Les valeurs propres de  $J$  sont les  $n$  racines  $n$ -èmes de 1. Ces valeurs propres sont toutes simples. Le sous espace propre associé à  $\omega^k$ ,  $0 \leq k \leq n-1$ , est la droite vectorielle  $D_k = \text{Vect}(U_k)$ .

Soit  $P$  la matrice de VANDERMONDE des racines  $n$ -èmes de l'unité c'est-à-dire  $P = (\omega^{(j-1)(k-1)})_{0 \leq j, k \leq n-1}$  puis  $D = \text{diag}(1, \omega, \dots, \omega^{n-1})$ , alors on a déjà vu que  $P^{-1} = \frac{1}{n} \bar{P}$  (exercice 16) et on a

$$J = PDP^{-1} \text{ avec } D = \text{diag}(\omega^j)_{1 \leq j \leq n}, P = (\omega^{(j-1)(k-1)})_{1 \leq j, k \leq n} \text{ et } P^{-1} = \frac{1}{n} \bar{P} \text{ avec } \omega = e^{2i\pi/n}.$$

**Remarque.** La seule connaissance de  $D$  suffit pour le 2).

2. Soit  $A$  la matrice de l'énoncé.

$$A = a_0 I + a_1 J + a_2 J^2 + \dots + a_{n-1} J^{n-1} = Q(J) \text{ où } Q = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1}.$$

D'après 1),  $A = P \times Q(D) \times P^{-1}$  et donc  $A$  est semblable à la matrice  $\text{diag}(Q(1), Q(\omega), \dots, Q(\omega^{n-1}))$ . Par suite,  $A$  a même déterminant que la matrice  $\text{diag}(Q(1), Q(\omega), \dots, Q(\omega^{n-1}))$ . D'où la valeur du déterminant circulant de l'énoncé :

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & & a_{n-2} \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_2 & & \ddots & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{k=0}^{n-1} \left( \sum_{j=0}^{n-1} e^{2i(j-1)(k-1)\pi/n} a_j \right).$$

### Correction de l'exercice 19 ▲

1. Soit  $\sigma \in S_n$ .

$$\det(P_\sigma) = \sum_{\sigma' \in S_n} \varepsilon(\sigma') p_{\sigma'(1),1} \dots p_{\sigma'(n),n} = \sum_{\sigma' \in S_n} \varepsilon(\sigma') \delta_{\sigma'(1),\sigma(1)} \dots \delta_{\sigma'(n),\sigma(n)} = \varepsilon(\sigma),$$

car  $\delta_{\sigma'(1),\sigma(1)} \dots \delta_{\sigma'(n),\sigma(n)} \neq 0 \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma'(i) = \sigma(i) \Leftrightarrow \sigma' = \sigma$ .

$$\forall \sigma \in S_n, \det(P_\sigma) = \varepsilon(\sigma).$$

2. (a) Soit  $(\sigma, \sigma') \in S_n^2$ . Soit  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ . Le coefficient ligne  $i$ , colonne  $j$ , de la matrice  $P_\sigma \times P_{\sigma'}$  vaut

$$\sum_{k=1}^n \delta_{i,\sigma(k)} \delta_{k,\sigma'(j)}.$$

Dans cette somme, si  $k \neq \sigma'(j)$ , le terme correspondant est nul et quand  $k = \sigma'(j)$ , le terme correspondant vaut  $\delta_{i,\sigma(\sigma'(j))}$ . Finalement, le coefficient ligne  $i$ , colonne  $j$ , de la matrice  $P_\sigma \times P_{\sigma'}$  vaut  $\delta_{i,\sigma(\sigma'(j))}$  qui est encore le coefficient ligne  $i$ , colonne  $j$ , de la matrice  $P_{\sigma \circ \sigma'}$ .

$$\forall (\sigma, \sigma') \in S_n^2, P_\sigma \times P_{\sigma'} = P_{\sigma \circ \sigma'}.$$

(b) Montrons que  $G$  est un sous-groupe du groupe  $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$ .  $G$  contient  $I_n = P_{Id}$  et d'autre part,  $G$  est contenu dans  $GL_n(\mathbb{R})$  d'après 1).

$$(G, \times) \text{ est un sous-groupe de } (GL_n(\mathbb{R}), \times).$$

3. Le coefficient ligne  $i$ , colonne  $j$ , de la matrice  $AP_\sigma$  vaut

$$\sum_{k=1}^n a_{i,k} \delta_{k,\sigma(j)} = a_{i,\sigma(j)}.$$

Par suite, si  $C_1, \dots, C_n$  désignent les colonnes de la matrice  $A$ , la matrice  $AP_\sigma$  est la matrice dont les colonnes sont  $C_{\sigma(1)}, \dots, C_{\sigma(n)}$ .

$$\text{Si } A = (C_1 \dots C_n), AP_\sigma = (C_{\sigma(1)} \dots C_{\sigma(n)}).$$

4. Commençons par trouver le polynôme caractéristique d'un cycle  $c$  de longueur  $\ell$  ( $1 \leq \ell \leq n$ ). Soit  $f_c$  l'endomorphisme de  $E = \mathbb{R}^n$  de matrice  $P_c$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}^n$ . Il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f_c$  est  $\begin{pmatrix} J_\ell & 0_{\ell, n-\ell} \\ 0_{n-\ell, \ell} & I_{n-\ell} \end{pmatrix}$  où la matrice  $J_\ell$  est la matrice de l'exercice 18. Le polynôme caractéristique  $\chi_{P_c}$  de  $P_c$  est donc  $(-1)^n(X-1)^{n-\ell}(X^\ell-1)$  (voir exercice 18).

Soit maintenant  $\sigma \in S_n$ . On note  $f_\sigma$  l'endomorphisme de  $E = \mathbb{R}^n$  de matrice  $P_\sigma$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}^n$ .  $\sigma$  se décompose de manière unique à l'ordre près des facteurs en produit de cycles à supports disjoints, ces cycles commutant deux à deux.

Posons donc  $\sigma = c_1 \circ \dots \circ c_p$ ,  $p \geq 1$ , où les  $c_i$ ,  $1 \leq i \leq p$ , sont des cycles à supports disjoints, et notons  $\ell_i$  la longueur du cycle  $c_i$ ,  $1 \leq i \leq p$ . Il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f_\sigma$  est

$$\begin{pmatrix} J_{\ell_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & J_{\ell_p} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & I_k \end{pmatrix} \text{ où } k = n - \ell_1 - \dots - \ell_p \text{ est le nombre de points fixes de } \sigma.$$

Le polynôme caractéristique cherché est donc  $\chi_{P_\sigma} = (-1)^n(X^{\ell_1}-1)\dots(X^{\ell_p}-1)(X-1)^{n-\ell_1-\dots-\ell_p}$ . On en déduit immédiatement les valeurs propres de  $P_\sigma$ .

### Correction de l'exercice 20 ▲

Posons  $\chi_f = \prod_{k=1}^p (\lambda_k - X)^{\alpha_k}$  où  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  sont les valeurs propres deux à deux distinctes de  $f$ .

Soit  $E'_k = \text{Ker}(f - \lambda_k Id)^{\alpha_k}$  le sous-espace caractéristique de  $f$  associé à la valeur propre  $\lambda_k$ ,  $1 \leq k \leq p$ . D'après le théorème de décomposition des noyaux,  $E = E'_1 \oplus \dots \oplus E'_p$ . De plus, si  $f_k$  est la restriction de  $f$  à  $E'_k$  alors  $f_k$  est un endomorphisme de  $E'_k$  (car  $f$  et  $(f - \lambda_k Id)^{\alpha_k}$  commutent).

On note que  $(f_k - \lambda_k)^{\alpha_k} = 0$  et donc  $\lambda_k$  est l'unique valeur propre de  $f_k$  car toute valeur propre de  $f_k$  est racine du polynôme annulateur  $(X - \lambda_k)^{\alpha_k}$ .

**Existence de  $d$  et  $n$ .** On définit  $d$  par ses restrictions  $d_k$  aux  $E'_k$ ,  $1 \leq k \leq p$  :  $d_k$  est l'homothétie de rapport  $\lambda_k$ . Puis on définit  $n$  par  $n = f - d$ .

$d$  est diagonalisable car toute base de  $E$  adaptée à la décomposition  $E = E'_1 \oplus \dots \oplus E'_p$  est une base de vecteurs propres de  $d$ . De plus,  $f = d + n$ .

Soit  $n_k$  la restriction de  $n$  à  $E'_k$ . On a  $n_k = f_k - \lambda_k Id_{E'_k}$  et par définition de  $E'_k$ ,  $n_k^{\alpha_k} = 0$ . Mais alors, si on pose  $\alpha = \text{Max}\{\alpha_1, \dots, \alpha_p\}$ , on a  $n_k^\alpha = 0$  pour tout  $k$  de  $\{1, \dots, p\}$  et donc  $n^\alpha = 0$ . Ainsi,  $n$  est nilpotent. Enfin, pour tout  $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $n_k$  commute avec  $d_k$  car  $d_k$  est une homothétie et donc  $nd = dn$ .

**Unicité de  $d$  et  $n$ .** Supposons que  $f = d + n$  avec  $d$  diagonalisable,  $n$  nilpotent et  $nd = dn$ .

$d$  commute avec  $n$  et donc avec  $f$  car  $df = d^2 + dn = d^2 + nd = fd$ . Mais alors,  $n = f - d$  commute également avec  $f$ .  $d$  et  $n$  laissent donc stables les sous-espaces caractéristiques  $E'_k$ ,  $1 \leq k \leq p$  de  $f$ . Pour  $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$ , on note  $d_k$  et  $n_k$  les restrictions de  $d$  et  $n$  à  $E'_k$ .

Soient  $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$  puis  $\mu$  une valeur propre de  $d_k$ . D'après l'exercice 7,

$$\det(f_k - \mu Id) = \det(d_k - \mu Id + n) = \det(d_k - \mu Id) = 0,$$

car  $d_k - \mu Id$  n'est pas inversible. On en déduit que  $f_k - \mu Id$  n'est pas inversible et donc que  $\mu$  est valeur propre de  $f_k$ . Puisque  $\lambda_k$  est l'unique valeur propre de  $f_k$ , on a donc  $\mu = \lambda_k$ . Ainsi,  $\lambda_k$  est l'unique valeur propre de  $d_k$  et puisque  $d_k$  est diagonalisable (voir l'exercice 36), on a nécessairement  $d_k = \lambda_k Id_{E'_k}$  puis  $n_k = f_k - \lambda_k Id_{E'_k}$ . Ceci montre l'unicité de  $d$  et  $n$ .

### Correction de l'exercice 21 ▲

On cherche une matrice  $A$  de format 4 dont le polynôme caractéristique est  $X^4 - 3X^3 + X^2 - 1$ . La matrice

compagnon  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  convient (voir l'exercice ??) et le théorème de CAYLEY-HAMILTON

montre que  $A^4 - 3A^3 + A^2 - I_4 = 0$ .

---

**Correction de l'exercice 22 ▲**

Soit  $A$  la matrice de l'énoncé.  $\det A$  est le produit des valeurs propres de  $A$ .

- Si  $b = 0$ ,  $\det A = a^n$ .
- Si  $b \neq 0$ ,  $\text{rg}(A - (a-b)I) = 1$  ou encore  $\dim(\text{Ker}(A - (a-b)I)) = n-1$ . Par suite,  $a-b$  est valeur propre d'ordre  $n-1$  au moins. On obtient la valeur propre manquante  $\lambda$  par la trace de  $A$  :  $(n-1)(a-b) + \lambda = na$  et donc  $\lambda = a + (n-1)b$ . Finalement  $\det A = (a-b)^{n-1}(a + (n-1)b)$  ce qui reste vrai quand  $b = 0$ .

$$\begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ b & \dots & b & a \end{vmatrix} = (a-b)^{n-1}(a + (n-1)b).$$

---

**Correction de l'exercice 23 ▲**

$A$  est de format 2 et donc, soit a deux valeurs propres distinctes et est dans ce cas diagonalisable dans  $\mathbb{C}$ , soit a une valeur propre double  $\lambda$  non nulle car  $\text{Tr}A = 2\lambda \neq 0$ .

Dans ce dernier cas,  $A^2$  est diagonalisable et est donc est semblable à  $\text{diag}(\lambda^2, \lambda^2) = \lambda^2 I$ . Par suite,  $A^2 = \lambda^2 I$ . Ainsi,  $A$  annule le polynôme  $X^2 - \lambda^2 = (X - \lambda)(X + \lambda)$  qui est scindé sur  $\mathbb{R}$  à racines simples. Dans ce cas aussi,  $A$  est diagonalisable.

---

**Correction de l'exercice 24 ▲**

1. Soit  $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Soit  $F$  une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $(\varphi(f))(x) = \frac{F(x)-F(0)}{x-0}$ .  
 $F$  est continue sur  $\mathbb{R}$  donc  $\varphi(f)$  est continue sur  $\mathbb{R}^*$ . De plus,  $F$  étant dérivable en 0

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} (\varphi(f))(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = F'(0) = f(0) = (\varphi(f))(0).$$

Finalement  $\varphi(f)$  est continue sur  $\mathbb{R}$ . Ainsi,  $\varphi$  est une application de  $E$  dans  $E$ . La linéarité de  $\varphi$  est claire et finalement

$$\varphi \in \mathcal{L}(C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})).$$

2. Si  $f$  est dans  $\text{Ker}(\varphi)$  alors  $f(0) = 0$  et pour tout  $x$  non nul,  $\int_0^x f(t) dt = 0$ . Par dérivation on obtient  $\forall x \in \mathbb{R}^*$ ,  $f(x) = 0$  ce qui reste vrai pour  $x = 0$  et donc  $f = 0$ . Finalement  $\text{Ker}(\varphi) = \{0\}$  et  $\varphi$  est injective.

$\varphi$  n'est pas surjective car pour toute  $f \in E$ ,  $\varphi(f)$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ . Mais alors par exemple, l'application  $g : x \mapsto |x-1|$  est dans  $E$  mais n'est pas dans  $\text{Im}(\varphi)$ .

$$\varphi \text{ est injective et n'est pas surjective.}$$

3. On cherche  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $f$  continue sur  $\mathbb{R}$  et non nulle telle que  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $(\varphi(f))(x) = \lambda f(x)$ . D'après la question précédente, 0 n'est pas valeur propre de  $\varphi$  et donc nécessairement  $\lambda \neq 0$ .

Pour  $x = 0$ , nécessairement  $f(0) = \lambda f(0)$  et donc ou bien  $\lambda = 1$  ou bien  $f(0) = 0$ .

On doit avoir pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ ,  $f(x) = \frac{1}{\lambda x} \int_0^x f(t) dt$ .  $f$  est nécessairement dérivable sur  $\mathbb{R}^*$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a  $\int_0^x f(t) dt = \lambda x f(x)$  et par dérivation, on obtient pour  $x \in \mathbb{R}^*$ ,

$$f(x) = \lambda(xf'(x) + f(x)).$$

Soit  $I$  l'un des deux intervalles  $]-\infty, 0[$  ou  $]0, +\infty[$ .

$$\begin{aligned} \forall x \in I, f(x) = \lambda(xf'(x) + f(x)) &\Rightarrow \forall x \in I, f'(x) + \frac{\lambda-1}{\lambda x} f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \forall x \in I, e^{\frac{(\lambda-1)\ln|x|}{\lambda}} f'(x) + \frac{\lambda-1}{\lambda x} e^{\frac{(\lambda-1)\ln|x|}{\lambda}} f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \forall x \in I, \left(|x|^{\frac{\lambda-1}{\lambda}} f\right)'(x) = 0 \\ &\Rightarrow \exists K \in \mathbb{R} / \forall x \in I, |x|^{\frac{\lambda-1}{\lambda}} f(x) = K \Rightarrow \exists K \in \mathbb{R} / \forall x \in I, f(x) = K|x|^{\frac{1-\lambda}{\lambda}}. \end{aligned}$$

**1er cas.** Si  $\lambda \in ]-\infty, 0[ \cup ]1, +\infty[$  alors  $\frac{1-\lambda}{\lambda} < 0$  et donc  $\lim_{x \rightarrow 0} |x|^{\frac{1-\lambda}{\lambda}} = +\infty$ . La fonction  $x \mapsto K|x|^{\frac{1-\lambda}{\lambda}}$  ne peut donc être la restriction à  $I$  d'une fonction continue sur  $\mathbb{R}$  que dans le cas  $K = 0$ . Ceci fournit  $f|_{]-\infty, 0[} = 0$ ,  $f|_{]0, +\infty[} = 0$  et  $f(0) = 0$  par continuité en 0. Donc  $f$  est nécessairement nulle et  $\lambda$  n'est pas valeur propre de  $\varphi$  dans ce cas.

**2ème cas.** Si  $\lambda = 1$ , les restriction de  $f$  à  $]-\infty, 0[$  ou  $]0, +\infty[$  sont constantes et donc, par continuité de  $f$  en 0,  $f$  est constante sur  $\mathbb{R}$ . Réciproquement, les fonctions constantes  $f$  vérifient bien  $\varphi(f) = f$ . Ainsi, 1 est valeur propre de  $f$  et le sous-espace propre associé est constitué des fonctions constantes.

**3ème cas.** Si  $\lambda \in ]0, 1[$ , nécessairement  $\exists (K_1, K_2) \in \mathbb{R}^2 / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} K_1 x^{\frac{1}{\lambda}-1} & \text{si } x \geq 0 \\ K_2 (-x)^{\frac{1}{\lambda}-1} & \text{si } x < 0 \end{cases} \cdot f$  ainsi définie est bien continue sur  $\mathbb{R}$ . Calculons alors  $\varphi(f)$ .

$(\varphi(f))(0) = f(0) = 0$  puis si  $x > 0$ ,

$$(\varphi(f))(x) = \frac{1}{x} \int_0^x K_1 t^{\frac{1-\lambda}{\lambda}} dt = \frac{\lambda K_1}{x} x^{\frac{1}{\lambda}} = \lambda K_1 x^{\frac{1}{\lambda}-1} = \lambda f(x)$$

et de même si  $x < 0$ . Enfin,  $(\varphi(f))(0) = 0 = \lambda f(0)$ . Finalement  $\varphi(f) = \lambda f$ .  $\lambda$  est donc valeur propre de  $\varphi$  ( $K_1 = K_2 = 1$  fournit une fonction non nulle) et le sous-espace propre associé à  $\lambda$  est de dimension 2. Une base de ce sous-espace est  $(f_1, f_2)$  où  $\forall x \in \mathbb{R}, f_1(x) = \begin{cases} x^{\frac{1}{\lambda}-1} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$  et  $f_2(x) =$

$$\begin{cases} 0 & \text{si } x \geq 0 \\ (-x)^{\frac{1}{\lambda}-1} & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$

Finalement

$$\boxed{\text{Sp}(\varphi) = ]0, 1].}$$

### Correction de l'exercice 25 ▲

Trouvons un polynôme scindé à racines simples annulant  $f$ .

Le polynôme  $P = X(X - \lambda)(X - \mu) = X^3 - (\lambda + \mu)X^2 + \lambda\mu X$  est annulateur de  $f$ . En effet,

$$\begin{aligned} P(f) &= f^3 - (\lambda + \mu)f^2 + \lambda\mu f = (\lambda^3 - (\lambda + \mu)\lambda^2 + (\lambda\mu)\lambda)u + (\mu^3 - (\lambda + \mu)\mu^2 + (\lambda\mu)\mu)v \\ &= P(\lambda)u + P(\mu)v = 0. \end{aligned}$$

- Si  $\lambda$  et  $\mu$  sont distincts et non nuls,  $P$  est un polynôme scindé à racines simples annulateur de  $f$  et donc  $f$  est diagonalisable.
- Si  $\lambda = \mu = 0$ , alors  $f = 0$  et donc  $f$  est diagonalisable.
- Si par exemple  $\lambda \neq 0$  et  $\mu = 0$ ,  $f^2 = \lambda^2 u = \lambda f$  et le polynôme  $P = X(X - \lambda)$  est scindé à racines simples et annulateur de  $f$ . Dans ce cas aussi  $f$  est diagonalisable.
- Enfin si  $\lambda = \mu \neq 0$ ,  $f^2 = \lambda^2(u + v) = \lambda f$  et de nouveau  $P = X(X - \lambda)$  est scindé à racines simples et annulateur de  $f$ .

Dans tous les cas,  $f$  est diagonalisable.

### Correction de l'exercice 26 ▲

Posons  $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ . On a  $N^2 = E_{1,3}$  et  $N^3 = 0$ . Si  $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$  est une matrice carrée vérifiant  $X^2 = N$ , alors  $X^6 = 0$ . Donc  $X$  est nilpotente et, puisque  $X$  est de format 3, on sait que  $X^3 = 0$ . Mais alors  $N^2 = X^4 = 0$  ce qui n'est pas. L'équation proposée n'a pas de solution.

### Correction de l'exercice 27 ▲

Montrons le résultat par récurrence sur  $n = \dim E \geq 1$ .

- Si  $n = 1$ , c'est clair.
- Soit  $n \geq 1$ . Supposons que deux endomorphismes d'un  $\mathbb{C}$ -espace de dimension  $n$  qui commutent soient simultanément trigonalisables.

Soient  $f$  et  $g$  deux endomorphismes d'un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension  $n + 1$  tels que  $fg = gf$ .

$f$  et  $g$  ont au moins un vecteur propre en commun. En effet,  $f$  admet au moins une valeur propre  $\lambda$ . Soit  $E_\lambda$  le sous-espace propre de  $f$  associé à  $\lambda$ .  $g$  commute avec  $f$  et donc laisse stable  $E_\lambda$ . La restriction de  $g$  à  $E_\lambda$  est un endomorphisme de  $E_\lambda$  qui est de dimension finie non nulle. Cette restriction admet donc une valeur propre et donc un vecteur propre. Ce vecteur est un vecteur propre commun à  $f$  et  $g$ .

Commençons à construire une base de trigonalisation simultanée de  $f$  et  $g$ . Soit  $x$  un vecteur propre commun à  $f$  et  $g$ . On complète la famille libre  $(x)$  en une base  $\mathcal{B} = (x, \dots)$  de  $E$ . Dans la base  $\mathcal{B}$ , les matrices  $M$  et  $N$  de  $f$  et  $g$  s'écrivent respectivement  $M = \begin{pmatrix} \lambda & \times \\ 0 & M_1 \end{pmatrix}$  et  $N = \begin{pmatrix} \mu & \times \\ 0 & N_1 \end{pmatrix}$  où  $M_1$  et  $N_1$  sont de format  $n$ .

Un calcul par blocs montre que  $M_1$  et  $N_1$  commutent ou encore si  $f_1$  et  $g_1$  sont les endomorphismes de  $\mathbb{C}^n$  de matrices  $M_1$  et  $N_1$  dans la base canonique de  $\mathbb{C}^n$ ,  $f_1$  et  $g_1$  commutent. Par hypothèse de récurrence,  $f_1$  et  $g_1$  sont simultanément trigonalisables. Donc il existe une matrice inversible de format  $n$   $P_1$  et deux matrices triangulaires supérieures de format  $n$   $T_1$  et  $T_1'$  telles que  $P_1^{-1}M_1P_1 = T_1$  et  $P_1^{-1}N_1P_1 = T_1'$ .

Soit  $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_1 \end{pmatrix}$ .  $P$  est inversible de format  $n + 1$  car  $\det P = \det P_1 \neq 0$  et un calcul par blocs montre que  $P^{-1}MP$  et  $P^{-1}NP$  sont triangulaires supérieures.

$P$  est donc la matrice de passage de la base  $\mathcal{B}$  à une base de trigonalisation simultanée de  $f$  et  $g$ .

### Correction de l'exercice 28 ▲

Soit  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  la famille des valeurs propres de  $A$ . On a donc  $\chi_A = (\lambda_1 - X) \dots (\lambda_n - X)$ .

$\chi_A(B)$  inversible  $\Leftrightarrow (B - \lambda_1 I) \dots (B - \lambda_n I)$  inversible

$$\Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, B - \lambda_k I \text{ inversible (car } \det((B - \lambda_1 I) \dots (B - \lambda_n I)) = \det(B - \lambda_1 I) \times \dots \times \det(B - \lambda_n I))$$

$$\Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_k \text{ n'est pas valeur propre de } B$$

$$\Leftrightarrow \text{Sp}A \cap \text{Sp}B = \emptyset.$$

### Correction de l'exercice 29 ▲

Si  $P$  et  $\chi_f$  sont premiers entre eux, d'après le théorème de BÉZOUT, il existe deux polynômes  $U$  et  $V$  tels que  $UP + V\chi_f = 1$ . En prenant la valeur en  $f$  et puisque que  $\chi_f(f) = 0$ , on obtient  $P(f) \circ U(f) = U(f) \circ P(f) = Id$ .  $P(f)$  est donc un automorphisme de  $E$ .

Réciproquement, si  $P$  et  $\chi_f$  ne sont pas premiers entre eux,  $P$  et  $\chi_f$  ont une racine commune  $\lambda$  dans  $\mathbb{C}$ . Soit  $A$  est la matrice de  $f$  dans une base donnée (si  $\mathbb{K}$  n'est pas  $\mathbb{C}$  l'utilisation de la matrice est indispensable). On a  $P(A) = (A - \lambda I)Q(A)$  pour un certain polynôme  $Q$ . La matrice  $A - \lambda I$  n'est pas inversible car  $\lambda$  est valeur propre de  $A$  et donc  $P(A)$  n'est pas inversible ( $\det(P(A)) = \det(A - \lambda I)\det Q(A) = 0$ ).

### Correction de l'exercice 30 ▲

$\text{rg}(M_{a,b} - I) = 1$ , si  $a = b = 0$ , 2 si l'un des deux nombres  $a$  ou  $b$  est nul et l'autre pas et 3 si  $a$  et  $b$  ne sont pas nuls. Donc  $M_{0,0}$  n'est semblable à aucune des trois autres matrices et de même pour  $M_{1,1}$ .

Il reste à savoir si les matrices  $M_{1,0}$  et  $M_{0,1}$  sont semblables.

$(M_{1,0} - I)^2 = (E_{1,2} + E_{2,3})^2 = E_{1,3} \neq 0$  et  $(M_{0,1} - I)^2 = (E_{1,2} + E_{3,4})^2 = 0$ . Donc les matrices  $M_{1,0}$  et  $M_{0,1}$  ne sont pas semblables.

### Correction de l'exercice 31 ▲

Soit  $B$  la matrice de l'énoncé.  $\text{rg}B = 1$  et si  $A$  existe, nécessairement  $\text{rg}A = n - 1$  (exercice ??).

Une matrice de rang 1 admet l'écriture générale  $U^tV$  où  $U$  et  $V$  sont des vecteurs colonnes non nuls. Ici

$$U = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} \text{ et } V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Si  $A$  existe,  $A$  doit déjà vérifier  $A^t tB = {}^tBA = 0$  ou encore  $AV^tU = 0$  (1) et  $V^tUA = 0$  (2). En multipliant les deux membres de l'égalité (1) par  $U$  à droite puis en simplifiant par le réel non nul  ${}^tUU = \|U\|_2^2$ , on obtient  $AV = 0$ . Ceci montre que la première colonne de  $A$  est nulle (les  $n - 1$  dernières devant alors former une famille libre). De même, en multipliant les deux membres de l'égalité (2) par  ${}^tV$  à gauche, on obtient  ${}^tUA = 0$  et donc les colonnes de la matrice  $A$  sont orthogonales à  $U$  (pour le produit scalaire usuel) ce qui invite franchement à

$$\text{considérer la matrice } A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & \dots & \dots & -n \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ qui convient.}$$

### Correction de l'exercice 32 ▲

(Si les  $a_k$  sont réels, la matrice  $A$  est symétrique réelle et les redoublants savent que la matrice  $A$  est diagonalisable.)

Si tous les  $a_k$ ,  $1 \leq k \leq n - 1$ , sont nuls la matrice  $A$  est diagonalisable car diagonale.

On suppose dorénavant que l'un au moins des  $a_k$ ,  $1 \leq k \leq n - 1$ , est non nul. Dans ce cas,  $\text{rg}A = 2$ .

0 est valeur propre d'ordre  $n - 2$  au moins. Soient  $\lambda$  et  $\mu$  les deux dernières valeurs propres. On a

$$\lambda + \mu = \text{Tr}A = a_n \text{ et } \lambda^2 + \mu^2 = \text{Tr}(A^2) = \sum_{k=1}^{n-1} a_k^2 + \sum_{k=1}^n a_k^2 = 2 \sum_{k=1}^{n-1} a_k^2 + a_n^2.$$

$\lambda$  et  $\mu$  sont solutions du système  $\begin{cases} \lambda + \mu = a_n \\ \lambda^2 + \mu^2 = 2 \sum_{k=1}^{n-1} a_k^2 + a_n^2 \end{cases}$  qui équivaut au système  $\begin{cases} \lambda + \mu = a_n \\ \lambda^2 + \mu^2 = - \sum_{k=1}^{n-1} a_k^2 \end{cases}$  (S).

On a alors les situations suivantes :

- Si  $\lambda$  et  $\mu$  sont distincts et non nuls,  $A$  est diagonalisable car l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre est égale à la dimension du sous-espace propre correspondant.
- Si  $\lambda$  ou  $\mu$  est nul,  $A$  n'est pas diagonalisable car l'ordre de multiplicité de la valeur propre 0 est différent de  $n - 2$ , la dimension du noyau de  $A$ .
- Si  $\lambda = \mu \neq 0$ ,  $A$  est diagonalisable si et seulement si  $\text{rg}(A - \lambda I) = n - 2$  mais on peut noter que si  $\lambda$  n'est pas nul, on a toujours  $\text{rg}(A - \lambda I) = n - 1$  en considérant la matrice extraite formée des  $n-1$  premières lignes et colonnes.

En résumé, la matrice  $A$  est diagonalisable si et seulement si le système (S) admet deux solutions distinctes et non nulles.

Mais  $\lambda$  et  $\mu$  sont solutions du système (S) si et seulement si  $\lambda$  et  $\mu$  sont les racines de l'équation (E) :  $X^2 - a_n X - \sum_{k=1}^{n-1} a_k^2 = 0$ . Par suite,  $A$  est diagonalisable si et seulement si  $\sum_{k=1}^{n-1} a_k^2 = 0$  et  $\Delta = a_n^2 + 4 \sum_{k=1}^{n-1} a_k^2 \neq 0$ .

### Correction de l'exercice 33 ▲

$$1. \chi_A = \begin{vmatrix} 1-X & 1 & -1 \\ 1 & 1-X & 1 \\ 1 & 1 & 1-X \end{vmatrix} = (1-X)(X^2-2X) - (2-X) + (2-X) = -X(X-1)(X-2).$$

On est dans le cas d'une matrice diagonalisable avec 3 valeurs propres simples.

**Recherche des droites stables.** Dans chacun des cas, les droites stables sont les droites engendrées par des vecteurs propres. On obtient immédiatement les 3 droites stables :  $E_0 = \text{Vect}(e_1)$  où  $e_1 = (1, -1, 0)$ ,  $E_1 = \text{Vect}(e_2)$  où  $e_2 = (1, -1, -1)$  et  $E_2 = \text{Vect}(e_3)$  où  $e_3 = (0, 1, 1)$ .

**Recherche des plans stables.** Soit  $P$  un plan stable par  $f$ . La restriction de  $f$  à  $P$  est un endomorphisme de  $P$  et on sait de plus que le polynôme caractéristique de  $f|_P$  divise celui de  $f$ .  $f|_P$  est diagonalisable car  $f$  l'est car on dispose d'un polynôme scindé à racines simples annulant  $f$  et donc  $f|_P$ . On en déduit que  $P$  est engendré par deux vecteurs propres indépendants de  $f|_P$  qui sont encore vecteurs propres de  $f$ . On obtient trois plans stables :  $P_1 = \text{Vect}(e_2, e_3)$ ,  $P_2 = \text{Vect}(e_1, e_3)$  et  $P_3 = \text{Vect}(e_1, e_2)$ .

$$2. \chi_A = \begin{vmatrix} 2-X & 2 & 1 \\ 1 & 3-X & 1 \\ 1 & 2 & 2-X \end{vmatrix} = (2-X)(X^2-5X+4) - (-2X+2) + (X-1) = (1-X)((X-2)(X-4) - 2 - 1) = (1-X)(X^2+6X-5) = -(X-1)^2(X-5).$$

Puis  $E_1$  est le plan d'équation  $x+2y+z=0$  et  $E_5 = \text{Vect}((1, 1, 1))$ .

On est toujours dans le cas diagonalisable mais avec une valeur propre double.

Les droites stables sont  $E_5 = \text{Vect}((1, 1, 1))$  et n'importe quelle droite contenue dans  $E_1$ . Une telle droite est engendrée par un vecteur de la forme  $(x, y, -x-2y)$  avec  $(x, y) \neq (0, 0)$ .

**Recherche des plans stables.** Soit  $P$  un plan stable par  $f$ .  $f$  est diagonalisable et donc  $f|_P$  est un endomorphisme diagonalisable de  $P$ . Par suite,  $P$  est engendré par deux vecteurs propres indépendants de  $f$ . On retrouve le plan propre de  $f$  d'équation  $x+2y+z=0$  et les plans engendrés par  $(1, 1, 1)$  et un vecteur quelconque non nul du plan d'équation  $x+2y+z=0$ . L'équation générale d'un tel plan est  $(-a-3b)x + (2a+2b)y + (b-a)z = 0$  où  $(a, b) \neq (0, 0)$ .

$$3. \chi_A = \begin{vmatrix} 6-X & -6 & 5 \\ -4 & -1-X & 10 \\ 7 & -6 & 4-X \end{vmatrix} = (6-X)(X^2-3X+56) + 4(6X+6) + 7(5X-55) = -X^3 + 9X^2 - 15X - 25 = -(X+1)(X^2-10X+25) = -(X+1)(X-5)^2.$$

$E_{-1} = \text{Vect}(10, 15, 4)$  et  $E_5 = \text{Vect}((1, 1, 1))$ . On est dans le cas où  $A$  admet une valeur propre simple et une double mais n'est pas diagonalisable. Les droites stables par  $f$  sont les deux droites propres.

**Recherche des plans stables.** Soit  $P$  un plan stable par  $f$ . Le polynôme caractéristique de  $f|_P$  est unitaire et divise celui de  $f$ . Ce polynôme caractéristique est donc soit  $(X-1)(X-5)$  soit  $(X-5)^2$ .

Dans le premier cas,  $f|_P$  est diagonalisable et  $P$  est nécessairement le plan  $\text{Vect}((10, 15, 4)) + \text{Vect}((1, 1, 1))$  c'est-à-dire le plan d'équation  $11x - 6y - 5z = 0$ .

Dans le deuxième cas,  $\chi_{f|_P} = (X-5)^2$  et 5 est l'unique valeur propre de  $f|_P$ . Le théorème de CAYLEY-HAMILTON montre que  $(f|_P - 5Id)^2 = 0$  et donc  $P$  est contenu dans  $\text{Ker}(f - 5Id)^2$ .  $\text{Ker}(f - 5Id)^2$  est le plan d'équation  $x = z$  qui est bien sûr stable par  $f$  car  $(f - 5Id)^2$  commute avec  $f$ .

### Correction de l'exercice 34 ▲

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 2 & 6 & -14 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix}$ .  $A$  est de rang 1 et donc admet deux valeurs propres égales à 0.  $\text{Tr}A = 0$  et donc la

troisième valeur propre est encore 0. Donc  $\chi_A = -X^3$ .  $A$  est nilpotente et le calcul donne  $A^2 = 0$ . Ainsi, si  $X$  est une matrice telle que  $X^2 = A$  alors  $X$  est nilpotente et donc  $X^3 = 0$ .

**Réduction de  $A$ .**  $A^2 = 0$ . Donc  $\text{Im}A \subset \text{Ker}A$ . Soit  $e_3$  un vecteur non dans  $\text{Ker}A$  puis  $e_2 = Ae_3$ .  $(e_2)$  est une base de  $\text{Im}A$  que l'on complète en  $(e_1, e_2)$  base de  $\text{Ker}A$ .

$(e_1, e_2, e_3)$  est une base de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$  car si  $ae_1 + be_2 + ce_3 = 0$  alors  $A(ae_1 + be_2 + ce_3) = 0$  c'est-à-dire  $ce_2 = 0$  et donc  $c = 0$ . Puis  $a = b = 0$  car la famille  $(e_1, e_2)$  est libre.



Si  $P$  est la matrice de passage de la base canonique de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$  à la base  $(e_1, e_2, e_3)$  alors  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

On voit peut prendre  $P = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 0 \\ -1 & -14 & 0 \\ 0 & -7 & 1 \end{pmatrix}$ .

Si  $X^2 = A$ ,  $X$  commute avec  $A$  et donc  $X$  laisse stable  $\text{Im}A$  et  $\text{Ker}A$ . On en déduit que  $Xe_2$  est colinéaire à  $e_2$  et  $Xe_1$  est dans  $\text{Vect}(e_1, e_2)$ . Donc  $P^{-1}XP$  est de la forme  $\begin{pmatrix} a & 0 & d \\ b & c & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$ . De plus,  $X$  est nilpotente de polynôme caractéristique  $(a - \lambda)(c - \lambda)(f - \lambda)$ . On a donc nécessairement  $a = c = f = 0$ .  $P^{-1}XP$  est de la forme  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & b \\ a & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

Enfin,  $X^2 = A \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & b \\ a & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow ab = 1$ .

Les matrices  $X$  solutions sont les matrices de la forme  $P \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{a} \\ a & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$  où  $a$  est non nul et  $b$  quelconque.

On trouve  $P^{-1} = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 14 & -7 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ -7 & -21 & 49 \end{pmatrix}$  puis

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 3 & -7 & 0 \\ -1 & -14 & 0 \\ 0 & -7 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{a} \\ a & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 & -7 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ -7 & -21 & 49 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{49} \begin{pmatrix} -7a & 0 & \frac{3}{a} - 7b \\ -14 & 0 & -\frac{1}{a} - 14b \\ -7a & 0 & -7b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 & -7 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ -7 & -21 & 49 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2a - \frac{3}{7a} + b & a - \frac{9}{7a} + 3b & \frac{3}{a} - 7b \\ -4a + \frac{1}{7a} + 2b & 2a + \frac{3}{7a} + 6b & -\frac{1}{a} - 14b \\ -2a + b & a + 3b & -7b \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}. \end{aligned}$$

### Correction de l'exercice 35 ▲

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ .  $\chi_A = \begin{vmatrix} 1-X & 0 & -1 \\ 1 & 2-X & 1 \\ 2 & 2 & 3-X \end{vmatrix} = (1-X)(X^2 - 5X + 4) - (-2 + 2X) = (1-X)(X^2 - 5X + 4 + 2) = -(X-1)(X-2)(X-3)$ .

$A$  est à valeurs propres réelles et simples.  $A$  est diagonalisable dans  $\mathbb{R}$  et les sous-espaces propres sont des droites.

Si  $M$  est une matrice qui commute avec  $A$ ,  $M$  laisse stable ces droites et donc si  $P$  est une matrice inversible telle que  $P^{-1}AP$  soit diagonale alors la matrice  $P^{-1}MP$  est diagonale. Réciproquement une telle matrice commute avec  $A$ .

$$C(A) = \{P \text{diag}(a, b, c) P^{-1}, (a, b, c) \in \mathbb{C}^3\}.$$

On trouve  $C(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 2b-c & -a+2b-c & \frac{a-c}{2} \\ -b+c & a-b+c & (-a+c)/2 \\ 2c-2b & -2b+c & c \end{pmatrix}, (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \right\}$ . On peut vérifier que  $C(A) =$

$\text{Vect}(I, A, A^2)$ .

---

**Correction de l'exercice 36 ▲**

$F$  est stable par  $f$  et donc  $f|_F$  est un endomorphisme de  $F$ .  $f$  est diagonalisable et donc il existe un polynôme  $P$ , scindé à racines simples, tel que  $P(f) = 0$ . Mais alors  $P(f|_F) = 0$  et on a trouvé un polynôme scindé à racines simples annulateur de  $f|_F$ . Donc  $f|_F$  est diagonalisable.

---

**Correction de l'exercice 37 ▲**

Soit  $P = X^3 + X^2 + X = X(X - j)(X - j^2)$ .  $P$  est à racines simples dans  $\mathbb{C}$  et annulateur de  $A$ . Donc  $A$  est diagonalisable dans  $\mathbb{C}$  et ses valeurs propres sont à choisir dans  $\{0, j, j^2\}$ . Le polynôme caractéristique de  $A$  est de la forme  $(-1)^n X^\alpha (X - j)^\beta (X - j^2)^\gamma$  avec  $\alpha + \beta + \gamma = n$ . De plus,  $A$  est réelle et on sait que  $j$  et  $j^2 = \bar{j}$  ont même ordre de multiplicité ou encore  $\gamma = \beta$ .

Puisque  $A$  est diagonalisable, l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre est égale à la dimension du sous-espace propre correspondant et donc

$$\text{rg}(A) = n - \dim(\text{Ker}A) = n - \alpha = 2\beta.$$

On a montré que  $\text{rg}A$  est un entier pair.

---