Enoncés et corrections : Ana Matos.

Méthode de Gauss. Factorisation LU et de Cholesky

Exercice 1 Taille des éléments dans l'élimination de Gauss

Notons $\tilde{A}_k$ la matrice carrée d'ordre $(n-k+1)$ formée des éléments $a_{ij}^k, k \leqslant i, j \leqslant n$ de la matrice $A_k = (a_{ij}^k)$ obtenue comme résultat de la $(k-1)$–ème étape de l'élimination de Gauss. On suppose $A = A_1$ symétrique définie positive.

1. Notant $(.,.)$ le produit scalaire euclidien et $v' \in \mathbb{R}^{n-k}$ le vecteur formé par les $(n-k)$ dernières composantes d'un vecteur $v = (v_i)_{i=k}^n \in \mathbb{R}^{n-k+1}$ quelconque, établir l'identité

$$(\tilde{A}_k v, v) = (\tilde{A}_{k+1} v', v') + \frac{1}{a_{kk}^k} \left| a_{kk}^k v_k + \sum_{i=k+1}^{n} a_{ik}^k v_i \right|^2 .$$

2. Montrer que chaque matrice $\tilde{A}_k$ est symétrique définie positive.

3. Établir les inégalités suivantes:

$$0 < a_{ii}^{k+1} \leqslant a_{ii}^k, \quad k+1 \leqslant i \leqslant n$$

$$\max_{k+1 \leqslant i \leqslant n} a_{ii}^{k+1} = \max_{k+1 \leqslant i,j \leqslant n} \left| a_{ij}^{k+1} \right| \leqslant \max_{k \leqslant i,j \leqslant n} \left| a_{ij}^k \right| = \max_{k \leqslant i \leqslant n} a_{ii}^k$$

Correction ▼ [002222]

Exercice 2 Stratégie de pivotage

1. Montrer que pour une matrice quelconque $A = (a_{ij})$ de type (2×2) on a

$$\mathrm{cond}_2(A) = \sigma + (\sigma^2 - 1)^{1/2} \text{ avec } \sigma = \frac{\sum_{i,j=1}^2 |a_{ij}|^2}{2|\det(A)|}$$

2. Calculer les conditionnements $\mathrm{cond}_p(\cdot)$ pour $p = 1, 2, \infty$ des matrices exactes obtenues à la première étape de la procédure d'élimination de Gauss pour résoudre le système linéaire

$$\begin{cases} 10^{-4} u_1 + u_2 = 1 \\ u_1 + u_2 = 2 \end{cases}$$

selon que l'on commence, ou non, par échanger les deux équations. Conclusion?

[002223]

Exercice 3 Factorisation LU d'une matrice bande

Montrer que la factorisation LU préserve la structure des matrices bandes au sens suivant :

$$a_{ij} = 0 \text{ pour } |i-j| \geqslant p \Rightarrow \begin{cases} l_{ij} = 0 & \text{pour } i - j \geqslant p \\ u_{ij} = 0 & \text{pour } j - i \geqslant p \end{cases}$$

Correction ▼ [002224]

Exercice 4 Factorisation d'une matrice symétrique

Soit A une matrice symétrique inversible admettant une factorisation LU. Montrer que l'on peut écrire A sous la forme

$$A = B\tilde{B}^T \text{ où}$$

B est une matrice triangulaire inférieure ;

$\tilde{B}$ est une matrice où chaque colonne est soit égale à la colonne correspondante de B, soit égale à la colonne correspondante de B changée de signe.

Application numérique

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 4 & -4 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Correction ▼ [002225]

Exercice 5 Quelques factorisations LU

1. Soit $A = LU$ la décomposition LU d'une matrice $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ avec $|l_{ij}| \leqslant 1$. Soient a_i^T et u_i^T les lignes i de A et U respectivement. Montrer que
$$u_i^T = a_i^T - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} u_j^T$$
et que
$$\|U\|_\infty \leqslant 2^{n-1}\|A\|_\infty$$

2. Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ définie par
$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \text{ ou } j = n \\ -1 & \text{si } i > j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$
Montrer que A a une décomposition LU avec $|l_{ij}| \leqslant 1$ et $u_{nn} = 2^{n-1}$.

[002226]

Exercice 6

On suppose $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ inversible. Montrer que si $PA\Pi = LU$ est obtenue par la méthode de Gauss avec pivotage total, alors
$$\forall i, j = 1, \cdots, n \quad |l_{ij}| \leqslant 1$$
$$\forall i = 1, \cdots, n, \forall j = i, \cdots, n, \quad |u_{ij}| \leqslant |u_{ii}|$$

[002227]

Exercice 7

Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ telle que A^T soit à diagonale strictement dominante. Montrer que A admet une décomposition LU avec L^T à diagonale strictement dominante.

Correction ▼ [002228]

Correction de l'exercice 1 ▲

1. À la k-ème étape de l'élimination de Gauss, l'élément a_{ij}^{k+1} est donné par

$$a_{ij}^{k+1} = a_{ij}^{k} - \frac{a_{kj}^{k} a_{ik}^{k}}{a_{kk}^{k}} \quad k+1 \leqslant i, j \leqslant n$$

et on remarque immédiatement par récurrence que toutes les matrices $\tilde{A}_k$ sont symétriques. On a
$(\tilde{A}_{k+1}v', v') = \sum_{i=k+1}^{n} v_i (\sum_{j=k+1}^{n} a_{ij}^{k} v_j) - \frac{1}{a_{kk}^{k}} (\sum_{i=k+1}^{n} a_{ik}^{k} v_i)^2$
$(\tilde{A}_k v, v) = \sum_{i=k+1}^{n} v_i (\sum_{j=k+1}^{n} a_{ij}^{k} v_j) + \sum_{i=k+1}^{n} (a_{ik}^{k} + a_{ki}^{k}) v_i v_k + a_{kk}^{k} v_k^2$
Par symétrie $a_{ik}^{k} = a_{ki}^{k}$ et donc
$(\tilde{A}_k v, v) = (\tilde{A}_{k+1}v', v') + \frac{1}{a_{kk}^{k}} [(\sum_{i=k+1}^{n} a_{ik}^{k} v_i)^2 + 2 v_k \sum_{i=k+1}^{n} a_{ik}^{k} v_i a_{kk}^{k} + (a_{kk}^{k})^2 v_k^2] =$

$$(\tilde{A}_{k+1}v', v') + \frac{1}{a_{kk}^{k}} [a_{kk}^{k} v_k + \sum_{i=k+1}^{n} a_{ik}^{k} v_i]^2$$

2. Faisons un raisonnement par récurrence

   $\tilde{A}_1$ est symétrique définie positive;

   Par hypothèse supposons que $\tilde{A}_k$ est définie positive;

   Supposons par l'absurde que $\tilde{A}_{k+1}$ ne soit pas définie positive: alors $\exists v' \neq 0 : \quad (\tilde{A}_{k+1}v', v') \leqslant 0$. On définit le vecteur $v \in \mathbb{R}^{n-k+1}$ par:

   - $v_i = v'_i, \quad k+1 \leqslant i \leqslant n$
   - v_k est solution de $a_{kk}^{k} v_k + \sum_{i=k+1}^{n} a_{ik}^{k} v_i = 0$

   Alors $(\tilde{A}_k v, v) = 0$ et $v \neq 0$; donc $\tilde{A}_k$ n'est pas définie positive, ce qui contredit l'hypothèse de récurrence.

3. Première inégalité: en utilisant la relation d'élimination on obtient: $a_{ii}^{k+1} = a_{ii}^{k} - \frac{|a_{ki}^{k}|^2}{a_{kk}^{k}}$

   une matrice définie positive a tous ses éléments diagonaux strictement positifs, donc $a_{ii}^{k+1} > 0$

   $\frac{|a_{ki}^{k}|^2}{a_{kk}^{k}} \geqslant 0, \quad k+1 \leqslant i \leqslant n$

donc $a_{ii}^{k+1} \leqslant a_{ii}^{k}, k+1 \leqslant i$

Deuxième inégalité: supposons qu'il existe un élément $a_{ij}^{k}, i < j$ tel que $\left|a_{ij}^{k}\right| \geqslant \max_{k \leqslant l \leqslant n} a_{ll}^{k}$. On considère le vecteur $v \neq 0$ défini par

$$v_i = 1, v_j = -\text{sign}(a_{ij}^{k}), v_l = 0 \quad l \neq i, j$$

Alors

$$(\tilde{A}_k v, v) = (a_{ii}^{k} - \left|a_{ij}^{k}\right|) - (\left|a_{ij}^{k}\right| - a_{jj}^{k}) \leqslant 0$$

ce qui est impossible. Donc

$$\max_{1 \leqslant i, j \leqslant n} \left|a_{ij}^{k}\right| = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} |a_{ii}^{k}|$$

Correction de l'exercice 3 ▲

Montrons par récurrence que $A_n = U$ est une matrice bande.
$A_1 = A, \quad A_{k+1} = L_k A_k = L_k L_{k-1} \cdots L_1 A, \quad k = 1, \cdots, n-1.$

Supposons que A_k est une matrice bande i.e., $a_{ij}^k = 0$ pour $|i-j| \geqslant p$ et montrons que A_{k+1} est une matrice bande.

$$a_{ij}^{k+1} = a_{ij}^k - \frac{a_{ik}^k a_{kj}^k}{a_{kk}^k}$$

Soit $|i-j| \geqslant p \Leftrightarrow |(i-k)-(j-k)| \geqslant p$. On considère deux cas:

$k+1 \leqslant i \leqslant n$ et $k \leqslant j \leqslant n$. Alors $i-k \geqslant p$ ou $j-k \geqslant p \Rightarrow a_{ik}^k a_{kj}^k = 0 \Rightarrow a_{ij}^{k+1} = a_{ij}^k = 0$

$i \leqslant k$ ou $j \leqslant k-1$ alors $a_{ij}^{k+1} = a_{ij}^k = 0$

donc A_{k+1} est une matrice bande et U est une matrice bande. On a $A = LU$ et la matrice triangulaire inférieure L a pour éléments $l_{ij} = a_{ij}^j / a_{jj}^j, \quad j \leqslant i \leqslant n$. Toutes les matrices A_j étant des matrices bandes on a $a_{ij}^j = 0$ pour $i-j \geqslant p \Rightarrow l_{ij} = 0$ pour $i-j \geqslant p$.

Correction de l'exercice 4 ▲

Soit LU la factorisation LU de A. On va intercaler dans cette factorisation la matrice réelle $\Lambda = \mathrm{diag}(\sqrt{|u_{ii}|})$. $A = (L\Lambda)(\Lambda^{-1}U) = BC$. La symétrie de A entraine $BC = C^T B^T$. On a
$C(B^T)^{-1}$ matrice triangulaire supérieure, $B^{-1}C^T$ matrice triangulaire inférieure et $C(B^T)^{-1} = B^{-1}C^T$ et donc $C(B^T)^{-1} = B^{-1}C^T = \mathrm{diag}(\mathrm{sign}(u_{ii})) = S \Rightarrow C(B^T)^{-1}S^{-1} = I = S^{-1}B^{-1}C^T \Leftrightarrow C^T = BS = \tilde{B}$. Donc A peut être mise sous la forme

$$A = B\tilde{B}^T \text{ avec } \tilde{B} = BS$$

i.e. la i-ème colonne de $\tilde{B}$ est égale à la i-ème colonne de B affectée du signe de u_{ii}
Application numérique:

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ & -1 & 2 & 1 \\ & & -1 & -1 \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 7 ▲

$$A = A_1 = \begin{pmatrix} \alpha & u^T \\ v & B_1 \end{pmatrix}, \quad B_1 = (b_{ij})_{i,j=1}^{n-1}$$

A^T étant à diagonale strictement dominante on a:

$$|\alpha| > \sum_{i=1}^{n-1} |v_i|, \quad |u_i| + \sum_{j \neq i} |b_{ji}| < |b_{ii}|$$

Il suffit de montrer que

la première colonne de L vérifie $|l_{11}| > \sum_{i \neq 1} |l_{i1}|$

B_2 est telle que

$$A_2 = \begin{pmatrix} \alpha & u^T \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}, \quad C = B_2 = B_1 - \frac{1}{\alpha} v u^T$$

vérifie $|c_{ii}| > \sum_{j \neq i} |c_{ji}|$ avec $C_{ij} = B_{ij} - \frac{1}{\alpha} v_i u_j$ et itérer.

première colonne de L: $l_{i1} = v_i/\alpha \Rightarrow \sum_{i=2}^{n} |l_{i1}| = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{|v_i|}{\alpha} < 1$

$\sum_{i \neq j} |c_{ij}| = \sum_{i \neq j} \left| b_{ij} - \frac{1}{\alpha} v_i u_j \right| \leqslant \sum_{i \neq j} |b_{ij}| + \frac{1}{|\alpha|} |u_j| \sum_{i \neq j} |v_i|$

$$\leqslant |b_{jj}| - |u_j| + \frac{1}{|\alpha|} |u_j| (|\alpha| - |v_j|) \leqslant \left| b_{jj} - \frac{1}{\alpha} u_j v_j \right| = |c_{jj}|$$

donc B_2^T est de diagonale strictement dominante. La démonstration se finit par récurrence.