Énoncés : V. Gritsenko
Corrections : J.-F. Barraud

Lemme Chinois

Exercice 1

Soient A un anneau et I et J les idéaux de A tels que $I+J=(1)$. Démontrer que $I^n+J^m=(1)$ quels que soient les entiers positifs non-nuls n et m.

Correction ▼ [002300]

Exercice 2

Trouver toutes les solutions des systèmes suivantes :

1. $\begin{cases} x \equiv 1 \mod 3 \\ x \equiv 3 \mod 5 \\ x \equiv 4 \mod 7 \\ x \equiv 2 \mod 11 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x \equiv 997 \mod 2001 \\ x \equiv 998 \mod 2002 \\ x \equiv 999 \mod 2003 \end{cases}$.

Correction ▼ [002301]

Exercice 3

Démontrer que les anneaux suivants sont isomorphes

$$\mathbb{Z}/72\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/84\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/36\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/168\mathbb{Z}.$$

Correction ▼ [002302]

Exercice 4

1. Montrer que $20^{15}-1$ est divisible par $11 \times 31 \times 61$.
2. Trouver le reste de la division de 2^{6754} par 1155.

Correction ▼ [002303]

Exercice 5

1. Quels sont les restes des divisions de 10^{100} par 13 et par 19 ?
2. Quel est le reste de la division de 10^{100} par $247 = 13 \cdot 19$? En déduire que $10^{99}+1$ est multiple de 247.

Correction ▼ [002304]

Exercice 6

Soit $C = A \times B$ le produit direct de deux anneaux. Décrire les ensembles des éléments inversibles, des diviseurs de zéro et des éléments nilpotents de l'anneau C.

Correction ▼ [002305]

Exercice 7

1. Déterminer la structure des anneaux quotients suivants:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^3+x^2+x+1), \quad \mathbb{Z}[x]/(x^2-1), \quad \mathbb{Q}[x]/(x^8-1).$$

2. Considérons l'anneau quotient $K[x]/(f^n g^m)$ où f et g sont deux polynômes distincts irréductibles sur le corps K. Décrire les diviseurs de zéro et les éléments nilpotents de l'anneau $K[x]/(f^n g^m)$.

3. Quels idéaux a cet anneau ?

4. Soit K le corps fini à p éléments. Trouver le nombre des éléments du groupe multiplicatif de l'anneau $K[x]/(f^m g^l)$.

5. Donner une généralisation de la question 4) dans le cas du produit de n polynômes irréductibles sur un corps fini K à q éléments.

Correction ▼ [002306]

Exercice 8

Trouver les facteurs multiples des polynômes suivants :

1. $x^6 - 15x^4 + 8x^3 + 51x^2 - 72x + 27$;

2. $x^6 - 2x^5 - x^4 - 2x^3 + 5x^2 + 4x + 4$.

Correction ▼ [002307]

Exercice 9

Trouver le polynôme $f \in \mathbb{Z}[x]$ du degré le plus petit tel que

$$\begin{cases} f \equiv 2x \mod (x-1)^2 \\ f \equiv 3x \mod (x-2)^3 \end{cases}.$$

[002308]

Correction de l'exercice 1 ▲

$1 \in I + J$ donc $\exists (x, y) \in I \times J, 1 = x + y$. En multipliant cette égalité par x, on obtient $x^2 + xy = x$. On en déduit que $xy \in I$, donc $\forall p \in \mathbb{N}; x^p y \in I^p$, et donc $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, x^p y^q \in I^p$. Par symétrie, on a aussi $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, x^p y^q \in J^q$.
Soit maintenant $(m, n) \in \mathbb{N}^2$. Notons $N = 2\sup(m, n)$. Alors $1 = 1^N = (x + y)^N = \sum_{p+q=N} C_N^p x^p y^q$. Comme : $(p + q = 2N) \Rightarrow (p \geqslant n \text{ ou } q \geqslant m)$, tous les termes de cette somme sont dans I^n ou dans J^m, et donc $1 \in I^n + J^m$

Correction de l'exercice 2 ▲

1. $3, 5, 7, 11$ sont deux à deux premiers entre eux, donc la solution est unique modulo $1155 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$.

$$\begin{cases} x \equiv 1 \mod 3 \\ x \equiv 3 \mod 5 \\ x \equiv 4 \mod 7 \\ x \equiv 2 \mod 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 13 \mod 15 \\ x \equiv 4 \mod 7 \\ x \equiv 2 \mod 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 88 \mod 105 \\ x \equiv 2 \mod 11 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 508 \mod 1155 \end{cases}$$

2. Un diviseur commun de 2001 et 2002 divise leur différence, et donc $\text{pgcd}(2001, 2002) = 1$. De même, $\text{pgcd}(2002, 2003) = 1$, et comme $2 \not| 2001$, $\text{pgcd}(2001, 2003) = 1$.

   $2001, 2002, 2003$ sont donc deux à deux premiers entre eux, et la solution est donc unique modulo $2001 \cdot 2002 \cdot 2003$.

$$\begin{cases} x \equiv 997 \mod 2001 \\ x \equiv 998 \mod 2002 \\ x \equiv 999 \mod 2003 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv -1004 \mod 2001 \\ x \equiv -1004 \mod 2002 \\ x \equiv -1004 \mod 2003 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x \equiv -1004 \mod (2001 \cdot 2002 \cdot 2003)$$

Correction de l'exercice 3 ▲

On a $72 = 8 \cdot 9$ et $\text{pgcd}(8, 9) = 1$, donc $\mathbb{Z}_{72} \simeq \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_9$. De même, $\mathbb{Z}_{84} \simeq \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_7$, $\mathbb{Z}_{36} \simeq \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9$ et $\mathbb{Z}_{168} \simeq \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_7$. Donc $\mathbb{Z}_{72} \times \mathbb{Z}_{84} \simeq \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_7 \simeq \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_7 \simeq \mathbb{Z}_{36} \times \mathbb{Z}_{168}$

Correction de l'exercice 4 ▲

1. $11, 31, 61$ sont premiers donc 2 à 2 premiers entre eux. Ainsi $20^{15} \equiv 1[11 \cdot 31 \cdot 61] \Leftrightarrow \begin{cases} 20^{15} \equiv 1[11] \\ 20^{15} \equiv 1[31] \\ 20^{15} \equiv 1[61] \end{cases}$

   En utilisant le petit théorème de Fermat, on obtient que, modulo 11: $20^{15} \equiv 20^5 \equiv -2^5 \equiv 1[11]$. $(20^{15})^2 = 20^{30} \equiv 1[31]$. On en déduit que $20^{15} \equiv \pm 1[31]$. Comme $31 \not\equiv 1[4]$, d'après le théorème de Wilson, $x^2 = -1$ n'a pas de solution modulo 31, et donc $20^{15} \equiv 1[31]$. $20^2 \equiv -3[31]$ est premier $20^{15} \equiv (9^2)^{15} \equiv 3^{60} \equiv 1[61]$

2. $1155 = 11 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3$. De plus (petit théorème de Fermat) $2^{6754} \equiv 2^4 \equiv 5[11]$. De même, $2^{6754} \equiv 2^4 \equiv 2[7]$, $2^{6754} \equiv 2^2 \equiv -1[5]$, et $2^{6754} \equiv 2^0 \equiv 1[3]$. Or

$$\begin{cases} a \equiv 5[11] \\ a \equiv 2[7] \\ a \equiv 4[5] \\ a \equiv 1[3] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \equiv 5[11] \\ a \equiv 2[7] \\ a \equiv 4[15] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \equiv 5[11] \\ a \equiv -26[105] \end{cases} \Leftrightarrow a \equiv 709[1155]$$

Donc le reste de la division de 2^{6754} par 1155 est 709.

Correction de l'exercice 5 ▲

13 est premier et $100 = 12 \cdot 8 + 4$ donc $10^{100} \equiv 10^4 \equiv (-3)^4 \equiv 3 \equiv -10[13]$. De même $10^{100} \equiv 10^{-8} \equiv 2^8 \equiv 9 \equiv -10[19]$. En utilisant le lemme chinois, on en déduit que $10^{100} \equiv -10[247]$. Comme $\text{pgcd}(10, 247) = 1$, on peut simplifier cette expression par 10 et on a $10^{99} \equiv -1[247]$, et donc $247 | 10^{99} + 1$.

Correction de l'exercice 6 ▲

$C = A \times B$.

$$\begin{aligned}(a,b) \in (A\times B)^\times &\Leftrightarrow \exists (c,d) \in A\times B,\ (a,b)(c,d) = (1,1)\\ &\Leftrightarrow \exists (c,d) \in A\times B,\ ac = 1 \text{ et } bd = 1\\ &\Leftrightarrow a \in A^\times \text{ et } b \in B^\times\end{aligned}$$

donc $(A \times B)^\times = A^\times \times B^\times$.
De même, on obtient que l'ensemble $\mathcal{D}_{A\times B}$ des diviseurs de 0 de $A \times B$ est

$$\mathcal{D}_{A\times B} = \mathcal{D}_A \times B \cup A \times \mathcal{D}_B \cup (A \setminus \{0\}) \times \{0\} \cup \{0\} \times (B \setminus \{0\}).$$

Enfin, pour les nilpotents $Nil(A \times B) = Nil(A) \times Nil(B)$.

Correction de l'exercice 7 ▲

1. En posant $y = x+1$, on a $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3+x^2+x+1) = \{0, 1, x, y, x^2, y^2, xy, xy+1\}$. Les tables des opérations sont les suivantes (elles sont symétriques):

$\oplus$	0	1	x	y	x^2	y^2	xy	$xy+1$
0	0	1	x	y	x^2	y^2	xy	$xy+1$
1		0	y	x	y^2	x^2	$xy+1$	xy
x			0	1	xy	$xy+1$	x^2	y^2
y				0	$xy+1$	xy	y^2	x^2
x^2					0	1	x	y
y^2						0	y	x
xy							0	1
$xy+1$								0

$\otimes$	0	1	x	y	x^2	y^2	xy	$xy+1$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		1	x	y	x^2	y^2	xy	$xy+1$
x			x^2	xy	$xy+1$	y^2	y	1
y				y^2	y	0	y^2	xy
x^2					1	y^2	xy	x
y^2						0	0	y^2
xy							y^2	y
$xy+1$								x^2

Pour $\mathbb{Z}[x]/(x^2-1)$, $(x-1)$ et $(x+1)$ sont deux idéaux étrangers, et le lemme chinois nous donne $\mathbb{Z}[x]/(x^2-1) \simeq \mathbb{Z}[x]/(x-1) \times \mathbb{Z}[x]/(x+1)$. Or $\mathbb{Z}[x]/(x+1) \simeq \mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}[x]/(x-1) \simeq \mathbb{Z}$ donc $\mathbb{Z}[x]/(x^2-1) \simeq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

La factorisation de (x^8-1) sur $\mathbb{Q}$ est $(x^8-1) = (x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)$. En utilisant le lemme chinois, on obtient que $\mathbb{Q}[x]/(x^8-1) \simeq \mathbb{Q}[x]/(x+1) \times \mathbb{Q}[x]/(x^2+1) \times \mathbb{Q}[x]/(x^4+1)$ soit :

$$\mathbb{Q}[x]/(x^8-1) \simeq \mathbb{Q}\times\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}[i]\times\mathbb{Q}[e^{i\pi/4}].$$

Montrons en effet que $\mathbb{Q}[x]/(x^2+1) \simeq \mathbb{Q}[i]$: l'application $\phi : \mathbb{Q}[x]/(x^2+1) \to \mathbb{Q}[i]$ définie par $\bar{P} \mapsto P(i)$ est un morphisme d'anneau.

injectivité : Soit $\bar{P} \in \ker\phi$. Alors $P(i) = 0$. Comme P est à coefficients rationnels donc réels, $-i$ est aussi racine de P. Donc $x^2+1|P$.

surjectivité : Soit $z = a+ib \in \mathbb{Q}[i]$. Alors $z = \phi(ax+b)$.

De même pour $\mathbb{Q}[x]/(x^4+1) \simeq \mathbb{Q}[e^{i\pi/4}]$. Considérons le morphisme $\phi : \mathbb{Q}[x]/(x^4+1) \to \mathbb{Q}[e^{i\pi/4}]$ défini par $\phi(\bar{P}) = P(e^{i\pi/4})$. ϕ est bien définie, c'est un morphisme d'anneau.

injectivité : Soit $\bar{P} \in \ker\phi$. Alors $P(e^{i\pi/4}) = 0$. Par ailleurs X^4+1 est *irréductible* dans $\mathbb{Q}$: sa factorisation sur $\mathbb{R}$ est $(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$, et aucun de ces deux polynômes, même à inversible réel près, n'est rationnel. On en déduit que si (x^4+1) ne divise pas P, alors $\text{pgcd}(X^4+1, P) = 1$. Il existerait donc $U, V \in \mathbb{Q}[x]$, $UP + V(X^4+1) = 1$. En évaluant en $x = e^{i\pi/4}$, on obtient une contradiction. Donc $X^4+1|P$. (cf. exercice **??**).

surjectivité : Soit $z = a + be^{i\pi/4} \in \mathbb{Q}[e^{i\pi/4}]$. Alors $z = \phi(ax+b)$.

2. On a $K[x]/(f^n g^m) \simeq K[x]/(f^m)\times K[x]/(g^m)$. On en déduit que les diviseurs de 0 sont les polynômes de la forme $\bar{P}$ où P satisfait l'une des conditions suivantes :

$$\left|\begin{array}{ll} f^n|P \text{ et } g^m\not|P & (\{0\}\times K[x]/(g^m)\setminus\{0\}) \\ g^m|P \text{ et } f^n\not|P & (K[x]/(f^n)\setminus\{0\}\times\{0\}) \\ f|P \text{ et } f^n\not|P & (\mathcal{D}_{K[x]/(f^n)}\times K[x]/(g^m)) \\ g|P \text{ et } g^m\not|P & (K[x]/(f^n)\times\mathcal{D}_{K[x]/(g^m)}) \end{array}\right.$$

Les nilpotents sont donnés par les conditions

$$\left\{\begin{array}{l} fg|P \\ (f^n g^m\not|P \text{ si on veut exclure } 0) \end{array}\right.$$

3. Les idéaux de $K[x]/(f^n)$ sont les idéaux engendrés par les diviseurs de f^n soit les f^k pour $0 \leqslant k \leqslant n$.

La démonstration peut se faire en toute généralité exactement de la même manière que dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble des diviseurs de f^n (modulo K^*). Ici, $\mathcal{D} = \{f^k, 0 \leqslant k \leqslant n\}$. Soit $\mathcal{I}$ l'ensemble de idéaux de $K[x]/(f^n)$.

On a une flèche de $\mathcal{D} \to \mathcal{I}$, donnée par $d \mapsto (\bar{d})$.

surjectivité Soit $I \in \mathcal{I}$. I est principal : notons $I = (\bar{h})$. Soit $d = \text{pgcd}(f, h)$, et h_1 le polynôme déterminé par $h = dh_1$. Alors $\text{pgcd}(f, h_1) = 0$ et h_1 est inversible dans le quotient. On en déduit que $(\bar{h}) = (\bar{d}) = I$ (or $d \in \mathcal{D}$).

injectivité Soit $d, d' \in \mathcal{D}$ tels que $(\bar{d}) = (\bar{d'})$. On a alors $d = h_1 d' + h_2 f$ donc $d'|d$. De même, $d|d'$. On en déduit que $d \sim d'$.

Revenons à notre exercice : les idéaux de $K[x]/(f^n)\times K[x]/g^m$ sont donc de la forme $(f^\alpha)\times(g^\beta)$. En revenant à $K[x]/(f^n g^m)$, on obtient que l'ensemble des idéaux est

$$\{(f^\alpha g^\beta), 0 \leqslant \alpha, \beta \leqslant n\}$$

4. Les inversibles de $K[x]/(f^n)$ sont les (classes des) polynômes premiers avec f. Le complémentaire est donc formé des multiples de f, il y en a donc autant que de polynômes de degré $(nd-1)-d$ où d est le degré de f, soit $p^{(n-1)d}$. Il y a donc $p^{(n-1)d}(p-1)$ inversibles dans $K[x]/(f^n)$.

On en déduit qu'il y en a $p^{(n-1)d_f+(m-1)d_g}(p-1)^2$ dans $K[x]/(f^n g^m)$, où d_f et d_g sont les degrés respectifs de f et g.

5. Plus généralement, si les f_i sont des polynômes irréductibles distincts, dans $K[x]/(f_1^{n_1} \cdots f_k^{n_k})$ il y a $p^{\sum(n_i-1)d_i}(p-1)^k$ inversibles, où d_i est le degré de f_i.

Correction de l'exercice 8 ▲

Pour obtenir les facteurs multiples, on utilise la remarque suivante : g est un facteur multiple de f ssi g est un facteur commun à f et à f' (dérivé formel de f).
Ainsi $\text{pgcd}(f, f')$ est le produit de tous les facteurs multiples de f, avec exposant diminué de 1 par rapport à f.
Ainsi $f/\text{pgcd}(f, f')$ est le produit de tous les facteurs irréductibles de f, avec exposant 1 pour tous. Finalement, $\text{pgcd}(\text{pgcd}(f, f'), f/\text{pgcd}(f, f'))$ est le produit de tous les facteurs multiples de f avec exposant 1.