Intégrales curvilignes, intégrales multiples

Exercices de Jean-Louis Rouget. Retrouver aussi cette fiche sur www.maths-france.fr

* très facile ** facile *** difficulté moyenne **** difficile ***** très difficile
I : Incontournable

Exercice 1 **

Calculer l'intégrale de la forme différentielle ω le long du contour orienté C dans les cas suivants :

1. $\omega = \frac{x}{x^2+y^2}dx + \frac{y}{x^2+y^2}dy$ et C est l'arc de la parabole d'équation $y^2 = 2x+1$ joignant les points $(0,-1)$ et $(0,1)$ parcouru une fois dans le sens des y croissants.
2. $\omega = (x-y^3)dx + x^3dy$ et C est le cercle de centre O et de rayon 1 parcouru une fois dans le sens direct.
3. $\omega = xyzdx$ et C est l'arc $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = \cos t \sin t$, t variant en croissant de 0 à $\frac{\pi}{2}$.

Correction ▼ [005906]

Exercice 2 **

Soit $\omega = x^2dx + y^2dy$. Calculer l'intégrale de ω le long de tout cercle du plan parcouru une fois dans le sens trigonométrique. Même question avec $\omega = y^2dx + x^2dy$.

Correction ▼ [005907]

Exercice 3 **

Calculer les intégrales multiples suivantes

1. $I = \iint_D (x+y)\,dxdy$ où $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leqslant 1,\ y \leqslant 1,\ x+y \geqslant 1\}$.
2. $I = \iint_{[-1,1]^2} |x+y|\,dxdy$.
3. $I = \iint_D xy\,dxdy$ où D est la partie du plan limitée par les paraboles d'équations respectives $y = x^2$ et $x = y^2$.
4. $I = \iint_{x^2+y^2\leqslant 1} \frac{1}{1+x^2+y^2}\,dxdy$.
5. $I = \iint_{x\leqslant x^2+y^2\leqslant 1} \frac{dxdy}{(1+x^2+y^2)^2}$.
6. $I = \iiint_{0\leqslant x\leqslant y\leqslant z\leqslant 1} xyzdxdydz$.
7. $I = \iiint_{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\leqslant 1} zdxdydz$.

Correction ▼ [005908]

Exercice 4 *** I

(Un calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$).

1. r et R sont deux réels strictement positifs tels que $r < R$. On considère le contour Γ orienté suivant



Calculer l'intégrale de la forme différentielle

$$\omega = \frac{e^{-y}}{x^2+y^2}((x\sin x - y\cos x)dx + (x\cos x + y\sin x)dy)$$

le long de ce contour orienté.

2. En déduire $\int_r^R \frac{\sin x}{x}\,dx$ en fonction d'une autre intégrale.

3. En faisant tendre r vers 0 et R vers $+\infty$, déterminer la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$.

Correction ▼ [005909]

Exercice 5 ***

Soient $(p_1, p_2, q_1, q_2) \in]0, +\infty[^4$ tels que $p_1 < p_2$ et $q_1 < q_2$.
Calculer l'aire du domaine $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \ 2p_1x \leqslant y^2 \leqslant 2p_2x \text{ et } 2q_1y \leqslant x^2 \leqslant 2q_2y\}$.

Correction ▼ [005910]

Exercice 6 *** I

Calculer le volume de $B = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n / \ x_1^2 + \ldots + x_n^2 \leqslant 1\}$ (boule unité fermée de $\mathbb{R}^n$ pour $\| \ \|_2$).

Correction ▼ [005911]

Exercice 7 **

Calculer le volume de l'intérieur de l'ellipsoïde d'équation $x^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{3}{4}z^2 + xz = 1$.

Correction ▼ [005912]

Exercice 8 **** Inégalité isopérimétrique

Une courbe fermée (C) est le support d'un arc paramétré γ de classe C^1 régulier et simple. On note $\mathcal{L}$ sa longueur et $\mathcal{A}$ l'aire délimitée par la courbe fermée (C). Montrer que

$$\mathcal{A} \leqslant \frac{\mathcal{L}^2}{4\pi}.$$

Pour cela, on supposera tout d'abord $\mathcal{L} = 2\pi$ et on choisira une paramétrisation normale de l'arc. On appliquera ensuite la formule de Parseval aux intégrales permettant de calculer $\mathcal{L}$ et $\mathcal{A}$ et on comparera les sommes des séries obtenues.

Correction ▼ [005913]

Exercice 9 ***

Calculer $I = \iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1} (x^2 - y^2)\ dxdy$.

Correction ▼ [005914]

Correction de l'exercice 1 ▲

1. C est l'arc paramétré $t \mapsto \left(\frac{t^2-1}{2}, t\right)$, t variant en croissant de -1 à 1.

$$\begin{aligned}\int_C \omega &= \int_{-1}^{1} \left(\frac{(t^2-1)/2}{\left(\frac{t^2-1}{2}\right)^2 + t^2} t + \frac{t}{\left(\frac{t^2-1}{2}\right)^2 + t^2} \right) dt \\ &= 0 \text{ (fonction impaire).}\end{aligned}$$

$$\boxed{\int_C \omega = 2\ln 2.}$$

2.

$$\begin{aligned}\int_C \omega &= \int_0^{2\pi} ((\cos t - \sin^3 t)(-\sin t) + \cos^3 t(\cos t))dt = \int_0^{2\pi} (\cos^4 t + \sin^4 t - \cos t \sin t)dt \\ &= \int_0^{2\pi} ((\cos^2 t + \sin^2 t)^2 - 2\cos^2 t \sin^2 t - \cos t \sin t)dt = \int_0^{2\pi} \left(1 - \frac{\sin(2t)}{2} - \frac{\sin^2(2t)}{2}\right) dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left(1 - \frac{\sin(2t)}{2} - \frac{1}{4}(1 - \cos(4t))\right) dt = 2\pi\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3\pi}{2}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\int_C \omega = \tfrac{3\pi}{2}.}$$

3.

$$\begin{aligned}\int_C \omega &= \int_0^{\pi/2} (\cos t \sin t \cos t \sin t)(-\sin t)\ dt = -\int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^3 t\ dt \\ &= \int_0^{\pi/2} (-\cos^2 t \sin t + \cos^4 t \sin t)dt = \left[\frac{\cos^3 t}{3} - \frac{\cos^5 t}{5}\right]_0^{\pi/2} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{5} \\ &= -\frac{2}{15}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\int_C \omega = -\tfrac{2}{15}.}$$

Correction de l'exercice 2 ▲

1. $\omega = x^2dx + y^2dy$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ qui est un ouvert étoilé de $\mathbb{R}^2$ et est fermée car $\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial Q}{\partial x}$. On en déduit que ω est exacte sur $\mathbb{R}^2$ d'après le théorème de Schwarz. Par suite, l'intégrale de ω le long de tout cercle parcouru une fois dans le sens trigonométrique est nulle.

2. $\omega = y^2dx + x^2dy$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ et n'est pas fermée car $\frac{\partial P}{\partial y} = 2y \neq 2x = \frac{\partial Q}{\partial x}$. On en déduit que ω n'est pas exacte sur $\mathbb{R}^2$. L'intégrale de ω le long d'un cercle parcouru une fois dans le sens trigonométrique n'est plus nécessairement nulle.

   On parcourt le cercle C le cercle de centre (a, b) et de rayon $R > 0$ une fois dans le sens trigonométrique ou encore on considère l'arc paramétré $\gamma : t \mapsto (a + R\cos t, b + R\sin t)$, t variant en croissant de 0 à 2π.

$$\begin{aligned}
\int_\gamma \omega &= \int_0^{2\pi} \Big((b+R\sin t)^2(-R\sin t) + (a+R\cos t)^2(R\cos t)\Big)\ dt \\
&= R\int_0^{2\pi} (a\cos t - b\sin t + 2aR\cos^2 t - 2bR\sin^2 t + R^2(\cos^3 t - \sin^3 t))\ dt \\
&= R^2\int_0^{2\pi} (2a\cos^2 t - 2b\sin^2 t + R(\cos^3 t - \sin^3 t))\ dt \\
&= R^2\int_0^{2\pi} (a(1+\cos t) - b(1-\cos t) + R(\cos t - \sin t)(\cos^2 t + \cos t\sin t + \sin^2 t))\ dt \\
&= R^2\int_0^{2\pi} (a - b + R(\cos t - \sin t)(1 + \cos t\sin t))\ dt \\
&= R^2\left(2\pi(b-a) + \int_0^{2\pi} R(\cos t - \sin t + \cos^2 t\sin t - \cos t\sin^2 t)\ dt\right) \\
&= 2\pi R^2(b-a).
\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 3 ▲

1. Représentons le domaine $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / \ x \leqslant 1,\ y \leqslant 1,\ x+y \geqslant 1\}$.



$$\begin{aligned}
I &= \iint_D (x+y)\ dxdy = \int_0^1 \left(\int_{1-x}^1 (x+y)dy\right) dx \ \text{(ou aussi } \int_0^1 \left(\int_0^{1-y} (x+y)dx\right) dy) \\
&= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_{y=1-x}^{y=1} dx = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2} - x(1-x) - \frac{(1-x)^2}{2}\right) dx \\
&= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x\right) dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{\iint_D (x+y)\ dxdy = \frac{2}{3}.}$$

2. Si on pose pour $(x,y) \in /mbr^2$, $f(x,y) = |x+y|$ alors pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(-x,-y) = f(x,y)$ ou encore f prend les mêmes valeurs en deux points symétriques par rapport à O. Puisque le point O est centre de symétrie de $[-1,1]^2$, on en déduit que

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{-1\leqslant x,y\leqslant 1,\ x+y\geqslant 0} f(x,y)\ dxdy + \iint_{-1\leqslant x,y\leqslant 1,\ x+y\leqslant 0} f(x,y)\ dxdy \\
&= 2\iint_{-1\leqslant x,y\leqslant 1,\ x+y\geqslant 0} (x+y)\ dxdy = 2\int_{-1}^{1}\left(\int_{-x}^{1}(x+y)\ dy\right)dx \\
&= 2\int_{-1}^{1}\left[xy+\frac{y^2}{2}\right]_{y=-x}^{y=1} dx = 2\int_{-1}^{1}\left(x+\frac{1}{2}+x^2-\frac{x^2}{2}\right)dx \\
&= 2\left(\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\times 2\right) = \frac{8}{3}.
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\iint_{[-1,1]^2} |x+y|\ dxdy = \frac{8}{3}.}$$

3. Représentons le domaine $D = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2/\ 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1,\ x^2\leqslant y\leqslant\sqrt{x}\}$.



$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^1\left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}} y\ dy\right)x\ dx = \int_0^1 x\left[\frac{y^2}{2}\right]_{y=x^2}^{y=\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2}\int_0^1 x(x-x^4)\ dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right) \\
&= \frac{1}{12}.
\end{aligned}
$$

4. En passant en polaires, on obtient

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{1}{1+x^2+y^2}\ dxdy = \iint_{0\leqslant r\leqslant 1,\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi}\frac{1}{1+r^2}\ rdrd\theta \\
&= \left(\int_0^1\frac{r}{1+r^2}\ dr\right)\times\left(\int_0^{2\pi} d\theta\right) \text{ (intégrales indépendantes)} \\
&= 2\pi\times\left[\frac{1}{2}\ln(1+r^2)\right]_0^1 = \pi\ln 2.
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{1}{1+x^2+y^2}\ dxdy = \pi\ln 2.}$$

5. Posons $D = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2/\ x\leqslant x^2+y^2\leqslant 1\}$. Puisque $x\leqslant x^2+y^2 \Leftrightarrow \left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2\geqslant\frac{1}{4}$, D est l'intersection de l'intérieur du disque de centre O et de rayon 1, bord compris, et de l'extérieur du disque de centre $\left(\frac{1}{2},0\right)$ et de rayon $\frac{1}{2}$, bord compris. Soit M un point du plan. On note (r,θ) un couple de coordonnées polaires de M tel que $r\geqslant 0$ et $\theta\in[0,2\pi]$.

$$M \in D \Leftrightarrow r\cos\theta \leqslant r^2 \leqslant 1 \Leftrightarrow r = 0 \text{ ou } (0 < r \leqslant 1 \text{ et } r \geqslant \cos\theta.$$



En passant en polaires, on obtient

$$\begin{aligned}
I &= 2\iint_{x\leqslant x^2+y^2\leqslant 1,\ y\geqslant 0} \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2}dxdy = 2\left(\int_0^{\pi/2}\left(\int_{\cos\theta}^1 \frac{r}{(1+r^2)^2}dr\right)d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi}\left(\int_0^1 \frac{r}{(1+r^2)^2}dr\right)d\theta\right)\\
&= 2\left(\int_0^{\pi/2}\left[-\frac{1}{2(1+r^2)}dr\right]_{\cos\theta}^1 d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi}\left[-\frac{1}{2(1+r^2)}dr\right]_0^1 d\theta\right)\\
&= \int_0^{\pi/2}\left(\frac{1}{1+\cos^2\theta}-\frac{1}{2}\right)d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi}\frac{1}{2}\,d\theta = \int_0^{\pi/2}\frac{1}{1+\cos^2\theta}d\theta\\
&= \int_0^{\pi/2}\frac{1}{\frac{1}{\cos^2\theta}+1}\frac{d\theta}{\cos^2\theta} = \int_0^{\pi/2}\frac{1}{2+\tan^2\theta}d(\tan\theta) = \int_0^{+\infty}\frac{1}{t^2+2}\,dt = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)\right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{\iint_{x\leqslant x^2+y^2\leqslant 1}\frac{1}{(1+x^2+y^2)^2}dxdy = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.}$$

6.

$$\begin{aligned}
I &= \iiint_{0\leqslant x\leqslant y\leqslant z\leqslant 1} xyzdxdydz = \int_0^1\left(\int_x^1\left(\int_y^1 zdz\right)ydy\right)xdx = \int_0^1\left(\int_x^1\frac{1}{2}(1-y^2)ydy\right)xdx\\
&= \frac{1}{2}\int_0^1\left(\int_x^1(y-y^3)dy\right)xdx = \frac{1}{2}\int_0^1\left[\frac{y^2}{2}-\frac{y^4}{4}\right]_x^1 xdx = \frac{1}{2}\int_0^1\left(\frac{1}{4}-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}\right)xdx\\
&= \frac{1}{8}\int_0^1(x^5-2x^3+x)dx = \frac{1}{8}\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{48}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{\iiint_{0\leqslant x\leqslant y\leqslant z\leqslant 1} xyzdxdydz = \frac{1}{48}.}$$

7. En sommant par tranches, on obtient

$$\begin{aligned}
I &= \iiint_{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\leqslant 1} zdxdydz = \int_0^1\left(\iint_{\sqrt{x}+\sqrt{y}\leqslant 1-\sqrt{z}} dxdy\right)zdz\\
&= \int_0^1\left(\iint_{\sqrt{u}+\sqrt{v}\leqslant 1}(1-\sqrt{z})^4 dudv\right)zdz \text{ (en posant } x = (1-\sqrt{z})^2u \text{ et } y = (1-\sqrt{z})^2v)\\
&= \mathcal{A}(D)\times\int_0^1 z(1-\sqrt{z})^4dz \text{ où } D = \{(u,v)\in\mathbb{R}^2 /\ \sqrt{u}+\sqrt{v}\leqslant 1\}.
\end{aligned}$$

Maintenant,

$$\mathcal{A}(D) = \int_0^1 \left(\int_0^{(1-\sqrt{u})^2} dv \right) du = \int_0^1 (1 - 2\sqrt{u} + u) du = 1 - \frac{4}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

et

$$\int_0^1 z(1-\sqrt{z})^4 dz = \int_0^1 (z - 4z^{3/2} + 6z^2 - 4z^{5/2} + z^3)\, dz = \frac{1}{2} - \frac{8}{5} + 2 - \frac{8}{7} + \frac{1}{4} = \frac{1}{140}.$$

Finalement

$$\boxed{\iiint_{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\leqslant 1} z dx dy dz = \frac{1}{840}.}$$

Correction de l'exercice 4 ▲

1. La forme différentielle ω est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. D'après le théorème de Schwarz, sur tout ouvert étoilé Ω contenu dans $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, la forme différentielle ω est exacte si et seulement si la forme différentielle ω est fermée.

   Pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, posons $P(x,y) = \frac{e^{-y}}{x^2+y^2}(x\sin x - y\cos x)$ et $Q(x,y) = \frac{e^{-y}}{x^2+y^2}(x\cos x + y\sin x)$.
   Pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) &= \frac{-2xe^{-y}}{(x^2+y^2)^2}(x\cos x + y\sin x) + \frac{e^{-y}}{x^2+y^2}(-x\sin x + \cos x + y\cos x) \\
&= \frac{e^{-y}}{(x^2+y^2)^2}(-2x(x\cos x + y\sin x) + (x^2+y^2)(-x\sin x + \cos x + y\cos x)) \\
&= \frac{e^{-y}}{(x^2+y^2)^2}((-x^2+y^2+x^2y+y^3)\cos x + (-2xy - x^3 - xy^2)\sin x),
\end{aligned}$$

   et

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P}{\partial y}(x,y) &= \frac{-e^{-y}}{x^2+y^2}(x\sin x - y\cos x) + \frac{-2ye^{-y}}{(x^2+y^2)^2}(x\sin x - y\cos x) + \frac{e^{-y}}{x^2+y^2}(-\cos x) \\
&= \frac{e^{-y}}{(x^2+y^2)^2}(-(x^2+y^2)(x\sin x - y\cos x) - 2y(x\sin x - y\cos x) - (x^2+y^2)\cos x) \\
&= \frac{e^{-y}}{(x^2+y^2)^2}((-x^2+y^2+x^2y+y^3)\cos x + (-2xy - x^3 - xy^2)\sin x) \\
&= \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y).
\end{aligned}$$

   Finalement, la forme différentielle ω est exacte sur tout ouvert étoilé Ω contenu dans $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

   On choisit $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,y),\ y \leqslant 0\}$. Ω est un ouvert étoilé (en tout point de la forme $(0,y)$, $y > 0$) de $\mathbb{R}^2$ contenant le contour fermé Γ. Puisque ω est exacte sur Ω, on sait alors que $\int_\Gamma \omega = 0$.

2. Le contour Γ est constitué de 4 arcs :

   Γ_1 est l'arc $t \mapsto (t,0)$, t variant en croissant de r à R,

   Γ_2 est l'arc $t \mapsto (R\cos t, R\sin t)$, t variant en croissant de 0 à π.

   Γ_3 est l'arc $t \mapsto (t,0)$, t variant en croissant de $-R$ à $-r$,

   Γ_4 est l'arc $t \mapsto (r\cos t, r\sin t)$, t variant en décroissant de π à 0.

   D'après la question 1), $\int_{\Gamma_1}\omega + \int_{\Gamma_2}\omega + \int_{\Gamma_3}\omega + \int_{\Gamma_4}\omega = 0$.

$$\int_{\Gamma_1}\omega=\int_r^R\left(P(x(t),y(t))x'(t)+Q(x(t),y(t))y'(t)\right)\,dt=\int_r^R P(t,0)\,dt$$
$$=\int_r^R\frac{1}{t^2}\times t\sin t\,dt=\int_r^R\frac{\sin t}{t}\,dt.$$

De même, $\int_{\Gamma_3}\omega=\int_{-R}^{-r}\frac{\sin t}{t}\,dt=\int_r^R\frac{\sin t}{t}\,dt$ (puisque la fonction $x\mapsto\frac{\sin x}{x}$ est paire) et donc $\int_{\Gamma_1}\omega+\int_{\Gamma_3}\omega=2\int_r^R\frac{\sin x}{x}\,dx$ puis pour tout $(r,R)\in]0,+\infty[^2$ tel que $r<R$,

$$\int_r^R\frac{\sin x}{x}\,dx=-\frac{1}{2}\left(\int_{\Gamma_2}\omega+\int_{\Gamma_4}\omega\right).$$

Ensuite,

$$\int_{\Gamma_2}\omega=\int_0^\pi\left(P(R\cos t,R\sin t)(-\sin t)+Q(R\cos t,\sin t)(\cos t)\right)\,dt$$
$$=\int_0^\pi e^{-R\sin t}\left((\cos t\sin(R\cos t)-\sin t\cos(R\cos t))(-\sin t)+(\cos t\cos(R\cos t)+\sin t\sin(R\cos t))(\cos t)\right)$$
$$=\int_0^\pi e^{-R\sin t}\cos(R\cos t)\,dt.$$

De même, $\int_{\Gamma_4}\omega=\int_\pi^0 e^{-r\sin t}\cos(r\cos t)\,dt=-\int_0^\pi e^{-r\sin t}\cos(r\cos t)\,dt$ et on a montré que

$$\boxed{\forall(r,R)\in]0,+\infty[^2,\ r<R\Rightarrow\int_r^R\frac{\sin x}{x}\,dx=\frac{1}{2}\left(\int_0^\pi e^{-r\sin t}\cos(r\cos t)\,dt-\int_0^\pi e^{-R\sin t}\cos(R\cos t)\,dt\right).}$$

3. Etudions $\lim_{R\to+\infty}\int_0^\pi e^{-R\sin t}\cos(R\cos t)\,dt$. Pour $R>0$,

$$\left|\int_0^\pi e^{-R\sin t}\cos(R\cos t)\,dt\right|\leqslant\int_0^\pi e^{-R\sin t}\left|\cos(R\cos t)\right|\,dt\leqslant\int_0^\pi e^{-R\sin t}\,dt=2\int_0^{\pi/2}e^{-R\sin t}\,dt$$
$$\leqslant 2\int_0^{\pi/2}e^{-R(2t/\pi)}\,dt\ \text{(la fonction sinus étant concave sur }\left[0,\frac{\pi}{2}\right])$$
$$=\frac{\pi}{R}\left[-e^{-2Rt/\pi}\right]_0^\pi=\frac{\pi}{R}(1-e^{-2R})$$
$$\leqslant\frac{\pi}{R}.$$

Comme $\frac{\pi}{R}$ tend vers 0 quand R tend vers $+\infty$, $\lim_{R\to+\infty}\int_0^\pi e^{-R\sin t}\cos(R\cos t)\,dt=0$. On en déduit que pour tout $r>0$, l'intégrale $\int_r^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx$ converge en $+\infty$ et que

$$\boxed{\forall r>0,\ \int_r^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx=\frac{1}{2}\int_0^\pi e^{-r\sin t}\cos(r\cos t)\,dt.}$$

Etudions maintenant $\lim_{r\to0}\int_0^\pi e^{-r\sin t}\cos(r\cos t)\,dt$. Soit $F:\begin{array}{ccc}[0,+\infty[\times[0,\pi]&\to&\mathbb{R}\\(r,t)&\mapsto&e^{-r\sin t}\cos(r\cos t)\end{array}$.

- Pour tout réel $r\in[0,+\infty[$, la fonction $t\mapsto F(r,t)$ est continue par morceaux sur $[0,\pi]$.

- Pour tout réel $t\in[0,\pi]$, la fonction $r\mapsto F(r,t)$ est continue sur $[0,+\infty[$.

- Pour tout $(r,t)\in[0,+\infty[\times[0,\pi]$, $|F(r,t)|\leqslant1=\varphi(t)$ où φ est une fonction continue par morceaux et intégrable sur le segment $[0,\pi]$.

D'après le théorème de continuité des intégrales à paramètres, la fonction $r\mapsto\int_0^\pi e^{-r\sin t}\cos(r\cos t)\,dt$ est continue sur $[0,+\infty[$. On en déduit que

$$\lim_{r\to 0}\int_0^\pi e^{-r\sin t}\cos(r\cos t)\,dt = \int_0^\pi e^0\cos(0)\,dt = \pi,$$

et finalement que

$$\boxed{\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.}$$

Correction de l'exercice 5 ▲



L'aire du domaine considéré $D = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2/\ 2p_1x \leqslant y^2 \leqslant 2p_2x \text{ et } 2q_2y \leqslant x^2 \leqslant 2q_2x\}$ est

$$\mathcal{A} = \iint_D dxdy.$$

Pour $(x,y)\in D^2$, posons $p = \frac{y^2}{2x}$ et $q = \frac{x^2}{2y}$ ou encore considérons l'application $\varphi : \begin{array}{ccc} D & \to & [p_1,p_2]\times[q_1,q_2] \\ (x,y) & \mapsto & \left(\frac{y^2}{2x},\frac{x^2}{2y}\right)\end{array}$

et vérifions que φ est un C^1-difféomorphisme.
Pour chaque $(x,y)\in D^2$, on $2p_1x \leqslant y^2 \leqslant 2p_2x$ et $2q_1y \leqslant x^2 \leqslant 2q_2y$ ou encore $p_1 \leqslant \frac{y^2}{2x} \leqslant p_2$ et $q_1 \leqslant \frac{x^2}{2y} \leqslant q_2$.
Donc φ est bien une application.
Soit $(p,q)\in[p_1,p_2]\times[q_1,q_2]$. Pour $(x,y)\in(]0,+\infty[)^2$,

$$\left\{\begin{array}{l}\frac{y^2}{2x} = p\\ \frac{x^2}{2y} = q\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} y = \frac{x^2}{2q}\\ \frac{(x^2/2q)^2}{2x} = p\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x = \sqrt[3]{8pq^2}\\ y = \sqrt[3]{8p^2q}\end{array}\right.$$

Donc, l'équation $\varphi(x,y) = (p,q)$ a exactement une solution (x_0,y_0) dans $]0,+\infty[^2$. De plus, puisque $\frac{y_0^2}{2x_0} = p\in[p_1,p_2]$ et $\frac{x_0^2}{2y_0} = q\in[q_1,q_2]$, on a $2p_1x_0 \leqslant y_0^2 \leqslant 2p_2x_0$ et $2q_1y_0 \leqslant x_0^2 \leqslant 2q_2y_0$ et donc $(x_0,y_0)\in D^2$.
Donc φ est une bijection.
φ est de classe C^1 sur D et pour $(x,y)\in D^2$,

$$\frac{D(p,q)}{D(x,y)} = J(\varphi)(x,y) = \begin{vmatrix} -\frac{y^2}{2x^2} & \frac{y}{x}\\ \frac{x}{y} & -\frac{x^2}{2y^2}\end{vmatrix} = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4} \neq 0.$$

Ainsi, φ est une bijection de D sur $[p_1,p_2]\times[q_1,q_2]$, de classe C^1 sur D et son jacobien ne s'annule pas sur D. On sait alors que φ est un C^1-difféomorphisme de D sur $[p_1,p_2]\times[q_1,q_2]$.
Posons alors $(p,q) = \varphi(x,y)$ dans $\iint_D dxdy$. On obtient

$$\mathcal{A} = \iint_D dxdy = \iint_{[p_1,p_2]\times[q_1,q_2]} \left|\frac{D(x,y)}{D(p,q)}\right| dpdq = \frac{4}{3}\iint_{[p_1,p_2]\times[q_1,q_2]} dpdq = \frac{4}{3}(p_2-p_1)(q_2-q_1).$$

$$\boxed{\mathcal{A} = \tfrac{4}{3}(p_2-p_1)(q_2-q_1).}$$

Correction de l'exercice 6 ▲

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $R \geqslant 0$, posons $B_n(R) = \{(x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{R}^n / \ x_1^2+\dots+x_n^2 \leqslant R^2\}$ et notons $V_n(R)$ le volume de $B_n(R)$. Par définition,

$$V_n(R) = \int \dots \iint_{x_1^2+\dots+x_n^2\leqslant R^2} dx_1 \dots dx_n.$$

En posant $x_1 = Ry_1, \dots, x_n = Ry_n$, on a $\frac{D(x_1,\dots,x_n)}{D(y_1,\dots,y_n)} = R^n$ (quand $R > 0$) puis

$$V_n(R) = \int \dots \iint_{x_1^2+\dots+x_n^2\leqslant R^2} dx_1 \dots dx_n = R^n \int \dots \iint_{y_1^2+\dots+y_n^2\leqslant 1} dy_1 \dots dy_n = R^n V_n(1).$$

ce qui reste vrai quand $R = 0$. Pour $n \geqslant 2$, on peut alors écrire

$$\begin{aligned} V_n(1) &= \int_{-1}^{1} \left(\int \dots \iint_{x_1^2+\dots+x_{n-1}^2\leqslant 1-x_n^2} dx_1 \dots dx_{n-1} \right) dx_n = \int_{-1}^{1} V_{n-1}\left(\sqrt{1-x_n^2}\right)\, dx_n \\ &= \int_{-1}^{1} (1-x_n^2)^{(n-1)/2} V_{n-1}(1)\, dx_n = I_n V_{n-1}(1) \end{aligned}$$

où $I_n = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^{(n-1)/2}\, dx$. Pour calculer I_n, on pose $x = \cos\theta$. On obtient

$$I_n = \int_{\pi}^{0}(1-\cos^2\theta)^{(n-1)/2}(-\sin\theta)\, d\theta = \int_0^{\pi} \sin^n\theta\, d\theta = 2\int_0^{\pi/2} \sin^n\theta\, d\theta = 2W_n \text{ (intégrales de Wallis).}$$

Finalement,

$$V_1(1) = 2 \text{ et } \forall n \geqslant 2,\ V_n(1) = 2W_n V_{n-1}(1).$$

On en déduit que pour $n \geqslant 2$,

$$V_n(1) = (2W_n)(2W_{n-1})\dots(2W_2)V_1(1) = 2^n \prod_{k=2}^{n} W_k = 2^n \prod_{k=1}^{n} W_k,$$

ce qui reste vrai pour $n = 1$. Maintenant, il est bien connu que la suite $((n+1)W_{n+1}W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante et plus précisément que $\forall n \in \mathbb{N}$, $(n+1)W_{n+1}W_n = W_1W_0 = \frac{\pi}{2}$. Donc, pour $p \in \mathbb{N}^*$,

$$V_{2p}(1) = 2^{2p}\prod_{k=1}^{2p} W_k = 2^{2p}\prod_{k=1}^{p}(W_{2k-1}W_{2k}) = 2^{2p}\prod_{k=1}^{p}\frac{\pi}{2(2k)} = \frac{\pi^p}{p!},$$

et de même

$$\begin{aligned} V_{2p+1}(1) &= 2^{2p+1}\prod_{k=2}^{2p+1} W_k = 2^{2p+1}\prod_{k=1}^{p}(W_{2k}W_{2k+1}) = 2^{2p+1}\prod_{k=1}^{p}\frac{\pi}{2(2k+1)} \\ &= \frac{\pi^p 2^{2p+1}}{3\times 5\times\dots\times(2p+1)} = \frac{\pi^p 2^{2p+1}(2p)\times(2p-2)\times\dots\times 2}{(2p+1)!} = \frac{\pi^p 2^{2p+1}p!}{(2p+1)!}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall R > 0, V_{2p}(R) = \frac{\pi^p R^{2p}}{p!} \text{ et } V_{2p-1}(R) = \frac{\pi^p 2^{2p+1} p! R^{2p+1}}{(2p+1)!}.}$$

En particulier, $V_1(R) = 2R$, $V_2(R) = \pi R^2$ et $V_3(R) = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Correction de l'exercice 7 ▲

1ère solution. $V = \iiint_{x^2+\frac{1}{2}y^2+\frac{3}{4}z^2+xz\leqslant 1} dxdydz$. Or $x^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{3}{4}z^2 + xz = \left(x + \frac{z}{2}\right)^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2}$. On pose donc $u = x + \frac{z}{2}$, $v = \frac{y}{\sqrt{2}}$ et $w = \frac{z}{\sqrt{2}}$.

$$\frac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}.$$

On en déduit que $\frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)} = 2$ puis que

$$V = \iiint_{x^2+\frac{1}{2}y^2+\frac{3}{4}z^2+xz\leqslant 1} dxdydz = \iiint_{u^2+v^2+w^2\leqslant 1} \left|\frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)}\right| dudvdw = 2 \times \frac{4\pi}{3} = \frac{8\pi}{3}.$$

2ème solution. Supposons savoir que le volume délimité par l'ellipsoïde d'équation $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1$ est $\frac{4}{3}\pi abc$. La matrice de la forme quadratique $(x, y, z) \mapsto x^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{3}{4}z^2 + xz$ dans la base canonique orthonormée de $\mathbb{R}^3$ est $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$. On sait que cette matrice a 3 valeurs propres strictement positives $\lambda = \frac{1}{a^2}$, $\mu = \frac{1}{b^2}$ et $\nu = \frac{1}{c^2}$ puis qu'il existe une base orthonormée dans laquelle l'ellipsoïde a pour équation $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1$. Le volume de l'ellipsoïde est alors

$$V = \frac{4}{3}\pi abc = \frac{4}{3}\frac{\pi}{\sqrt{\lambda\mu\nu}} = \frac{4}{3}\frac{\pi}{\sqrt{\det(A)}} = \frac{4}{3}\frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{8\pi}{3}$$

$$\boxed{V = \frac{8\pi}{3}.}$$

Correction de l'exercice 8 ▲

Supposons tout d'abord que le support de l'arc γ est de longueur $L = 2\pi$. Puisque γ est un arc de classe C^1 régulier, on peut choisir pour γ une paramétrisation normale c'est-à-dire une paramétrisation de classe C^1 $t \mapsto (x(t), y(t))$, $t \in [0, 2\pi]$, telle que $\forall t \in [0, 2\pi]$, $x'^2(t) + y'^2(t) = 1$. L'arc étant fermé, on a de plus $\gamma(0) = \gamma(2\pi)$. Cette dernière condition permet de prolonger les fonctions x et y en des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ de classe C^1 par morceaux et 2π-périodiques.
Puisque les fonctions x' et y' sont continues par morceaux sur $\mathbb{R}$, la formule de Parseval permet d'écrire

$$\begin{aligned} L = 2\pi &= \int_0^{2\pi} 1\ dt = \int_0^{2\pi} (x'^2(t) + y'^2(t))\ dt = \int_0^{2\pi} x'^2(t)\ dt + \int_0^{2\pi} y'^2(t)\ dt \\ &= \pi\left(\frac{a_0^2(x')}{2} \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n^2(x') + b_n^2(x')) + \frac{a_0^2(y')}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n^2(y') + b_n^2(y'))\right) \\ &= \pi\left(\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n^2(x') + b_n^2(x') + a_n^2(y') + b_n^2(y'))\right) (a_0(x') = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x'(t)\ dt = \frac{1}{\pi}(x(2\pi) - x(0)) = 0 = a_0(y')) \\ &\pi\left(\sum_{n=1}^{+\infty} n^2(a_n^2(x) + b_n^2(x) + a_n^2(y) + b_n^2(y))\right). \end{aligned}$$

D'autre part, d'après la formule de Green-Riemann

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \int_\gamma x dy = \int_0^{2\pi} x(t)y'(t)\,dt = \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} ((x(t)+y'(t))^2 - (x(t)-y'(t))^2)\,dt \\
&= \frac{\pi}{4}\left(\frac{a_0^2(x+y')}{2} - \frac{a_0^2(x-y')}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n^2(x+y') - a_n^2(x-y') + b_n^2(x+y') - b_n^2(x-y'))\right) \\
&= \pi\left(\frac{a_0(x)a_0(y')}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n(x)a_n(y') + b_n(x)b_n(y'))\right) \text{ (par linéarité des coefficients de Fourier)} \\
&= \frac{L}{2}\sum_{n=1}^{+\infty} n(a_n(x)b_n(y) - b_n(x)a_n(y)) \\
&\leqslant \frac{L}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2}{2}(a_n^2(x)+b_n^2(y)+b_n^2(x)+a_n^2(y)) = \frac{\mathcal{L}}{2}\times\frac{\mathcal{L}}{\pi} = \frac{\mathcal{L}^2}{4\pi}.
\end{aligned}$$

Si on a l'égalité, alors les inégalités valables pour $n \geqslant 1$,

$$n(a_n(x)b_n(y) - b_n(x)a_n(y)) \leqslant n\times\tfrac{1}{2}(a_n^2(x)+b_n^2(y)+b_n^2(x)+a_n^2(y)) \leqslant \tfrac{n^2}{2}(a_n^2(x)+b_n^2(y)+b_n^2(x)+a_n^2(y)),$$

sont des égalités. En particulier, pour $n \geqslant 2$, on a $a_n(x) = a_n(y) = b_n(x) = b_n(y) = 0$. D'autre part, quand $n = 1$, $a_1(x)b_1(y) - b_1(x)a_1(y) = \frac{1}{2}(a_1^2(x)+b_1^2(y)+b_1^2(x)+a_1^2(y))$ impose $(a_1(x)-b_1(y))^2 + (b_1(x)+a_1(y))^2 = 0$ et donc $a_1(y) = -b_1(x)$ et $b_1(y) = a_1(x)$.
D'après le théorème de Dirichlet, en posant $\alpha = \frac{a_0(x)}{2}$, $\beta = \frac{a_0(y)}{2}$, $a = a_1(x)$ et $b = b_1(x)$,

$$\forall t \in [0,2\pi],\ \begin{cases} x(t) = \alpha + a\cos t + b\sin t = \alpha + \sqrt{a^2+b^2}\cos(t-t_0) \\ y(t) = \beta - b\cos t + a\sin t = \beta + \sqrt{a^2+b^2}\sin(t-t_0) \end{cases}$$

où $\cos(t_0) = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ et $\sin(t_0) = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$. Le support de l'arc γ est donc un cercle. La réciproque est claire.
L'inégalité isopérimétrique est donc démontrée dans le cas où $L = 2\pi$ et on a l'égalité si et seulement si le support de l'arc γ est un cercle. Dans le cas où la longueur de la courbe C est un réel strictement positif $\mathcal{L}$ quelconque, l'homothétique (C') de (C) dans l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{2\pi}{\mathcal{L}}$ a une longueur $\mathcal{L}'$ égale à 2π et délimite une aire $\mathcal{A}' = \left(\frac{2\pi}{\mathcal{L}}\right)\times\mathcal{A}$.
L'inégalité $\mathcal{A}' \leqslant \frac{\mathcal{L}'^2}{2\pi} = 2\pi$ s'écrit encore $\mathcal{A} \leqslant 2\pi\times\frac{\mathcal{L}^2}{4\pi^2} = \frac{\mathcal{L}^2}{4\pi}$. De plus on a l'égalité si et seulement si la courbe (C) est un cercle (dans ce cas, $\frac{\mathcal{L}^2}{4\pi} = \frac{4\pi^2R^2}{4\pi} = \pi R^2 = \mathcal{A}$).

$\mathcal{A} \leqslant \frac{\mathcal{L}^2}{4\pi}$ avec égalité si et seulement si la courbe (C) est un cercle.

(A périmètre donné, le cercle est la courbe fermée délimitant la plus grande aire)

Correction de l'exercice 9 ▲

On pose déjà $x = ua$ et $y = vb$ de sorte que $\frac{D(u,v)}{D(x,y)} = ab$. On obtient

$$I = \iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1}(x^2-y^2)\,dxdy = ab\iint_{u^2+v^2\leqslant 1}(a^2u^2 - b^2v^2)\,dudv.$$

Ensuite,

$$\begin{aligned}
\iint_{u^2+v^2\leqslant 1} u^2\,dudv = \iint_{u^2+v^2\leqslant 1} v^2\,dudv &= \frac{1}{2}\iint_{u^2+v^2\leqslant 1}(u^2+v^2)\,dudv = \frac{1}{2}\int_{r=0}^{r=1}\int_{\theta=0}^{2\pi} r^2\times r dr d\theta \\
&= \frac{1}{2}\int_0^1 r^3 dr\int_0^{2\pi} d\theta = \frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times 2\pi = \frac{\pi}{4},
\end{aligned}$$

et donc

$$I = \frac{\pi ab(a^2-b^2)}{4}.$$