Droites du plan ; droites et plans de l'espace

Fiche corrigée par Arnaud Bodin

1 Droites dans le plan

Exercice 1

Soit P un plan muni d'un repère $\mathcal{R}(O,\vec{i},\vec{j})$, les points et les vecteurs sont exprimés par leurs coordonnées dans $\mathcal{R}$.

1. Donner un vecteur directeur, la pente, une équation paramétrique et une équation cartésienne des droites (AB) suivantes :
   (a) $A(2,3)$ et $B(-1,4)$
   (b) $A(-7,-2)$ et $B(-2,-5)$
   (c) $A(3,3)$ et $B(3,6)$
2. Donner des équations paramétriques et cartésiennes des droites passant par A et dirigées par $\vec{v}$ avec :
   (a) $A(2,1)$ et $\vec{v}(-3,-1)$
   (b) $A(0,1)$ et $\vec{v}(1,2)$
   (c) $A(-1,1)$ et $\vec{v}(1,0)$
3. Donner des équations paramétriques et cartésiennes des droites définies comme suit :
   (a) passant par le point $(0,4)$ et de pente 3,
   (b) passant par le point $(2,-3)$ et parallèle à l'axe des x,
   (c) passant par le point $(-2,5)$ et parallèle à la droite $D : 8x+4y=3$.

Correction ▼ Vidéo ■ [001956]

Exercice 2

On considère le triangle ABC dont les côtés ont pour équations $(AB) : x+2y=3$, $(AC) : x+y=2$, $(BC) : 2x+3y=4$.

1. Donner les coordonnées des points A, B, C.
2. Donner les coordonnées des milieux A', B', C' des segments $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$ respectivement.
3. Donner une équation de chaque médiane et vérifier qu'elles sont concourantes.

Indication ▼ Correction ▼ Vidéo ■ [001960]

Exercice 3 Point équidistant d'une famille de droites

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ on considère la droite D_λ d'équation cartésienne : $(1-\lambda^2)x+2\lambda y = 4\lambda+2$.
Montrer qu'il existe un point M_0 équidistant de toutes les droites D_λ.

Indication ▼ Correction ▼ Vidéo ■ [004952]

Exercice 4

Déterminer le projeté orthogonal du point $M_0(x_0, y_0)$ sur la droite (D) d'équation $2x - 3y = 5$ ainsi que son symétrique orthogonal.

Correction ▼ Vidéo ■ [006884]

2 Droites et plans dans l'espace

Exercice 5

1. Trouver une équation du plan (P) défini par les éléments suivants.

   (a) A, B et C sont des points de (P)

      i. $A(0,0,1)$, $B(1,0,0)$ et $C(0,1,0)$.

      ii. $A(1,1,1)$, $B(2,0,1)$ et $C(-1,2,4)$.

   (b) A est un point de (P), $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont des vecteurs directeurs de (P)

      i. $A(1,2,1)$, $\vec{u}(4,0,3)$ et $\vec{v}(1,3,-1)$.

      ii. $A(1,0,2)$, $\vec{u}(2,-1,3)$ et $\vec{v}(-1,4,5)$.

   (c) A est un point de (P), D est une droite contenue dans (P)

      i. $A(0,0,0)$ et $(D) : \begin{cases} x + y - z + 3 = 0 \\ 4x - y + 2z = 0 \end{cases}$

      ii. $A(1,1,0)$ et $(D) : \begin{cases} x = t \\ y = -1 + 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$

   (d) D et D' sont des droites contenues dans (P)

      i. $(D) : \begin{cases} x + y - z + 3 = 0 \\ x - y - 2 = 0 \end{cases}$ et $(D') : \begin{cases} 3x - y - z + 5 = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$

      ii. $(D) : \begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0 \\ x + 3y + z - 4 = 0 \end{cases}$ et $(D') : \begin{cases} 2x + y - 3z + 7 = 0 \\ 3x + 2y + z - 1 = 0 \end{cases}$

2. Montrer que les représentations paramétriques suivantes définissent le même plan :

$$\begin{cases} x = 2 + s + 2t \\ y = 2 + 2s + t \\ z = 1 - s - t \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = 1 + 3s' - t' \\ y = 3 + 3s' + t' \\ z = 1 - 2s' \end{cases}$$

Correction ▼ Vidéo ■ [002011]

Exercice 6

On considère la famille de plans $(P_m)_{m\in\mathbb{R}}$ définis par les équations cartésiennes :

$$m^2x + (2m - 1)y + mz = 3$$

1. Déterminer les plans P_m dans chacun des cas suivants :

   (a) $A(1,1,1) \in P_m$

   (b) $\vec{n}(2, -\frac{5}{2}, -1)$ est normal à P_m.

   (c) $\vec{v}(1,1,1)$ est un vecteur directeur de P_m

2. Montrer qu'il existe un unique point Q appartenant à tous les plans P_m.

Correction ▼ Vidéo ■ [002020]

Exercice 7

1. Déterminer la distance du point A au plan (P)

   (a) $A(1,0,2)$ et $(P) : 2x + y + z + 4 = 0$.

   (b) $A(3,2,1)$ et $(P) : -x + 5y - 4z = 5$.

2. Calculer la distance du point $A(1,2,3)$ à la droite $(D) : \begin{cases} -2x + y - 3z = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$

Correction ▼ Vidéo ■ [002021]

Exercice 8

1. On considère le point $A(-2,4,1)$, les vecteurs $\vec{u}(1,1,1)$, $\vec{v}(2,2,-4)$, $\vec{w}(3,-1,1)$ et le repère $(A,\vec{u},\vec{v},\vec{w})$. On note x', y' et z' les coordonnées dans ce repère. Donner les formules analytiques du changement de repère exprimant x, y, z en fonction de x', y', z'.

2. On considère la droite $(D) : \begin{cases} y - z = 3 \\ x + y = 2 \end{cases}$. Utiliser le changement de repère pour donner une équation de D dans le repère $(A,\vec{u},\vec{v},\vec{w})$.

3. Donner les formules analytiques du changement de repère inverse.

Correction ▼ Vidéo ■ [002034]

Exercice 9

1. Définir analytiquement la projection orthogonale sur le plan d'équation $2x + 2y - z = 1$.

2. Définir analytiquement la projection orthogonale sur la droite d'équation $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - z = 2 \end{cases}$.

3. Donner l'expression analytique de la projection sur le plan (P) contenant le point $C(2,-1,1)$ et ayant pour vecteurs directeurs $\vec{u}(0,-1,1)$ et $\vec{u'}(-2,0,1)$, selon la droite (AB), où $A(1,-1,0)$ et $B(0,-1,3)$.

Correction ▼ Vidéo ■ [002039]

Indication pour l'exercice 2 ▲

Les médianes sont les droites (AA'), (BB'), (CC').

Indication pour l'exercice 3 ▲

La distance d'un point $M_0(x_0, y_0)$ à une droite D d'équation $ax + by + c = 0$ est donnée par la formule $d(M_0, D) = \frac{|ax_0+by_0+c_0|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Correction de l'exercice 1 ▲

1. (a) Un vecteur directeur est $\overrightarrow{AB}$ dont les coordonnées sont $(x_B - x_A, y_B - y_A) = (-3, 1)$. Pour n'importe quel vecteur directeur $\vec{v} = (x_v, y_v)$ la pente est le réel $p = \frac{y_v}{x_v}$. La pente est indépendante du choix du vecteur directeur. On trouve ici $p = -\frac{1}{3}$. Une équation paramétrique de la droite de vecteur directeur $\vec{v}$ passant par $A = (x_A, y_A)$ est donnée par $\begin{cases} x = x_v t + x_A \\ y = y_v t + y_A \end{cases}$. Donc ici pour le vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$ on trouve l'équation paramétrique $\begin{cases} x = -3t + 2 \\ y = t + 3 \end{cases}$.

   Il y a plusieurs façons d'obtenir une équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

   Première méthode. On sait que $A = (x_A, y_A)$ appartient à la droite donc ses coordonnées vérifient l'équation $ax_A + by_A + c = 0$, idem avec B. On en déduit le système $\begin{cases} 2a + 3b + c = 0 \\ -a + 4b + c = 0 \end{cases}$. Les solutions s'obtiennent à une constante multiplicative près, on peut fixer $a = 1$ et on trouve alors $b = 3$ et $c = -11$. L'équation est donc $x + 3y - 11 = 0$.

   (b) On trouve $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (5, -3)$, $p = -\frac{3}{5}$ et $\begin{cases} x = 5t - 7 \\ y = -3t - 2 \end{cases}$

   Deuxième méthode. Pour trouver l'équation cartésienne on part de l'équation paramétrique réécrite ainsi $\begin{cases} \frac{x+7}{5} = t \\ -\frac{y+2}{3} = t \end{cases}$. On en déduit $\frac{x+7}{5} = -\frac{y+2}{3}$; d'où l'équation $3x + 5y + 31 = 0$.

   (c) On trouve $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (0, 3)$, la droite est donc verticale (sa pente est infinie) une équation paramétrique est $\begin{cases} x = 3 \\ y = 3t + 6 \end{cases}$. Une équation cartésienne est simplement $(x = 3)$.

2. (a) Équation paramétrique $\begin{cases} x = -3t + 2 \\ y = -t + 1 \end{cases}$.

   Troisième méthode. Pour une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$, on sait que $\vec{n} = (a, b)$ est un vecteur normal à la droite et donc $\vec{v} = (-b, a)$ est un vecteur directeur (car alors $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$). Réciproquement si $\vec{v} = (-b, a)$ est un vecteur directeur alors une équation est de la forme $ax + by + c = 0$ pour une certaine constante c à déterminer.

   Ici on nous donne le vecteur directeur $\vec{v} = (-3, -1)$ donc on cherche une équation sous la forme $-x + 3y + c = 0$. Pour trouver c, on utilise que A appartient à la droite donc $-x_A + 3y_A + c = 0$, ce qui conduit à $c = -1$. Ainsi une équation de la droite est $-x + 3y = 1$.

   (b) On trouve $2x - y + 1 = 0$.

   (c) Droite horizontale d'équation $(y = 1)$.

3. Voici juste les résultats :

   (a) $y = 3x + 4$,

   (b) $y = -3$,

   (c) $8x + 4y = 4$ (les droites parallèles à $8x + 4y = 3$ sont de la forme $8x + 4y = c$).

Correction de l'exercice 2 ▲

1. Le point A est l'intersection des droites (AB) et (AC). Les coordonnées (x, y) de A sont donc solutions du système : $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x + y = 2 \end{cases}$ donné par les équations des deux droites. La seule solution est $(x, y) = (1, 1)$. On a donc $A = (1, 1)$. On fait de même pour obtenir le point $B = (-1, 2)$ et $C = (2, 0)$.

2. Notons A' le milieu de $[BC]$ alors les coordonnées se trouvent par la formule suivante $A' = (\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}) = (\frac{1}{2}, 1)$. De même on trouve $B' = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ et $C' = (0, \frac{3}{2})$.

3. (a) Les médianes ont pour équations : $(AA') : (y = 1)$; $(BB') : (3x + 5y = 7)$; $(CC') : (3x + 4y = 6)$.

   (b) Vérifions que les trois médianes sont concourantes (ce qui est vrai quelque soit le triangle). On calcule d'abord l'intersection $I = (AA') \cap (BB')$, les coordonnées du point I d'intersection vérifient donc le système $\begin{cases} y = 1 \\ 3x + 5y = 7 \end{cases}$. On trouve $I = (\frac{2}{3}, 1)$.

   Il ne reste plus qu'à vérifier que I appartient à la droite (CC') d'équation $3x + 4y = 6$. En effet $3x_I + 4y_I = 6$ donc $I \in (CC')$.

   Conclusion : les médianes sont concourantes au point $I = (\frac{2}{3}, 1)$.

Correction de l'exercice 3 ▲

Nous savons que la distance d'un point $M_0(x_0, y_0)$ à une droite D d'équation $ax + by + c = 0$ est donnée par la formule $d(M_0, D) = \frac{|ax_0+by_0+c_0|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Pour une droite D_λ la formule donne : $d(M_0, D_\lambda) = \frac{|(1-\lambda^2)x_0+2\lambda y_0-(4\lambda+2)|}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+4\lambda^2}}$.

Analyse.

On cherche un point $M_0 = (x_0, y_0)$ tel que pour tout λ, $d(M_0, D_\lambda) = k$ où $k \in \mathbb{R}$ est une constante.

L'égalité $d(M_0, D_\lambda)^2 = k^2$ conduit à

$$\Big((1 - \lambda^2)x_0 + 2\lambda y_0 - (4\lambda + 2)\Big)^2 = k^2\Big((1 - \lambda^2)^2 + 4\lambda^2\Big)$$

pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$. Nos inconnues sont x_0, y_0, k. On regarde l'égalité comme une égalité de deux polynômes en la variable λ.

Pour ne pas avoir à tout développer on raffine un peu : on identifie les termes de plus haut degré en λ^4 : $x_0^2\lambda^4 = k^2\lambda^4$ donc $x_0^2 = k^2$.

En évaluant l'égalité pour $\lambda = 0$ cela donne $(x_0 - 2)^2 = k^2$. On en déduit $(x_0 - 2)^2 = x_0^2$ dont la seule solution est $x_0 = 1$. Ainsi $k = 1$ (car $k > 0$).

L'égalité pour $\lambda = +1$ donne $(2y_0 - 6)^2 = 4k^2$ et pour $\lambda = -1$ donne $(-2y_0 + 2)^2 = 4k^2$. La seule solution est $y_0 = 2$.

Synthèse. Vérifions que le point de coordonnées $M_0 = (1, 2)$ est situé à une distance $k = 1$ de toutes les droites D_λ.

Pour $(x_0, y_0) = (1, 2)$, on trouve : $d(M_0, D_\lambda) = \frac{|(1-\lambda^2)+4\lambda-(4\lambda+2)|}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+4\lambda^2}} = \frac{|\lambda^2+1|}{\sqrt{(\lambda^2+1)^2}} = \frac{|\lambda^2+1|}{|\lambda^2+1|} = 1$. Donc $M_0 = (1, 2)$ est bien équidistant de toutes les droites D_λ.

Correction de l'exercice 4 ▲

(D) est une droite de vecteur normal $\vec{n} = (2, -3)$. Le projeté orthogonal $p(M_0)$ de M_0 sur (D) est de la forme $M_0 + \lambda.\vec{n}$ où λ est un réel à déterminer. Le point $M_0 + \lambda.\vec{n}$ a pour coordonnées $(x_0 + 2\lambda, y_0 - 3\lambda)$.

$$M_0 + \lambda.\vec{n} \in (D) \iff 2(x_0 + 2\lambda) - 3(y_0 - 3\lambda) = 5 \iff \lambda = \frac{-2x_0 + 3y_0 + 5}{13}.$$

$p(M_0)$ a pour coordonnées $\big(x_0 + 2\frac{-2x_0+3y_0+5}{13}, y_0 - 3\frac{-2x_0+3y_0+5}{13}\big)$ ou encore $p(M_0) = \big(\frac{9x_0+6y_0+10}{13}, \frac{6x_0+4y_0-15}{13}\big)$.

Le symétrique orthogonal $s(M_0)$ vérifie : $s(M_0) = M_0 + 2\overrightarrow{M_0p(M_0)}$ (car $p(M_0)$ est le milieu du segment $[M_0, s(M_0)]$) autrement dit $s(M_0) = M_0 + 2\lambda.\vec{n}$ (pour le λ obtenu ci-dessus).

Ses coordonnées sont donc $s(M_0) = \big(x_0 + 4\frac{-2x_0+3y_0+5}{13}, y_0 - 6\frac{-2x_0+3y_0+5}{13}\big)$ ou encore $\big(\frac{5x_0+12y_0+20}{13}, \frac{12x_0-5y_0-30}{13}\big)$.

Correction de l'exercice 5 ▲

1. (a) Une équation d'un plan est $ax + by + cz + d = 0$. Si un point appartient à un plan cela donne une condition linéaire sur a, b, c, d. Si l'on nous donne trois points cela donne un système linéaire de trois équations à trois inconnues (car l'équation est unique à un facteur multiplicatif non nul près). On trouve :

i. $x + y + z - 1 = 0$

ii. $3x + 3y + z - 7 = 0$

(b) $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ est normal au plan. Si $\vec{n} = (a, b, c)$ alors une équation du plan est $ax + by + cz + d = 0$. On trouve :

i. $-9x + 7y + 12z - 17 = 0$

ii. $17x + 13y - 7z - 3 = 0$

(c) Trouver deux points B, C de la droite D. Les vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ sont des vecteurs directeurs de P. Procédé ensuite comme la question précédente. On obtient :

i. Par exemple $B = (0, -6, -3)$ et $C = (-1, 0, 2)$ appartiennent à D. On trouve l'équation $4x - y + 2z = 0$.

ii. Par exemple $B = (0, -1, 1)$ (pour $t = 0$) et $C = (1, 1, -2)$ (pour $t = 1$) appartiennent à D. On trouve l'équation $2x - y - 1 = 0$.

(d) Trouver un point A de D et deux points B, C de la droite D'. Les vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ sont des vecteurs directeurs de P. Puis procédé comme avant.

2. Les plans sont définis paramétriquement par $(P) : (2, 2, 1) + s(1, 2, -1) + t(2, 1, -1)$ donc deux des vecteurs directeurs sont $\vec{u} = (1, 2, -1)$ et $\vec{v} = (2, 1, -1)$. Un vecteur normal à (P) est alors $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v} = (-1, -1, -3)$.

   Pour le plan (P') défini par $(1, 3, 1) + s'(3, 3, -2) + t'(-1, 1, 0)$, il a pour vecteurs directeurs $\vec{u'} = (3, 3, -2)$ et $\vec{v'} = (-1, 1, 0)$. Un vecteur normal à (P') est alors $\vec{n'} = \vec{u'} \wedge \vec{v'} = (2, 2, 6)$.

   Les vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n'}$ sont colinéaires donc les plans (P) et (P') sont parallèles (ou confondus).

   Maintenant le point $A = (2, 2, 1)$ appartient à (P) (on a fait $s = 0$ et $t = 0$). Il appartient aussi à (P') (en prenant $s' = 0$ et $t' = -1$).

   Bilan. (P) et (P') sont parallèles et ont un point commun : ils sont égaux !

Correction de l'exercice 6 ▲

1. (a) Un point A appartient à un plan d'équation $ax+by+cz+d = 0$ si et seulement si $ax_A+by_A+cz_A+d = 0$. Donc $A(1, 1, 1) \in P_m$ si et seulement si $m^2+(2m-1)+m = 3$. Ce qui équivaut à $m^2+3m-4 = 0$. Les deux solutions sont $m = 1$ et $m = -4$. Donc A appartient aux plans P_1 et P_{-4} et pas aux autres.

   (b) Un plan d'équation $ax+by+cz+d = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n} = (a, b, c)$. Donc si $\vec{n} = (2, -\frac{5}{2}, -1)$ est un vecteur normal à P_m une équation cartésienne est de la forme $2x - \frac{5}{2}y - z + d = 0$. Or une équation de P_m est $m^2x + (2m - 1)y + mz - 3 = 0$. Ces deux équations sont égales à un facteur multiplicatif près $\lambda \in \mathbb{R}^* : 2x - \frac{5}{2}y - z + d = \lambda\big(m^2x + (2m - 1)y + mz - 3\big)$. On en déduit $2 = \lambda m^2$, $-\frac{5}{2} = \lambda(2m - 1)$ et $-1 = \lambda m$. En divisant la première égalité par la troisième on trouve : $m = -2$. D'où $\lambda = \frac{1}{2}$. La seconde égalité est alors vérifiée.

   Le seul plan ayant $\vec{n}$ pour vecteur normal est P_{-2}.

   (c) Un vecteur est directeur du plan P si et seulement si le produit scalaire $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$. Ici $\vec{n} = (m^2, 2m - 1, m)$. Donc $\vec{v} = (1, 1, 1)$ est vecteur directeur si et seulement si $m^2 + 2m - 1 + m = 0$. Ce qui équivaut à $m^2 + 3m - 1 = 0$. Les deux plans qui ont pour vecteur directeur $\vec{v}$ sont les plans ayant le paramètre $m = \frac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$.

2. Nous allons prendre 3 plans de la famille (P_m), calculer leur point d'intersection et finalement montrer que ce point appartient aux autres plans.

   Prenons trois paramètres "au hasard" $m = 0$, $m = 1$, $m = -1$. Un point qui appartient à ces trois plans doit vérifier les trois équations :

$$\begin{cases} y = -3 \\ x + y + z = 3 \\ x - 3y - z = 3 \end{cases}$$

On résout ce système pour trouver que l'intersection des trois plans P_0, P_1 et P_{-1} est le point $Q = (0, -3, 6)$.

Il ne reste plus qu'à vérifier que ce point appartient à tous les plans P_m: c'est le cas car $m^2 \cdot 0 + (2m - 1) \cdot (-3) + m \cdot 6 - 3 = 0$.

Autre méthode. On cherche un point $Q = (x_0, y_0, z_0)$ qui vérifie l'égalité $m^2x_0 + (2m-1)y_0 + mz_0 - 3 = 0$ pour tout m. En considérant que c'est une égalité polynomiale en m (x_0, y_0, z_0 sont fixés) on en déduit que $m^2x_0 + (2m-1)y_0 + mz_0 - 3$ est le polynôme nul : $x_0m^2 + (2y_0 + z_0)m - y_0 - 3 = 0$. Ces coefficients sont nuls : $x_0 = 0$ (le coefficient de m^2), $2y_0 + z_0 = 0$ (le coefficient de m), $-y_0 - 3 = 0$ (le terme constant). On trouve bien sûr le même point d'intersection de tous les plans : $Q = (0, -3, 6)$.

Correction de l'exercice 7 ▲

1. La distance d'un point $A = (x_0, y_0, z_0)$ à un plan P d'équation $ax + by + cz + d = 0$ est donnée par la formule :
$$d(A, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$
On trouve donc
   (a) $d(A, P) = \frac{|2\cdot1+1\cdot0+1\cdot2+4|}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}} = \frac{8}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$.
   (b) $d(A, P) = \frac{2}{\sqrt{42}}$.

2. Trouvons d'abord une équation paramétrique de la droite D. On pose par exemple $z = t$ et on exprime x et y en fonction de t. Partant du système $\begin{cases} -2x + y - 3z = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$ on trouve $x = 1 - t$ et $y = 3 + t$. La droite D est donc l'ensemble des points $M_t = (1 - t, 3 + t, t)$ (t parcourant $\mathbb{R}$).
   La distance AM_t vérifie donc
$$AM_t^2 = \|\vec{AM_t}\|^2 = \|(1 - t - 1, 3 + t - 2, t - 3)\|^2 = t^2 + (t + 1)^2 + (t - 3)^2 = 3t^2 - 4t + 10.$$
   Minimiser cette distance c'est trouver le minimum de la fonction $\delta(t) = 3t^2 - 4t + 10$. Il est donc atteint pour t_0 vérifiant $\delta'(t_0) = 0$, donc pour $t_0 = \frac{2}{3}$. La distance entre A et la droite D est donc la longueur $AM_{t_0} = \sqrt{\delta(t_0)} = \sqrt{\frac{26}{3}}$. Au passage on a obtenu la perpendiculaire à D passant par A c'est la droite (AM_{t_0}).

   Autre méthode.

   Il existe une formule pour calculer directement la distance. Si $\vec{v}$ est un vecteur directeur de D et M_0 un point de D alors
$$d(A, D) = \frac{\|\vec{v} \wedge \overrightarrow{AM_0}\|}{\|\vec{v}\|}.$$
   On a paramétré la droite D par les points $M_t = (1, 3, 0) + t(-1, 1, 1)$. Donc $M_0 = (1, 3, 0) \in D$ et $\vec{v} = (-1, 1, 1)$ est un vecteur directeur de D. On a alors $\overrightarrow{AM_0} = (0, 1, -3)$ et $\vec{v} \wedge \overrightarrow{AM_0} = (-4, -3, -1)$: on obtient :
$$d(A, D) = \frac{\|\vec{v} \wedge \overrightarrow{AM_0}\|}{\|\vec{v}\|} = \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{3}}.$$

Correction de l'exercice 8 ▲

1. Notons $\mathcal{R}$ le repère initial $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Dire qu'un point M du plan a pour coordonnées (x, y, z) dans $\mathcal{R}$ signifie $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

   Si $\mathcal{R}'$ désigne un autre repère $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ alors le même point M a pour coordonnées (x', y', z') dans $\mathcal{R}'$ signifie $\overrightarrow{AM} = x'\vec{u} + y'\vec{v} + z'\vec{w}$.

   La formule de changement c'est simplement écrire les coordonnées de l'égalité $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM}$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + x'\vec{u} + y'\vec{v} + z'\vec{w}$$

   Mais on connaît les coordonnées de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ dans $\mathcal{R}$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + x' \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + y' \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} + z' \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

   D'où l'égalité de changement de repère :

$$(\mathcal{S}) \qquad \begin{cases} x = -2 + x' + 2y' + 3z' \\ y = 4 + x' + 2y' - z' \\ z = 1 + x' - 4y' + z' \end{cases}$$

2. Dans l'équation de la droite (D) $\begin{cases} y - z = 3 \\ x + y = 2 \end{cases}$ dans le repère $\mathcal{R}$ on remplace x, y, z par la formule $(\mathcal{S})$ obtenue à la question précédente.

   On obtient :

$$\begin{cases} (4 + x' + 2y' - z') - (1 + x' - 4y' + z') = 3 \\ (-2 + x' + 2y' + 3z') + (4 + x' + 2y' - z') = 2 \end{cases}.$$

   Ce qui donne une équation de (D) dans le repère $\mathcal{R}'$:

$$\begin{cases} 6y' - 2z' = 0 \\ 2x' + 4y' + 2z' = 0 \end{cases} \quad \text{ou encore} \quad \begin{cases} 3y' - z' = 0 \\ x' + 2y' + z' = 0 \end{cases}$$

   En particulier en faisant $(x', y', z') = (0, 0, 0)$ on remarque que cette droite passe par A.

3. Nous avions obtenu l'égalité $(\mathcal{S})$ de changement de repère de $\mathcal{R}'$ vers $\mathcal{R}$ qui s'écrit :

$$\begin{cases} x + 2 = x' + 2y' + 3z' \\ y - 4 = x' + 2y' - z' \\ z - 1 = x' - 4y' + z' \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} X = x' + 2y' + 3z' \\ Y = x' + 2y' - z' \\ Z = x' - 4y' + z' \end{cases}$$

   Où l'on a noté $X = x + 2$, $Y = y - 4$, $Z = z - 1$. On inverse le système par la méthode de Gauss pour obtenir après calculs :

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{12}(X + 7Y + 4Z) \\ y' = \frac{1}{12}(X + Y - 2Z) \\ z' = \frac{1}{12}(3X - 3Y) \end{cases}$$

   Donc

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{12}(x + 7y + 4z - 30) \\ y' = \frac{1}{12}(x + y - 2z) \\ z' = \frac{1}{12}(3x - 3y + 18) \end{cases}$$

   Avec les matrices cela se fait ainsi : le système $(\mathcal{S})$ devient

$$\begin{pmatrix} x + 2 \\ y - 4 \\ z - 1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} x+2 \\ y-4 \\ z-1 \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad M^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 9 ▲

1. Notons P le plan d'équation $2x+2y-z=1$. Et soit $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un point quelconque. $\vec{n} = (2,2,-1)$ est un vecteur normal au plan. On cherche $p(M_0)$ appartenant au plan sous la forme $M_0 + \lambda \cdot \vec{n}$.

$$\begin{aligned} p(M_0) \in P &\iff M_0 + \lambda \cdot \vec{n} \in P \\ &\iff (x_0, y_0, z_0) + \lambda(2,2,-1) \in P \\ &\iff (x_0 + 2\lambda, y_0 + 2\lambda, z_0 - \lambda) \in P \\ &\iff 2(x_0 + 2\lambda) + 2(y_0 + 2\lambda) - (z_0 - \lambda) = 1 \\ &\iff \lambda = \frac{1 - 2x_0 - 2y_0 + z_0}{9} \end{aligned}$$

   En posant $\lambda_0 = \frac{1-2x_0-2y_0+z_0}{9}$, le projeté orthogonal de M_0 sur P est défini par $p(M_0) = (x_0 + 2\lambda_0, y_0 + 2\lambda_0, z_0 - \lambda_0)$.

2. Notons D la droite d'équation $\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x-z=2 \end{cases}$ et soit $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un point quelconque.

   Il nous faut deux vecteurs normaux : par exemple $\vec{n_1} = (1,1,1)$ et $\vec{n_2} = (2,0,-1)$ (qui sont les vecteurs normaux aux deux plans définissant D).

   On cherche le projeté orthogonal $\pi(M_0)$ sur la droite D sous la forme $M_0 + \lambda_1\vec{n_1} + \lambda_2\vec{n_2}$. On va déterminer $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ de sorte que ce point appartienne à D.

$$\begin{aligned} \pi(M_0) \in D &\iff M_0 + \lambda_1\vec{n_1} + \lambda_2\vec{n_2} \in D \\ &\iff (x_0, y_0, z_0) + \lambda_1(1,1,1) + \lambda_2(2,0,-1) \in D \\ &\iff (x_0 + \lambda_1 + 2\lambda_2, y_0 + \lambda_1, z_0 + \lambda_1 - \lambda_2) \in D \\ &\iff \begin{cases} (x_0 + \lambda_1 + 2\lambda_2) + (y_0 + \lambda_1) + (z_0 + \lambda_1 - \lambda_2) = 1 \\ 2(x_0 + \lambda_1 + 2\lambda_2) - (z_0 + \lambda_1 - \lambda_2) = 2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 3\lambda_1 + \lambda_2 = 1 - x_0 - y_0 - z_0 \\ \lambda_1 + 5\lambda_2 = 2 - 2x_0 + z_0 \end{cases} \\ &\iff \lambda_1 = \frac{1}{14}(3 - 3x_0 - 5y_0 - 6z_0) \text{ et } \lambda_2 = \frac{1}{14}(5 - 5x_0 + y_0 + 4z_0) \end{aligned}$$

   Ainsi $\pi(M_0) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda_1(1,1,1) + \lambda_2(2,0,-1)$ avec les valeurs de λ_1, λ_2 obtenues.

3. Le principe est similaire, voici les étapes :

   (a) Trouver une équation du plan. Un vecteur normal au plan est $\vec{u} \wedge \vec{u'} = (-1,-2,-2)$. Donc le plan est d'équation $x + 2y + 2z - 2 = 0$.

   (b) Chercher le projeté d'un point $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ sous la forme $M_0 + \lambda \cdot \overrightarrow{AB}$. Trouver λ_0 de sorte que $M_0 + \lambda_0 \cdot \overrightarrow{AB}$ appartienne au plan.

   (c) On trouve $\overrightarrow{AB} = (-1,0,3)$ et $\lambda_0 = -\frac{1}{5}(x_0 + 2y_0 + 2z_0 - 2)$ et donc le projeté cherché est $p(M_0) = (x_0 - \lambda_0, y_0, z_0 + 3\lambda_0)$.